CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Arroyo Pantanoso (AP)

Descripción

Es un suelo profundo, de aptitud ganadera, que se encuentra la llanura de los derrames, en bajos y cubetas de la Subregión de las Sierras y Pedemonte de Tandilia, pobremente drenado, evolucionado sobre sedimentos limosos fluvio lacustres, con fuerte alcalinidad después de los 31 cm. de profundidad, levemente salino desde los 51 cm. con pendientes de 0 a 0.5 %.

Clasificación taxonómica: Natralbol vértico, fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2010).
Natralbol típico, fina, illítica, térmica (7ª Aprox. USDA-Soil Taxonomy V.1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 37° 48' 30". Longitud O: 58º 15' 45". Altitud: 97 msnm se ubica en la Estancia San Eduardo a 18.5 km al NNE del cruce de las rutas 226 y 55 (sobre la ruta 55), partido de Balcarce, provincia Buenos Aires; hoja I.G.M. 3757-31-2, Sierra de Bachicha.

Variabilidad de las características: Algunos perfiles tienen mayor alcalinidad de superficie.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: Estación Santo Domingo.

Suelos asociados: Cobo y Ayacucho.

Distribución geográfica: Partidos Tandil y Balcarce. Mosaico 3760-30.

Drenaje y permeabilidad: Muy pobremente drenado, escurrimiento estancado, permeabilidad muy lenta.

Uso y vegetación: Ganadero, no apto para cultivos. Duraznillo blanco (Solanum glaucum).

Capacidad de uso: VI ws

Limitaciones de uso: Drenaje deficiente, anegamiento, alcalinidad sódica.


Índice de productividad según la región climática: 8,10 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico, no reúne requisitos para mólico por tener espesor 15 cm., cumple con los requisitos de color y materia orgánica, régimen de humedad ácuico, horizontes nátrico y argílico entre los 26 y 80 cm. con características vérticas (40 cm. horizontes Btcn y Btssn con más del 30 % de arcilla y presencia de caras de fricción).

Descripción del perfil típico:

4/957 C
Fecha de muestreo: 5 de Octubre de 1973

Reconocedores: Rizzolo - Bifau



A 0-18 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco; bloques subangulares medios, débiles que rompen a granular medio débil; duro; friable; concreciones de hierro-manganeso escasas; moteados escasos, finos, débiles; raíces muy abundantes; formaciones especiales: krotovinas; límite inferior abrupto, suave.

En 18-31 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco; franco; masiva con tendencia a laminar; muy duro; firme; concreciones de hierro-manganeso escasas; moteados escasos, finos, débiles.

Btcn 31-51 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco; franco arcilloso; prismas simples regulares, gruesos, fuertes que rompe a prismas menores; extremadamente duro; muy firme; abundantes concreciones de hierro-manganeso; moteados comunes, medios y precisos; barnices húmico-arcillosos muy abundantes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

Btssn 51-71 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; arcilloso; prismas simples regulares, medios, fuertes que rompe a bloques angulares regulares medios; extremadamente duro; firme; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados comunes, medios y sobresalientes; barnices húmico-arcillosos (slikensides) muy abundantes; vestigios de raíces; límite inferior gradual, suave.

BCknz 71-95 cm; pardo (7,5YR 4.5/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco; prismas irregulares y regulares medios moderados que rompe a bloques subangulares medios, débiles; muy duro; friable; abundantes concreciones de hierro-manganeso y de calcio; barnices escasos; moteados abundantes, medios y sobresalientes.

W 100 cm; presencia de napa freática.

Observaciones: Este suelo sufre anegamintos con lluvias abundantes.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	En	Btcn	Btssn	BCknz
Profundidad (cm)	0-18	18-31	31-51	51-71	71-95
Mat. orgánica (%)	3,9	0,6	0,7	0,5	0,2
Carbono total (%)	2,29	0,35	0,43	0,29	0,15
Nitrógeno (%)	0,228	0,039	0,054	-	-
Relación C/N	10	9	8	-	-
Arcilla <2 µ (%)	18,4	11,1	36,5	42,7	24,2
Limo 2-20 µ (%)	18,9	17,3	10,8	14,6	16,2
Limo 2-50 µ (%)	40,2	41,4	31,7	27,7	43,7
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	39,8	45,6	30,6	28,7	30,9
AF 100-250 µ (%)	1,6	1,9	1,2	0,9	1,2
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	vest.	vest.
Eq.humedad (%)	26,4	14,9	61,6	79,8	39,7
Re. pasta Ohms	3654	8700	1305	522	718
Cond. mmhos/cm	S/D	S/D	S/D	2,84	2,02
pH en pasta	5,9	7,9	7,9	7,9	8,0
pH H2O 1:2,5	6,9	8,2	8,6	8,6	9,0
pH KCL 1:2,5	5,5	6,4	6,7	7,2	7,2
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	8,4	4,4	12,5	-	-
Mg++ m.eq./100gr	5,2	2,6	7,3	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,8	1,1	6,9	8,2	7,1
K+ m.eq./100gr	1,6	1,0	2,4	3,1	2,6
H+ m.eq./100gr	3,4	-	-	-	-
Na (% de T)	4,5	11	23	22	25
Suma de Bases	16,0	9,1	29,1	-	-
CIC m.eq./100gr	17,6	9,1	26,8	37,4	28,2
Sat. con bases (%)	100	100	-	-	-