CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Balbín (Bb)

Descripción

La serie Balbín representa suelos que se encuentran en un paisaje de tendidos bajos, con pendientes del 0 a 1 %. Esta imperfectamente drenada, con escurrimiento y permeabilidad lentas. Es fuertemente alcalino y no es salino. Su uso está limitado por la alcalinidad y el hidromorfismo.

Clasificación taxonómica: Natracuol dúrico, limosa fina, mixta, térmica

Ubicación del perfil: Latitud S 34º 27' 26". Longitud W 62º 48' 28", a 15 km al ESE de la Estación Cañada Seca, partido de General Villegas.

Drenaje y permeabilidad: Imperfectamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta.


Capacidad de uso: VI ws

Limitaciones de uso: Alcalinidad e hidromorfismo.

Índice de productividad según la región climática: 23 (B), 22 (C)

Descripción del perfil típico:

15 C
Fecha de muestreo: 1990
Reconocedores: Alfieri-Viale



A1 0-24 cm; pardo rojizo oscuro (5YR 2/2) en húmedo; franco; estructura en bloques subangulares, medios, moderados a granular; friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto, suave.

B21t 24-39 cm; pardo rojizo (5YR 4/3) en húmedo; franco arcilloso; estructura en prismas simples y regulares medios a gruesos, fuertes que rompen a prismas medios que rompen a bloques angulares; duro en seco, firme en húmedo; plástico, adhesivo; moteados débiles, abundantes y finos; "clayskins" abundantes; raíces abundantes; límite abrupto, ondulado.

B22m 39-76 cm; pardo rojizo (5YR 4/4) en húmedo; franco; estructura con tendencia laminar que rompe a bloques angulares; muy firme en húmedo; plástico, adhesivo; abundantes concreciones de calcio; escasa presencia de barnices; moteados precisos, abundantes y gruesos; raíces escasas; cementado parcialmente; límite gradual, suave.

B31m 76-110 cm; rojo amarillento (5YR 4/6) en húmedo; franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares, medios y gruesos a finos; firme en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; límite abrupto, irregular.

B32ca 110-124 cm; franco arenoso; estructura en bloques angulares, medios, débiles; moteados precisos, abundantes y medios; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A1	B21t	B22m	B31m	B32ca
Profundidad (cm)	5-20	27-36	45-70	80-105	115-133
Mat. orgánica (%)	2.72	0.76	0.22	0.12	0.08
Carbono Orgánico (%)	1.58	0.44	0.13	0.07	0.05
Nitrógeno (%)	0.141	0.072	-	-	-
Relación C/N	11	6	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	19.3	27.4	18.0	17.8	9.8
Limo 2-20 µ (%)	16.7	13.6	21.8	10.8	18.0
Limo 2-50 µ (%)	34.5	40.3	45.6	30.5	26.2
AMF 50-74 µ (%)	10.4	8.1	15.4	18.4	10.0
AMF 74-100 µ (%)	14.4	11.6	8.6	18.5	22.4
AMF 50-100 µ (%)	28.8	19.7	22.0	36.9	32.4
AF 100-250 µ (%)	20.7	12.0	12.0	20.3	16.3
AM 250-500 µ (%)	0.6	0.4	0.3	0.7	3.7
AG 500-1000 µ (%)	0.1	0.2	0.1	0.4	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	11.5	-	-
Eq.humedad (%)	18.9	29.0	25.8	23.3	15.0
Cond. de la pasta (mmhs/cm)	-	-	-	-	-
pH en pasta	5.7	7.7	8.5	8.9	8.7
pH H2O 1:2,5	6.5	8.8	9.4	9.6	9.4
pH KCL 1:2,5	4.6	6.3	7.0	7.0	7.0
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	4.4	6.0	6.0	3.1	-
Mg++ m.eq./100gr	3.9	6.7	3.2	4.2	-
Na+ m.eq./100gr	0.6	5.7	9.1	6.1	8.3
K+ m.eq./100gr	1.4	2.4	3.1	2.3	2.9
PSI (%)	4	28	50	42	62
Agua de Saturación (%)	-	-	-	-	-
Suma de bases [cmol (+)/kg] (S)	10.3	20.8	21.4	15.7	-
CIC [cmol (+)/kg] (T)	14.9	20.2	18.1	14.6	13.4
Saturación de bases (%) (S/T)	69	100	100	100	-
Saturación (%) (S+H)	-	-	-	-	-