CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Estación González Moreno (GMo)

Descripción

Esta serie representa suelos que se encuentran en un área suavemente ondulada, de relieve normal y pendiente de 0 a 1 %. Es un suelo profundo desarrollado a partir de un material arenoso de origen eólico, se encuentra en posición de media loma alta. Es algo excesivamente drenado, de escurrimiento rápido y permeabilidad moderada a moderadamente rápida. No tiene salinidad ni alcalinidad y la vegetación presente son pasturas implantadas. Las limitaciones de uso se refieren a la baja retención de humedad.

Clasificación taxonómica: Hapludol cumúlico, franca gruesa, mixta, térmica.

Ubicación del perfil: Latitud S 35º 34' 2". Longitud W 63º 23' 0". Altitud 105 msnm, a 1.3 km al SSW de la localidad de González Moreno, partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires. Mosaico correspondiente a Carta topográfica IGM 3563-27-3, González Moreno.

Drenaje y permeabilidad: Algo excesivamente drenado, escurrimiento rápido, permeabilidad moderada a moderadamente rápida.

Uso y vegetación: Pastura implantada.


Capacidad de uso: IV s

Limitaciones de uso: Baja capacidad de retención de humedad.

Índice de productividad según la región climática: 48 (D)

Descripción del perfil típico:

01-C
Fecha de muestreo: Diciembre de 1989



Ap 0-15 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos, débiles; friable en húmedo, no plástico, no adhesivo; límite claro, suave

A 15-40 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; estructura en bloques angulares, medios, débiles; friable en húmedo, no plástico, no adhesivo; limite abrupto, suave.

Ceniza 40-45 cm; blanco (10YR 8/1) en seco y gris pálido (10YR 7/1) en húmedo; limite abrupto, suave.

2Ab 45-83 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco y negro (10YR 2/1) en húmedo; franco a franco arenoso; estructura en bloques angulares, gruesos, moderados; ligeramente duro en húmedo, no plástico, no adhesivo; límite claro, suave.

2ACb 83-110 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco arenoso; estructura en bloques angulares medios, débiles; muy firme en húmedo, no plástico, no adhesivo.

2C 110-150 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; estructura en bloques angulares finos, débiles; muy firme en húmedo, no plástico, no adhesivo.

2Ck 150-170 cm; pardo amarillento (10YR 3/4) en húmedo; areno franco; sin estructuración; muy firme en húmedo, no plástico, no adhesivo; moteados comunes, precisos y gruesos; fuerte reacción de carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	2Ab	2ACb	2C	2Ck
Profundidad (cm)	0-15	15-40	45-83	83-110	110-150	150-170
Materia Orgánica (%)	1.70	1.09	1.28	0.53	0.27	0.22
Carbono Orgánico (%)	1.00	0.63	0.74	0.31	0.15	0.13
Nitrógeno (%)	0.125	0.062	0.069	0.042	-	-
Relación C/N	8	10	11	7	-	-
Fósforo (ppm)	58.6	48.9	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	11.1	11.6	13.6	12.8	11.8	6.8
Limo 2-20 µ (%)	6.5	9.6	7.3	4.7	3.5	3.2
Limo 2-50 µ (%)	27.7	24.5	19.4	15.1	15.0	14.6
AMF 50-75 µ (%)	20.7	19.3	11.6	12.9	12.4	11.0
AMF 75-100 µ (%)	18.3	13.5	12.6	18.7	22.5	19.1
AMF 50-100 µ (%)	39.0	32.8	24.2	31.6	34.9	30.1
AF 100-250 µ (%)	20.3	28.9	39.5	36.9	33.5	42.9
AM 250-500 µ (%)	1.2	1.4	2.0	2.4	2.5	2.1
AG 500-1000 µ (%)	0.7	0.8	1.3	1.2	1.2	1.2
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	-	2.1	-
Equivalente de Humedad (%)	11.5	11.2	12.3	9.9	8.8	8.3
Re. pasta. (Ohms/cm)	-	-	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
pH en pasta de saturación	7.2	7.1	6.2	6.8	7.7	8.2
pH H2O (1:2.5)	7.5	7.7	6.8	7.2	8.3	8.6
pH KCL (1:2.5)	6.5	6.9	5.5	6.0	6.5	7.7
Cationes de Cambio						
Ca++ m.eq./100gr	6.5	4.5	5.9	5.4	-	-
Mg++ m.eq./100gr	1.9	1.4	1.9	2.1	-	-
Na+ m.eq./100gr	0.2	0.4	1.0	0.5	0.5	0.4
K+ m.eq./100gr	2.6	2.4	2.4	1.7	1.6	1.2
H+ m.eq./100gr	2.0	2.2	3.4	1.8	-	-
PSI (%)	1.0	4.0	7.0	4.0	5.0	7.0
Agua de Saturación (%)	-	-	-	-	-	-
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	11.2	8.7	11.2	9.7	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	11.4	10.0	12.7	11.1	8.8	5.4
Saturación de bases (%) (S/T)	98	87	88	87	-	-
% de Saturación (S+H)	-	-	-	-	-	-