CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Etcheverry (Etch)

## Descripción

Es un suelo muy oscuro y profundo, de aptitud agrícolo-ganadero, que se encuentra en una planicie extensa en la que se definen varios cursos y arroyos tributarios del río Samborombón, en posición de loma, en la "Subregión Pampa Ondulada baja", algo pobremente drenado, se ha formado en sedimentos loéssicos franco limosos, no alcalino, con pendientes de 0,5-1 %.

**Clasificación taxonómica:** Paleudol vértico, fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy 2010).
Paleudol típico, fina, illítica, térmica (USDA-7ª Aprox. ST- 1975).

**Ubicación del perfil:** Latitud S: 35° 02' 03''. Longitud O: 58° 03' 42''. Altitud: 26 m.s.n.m. a 10,3 km. al este noreste de la estación Gómez, partido Brandsen, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3557-19-2, Estación Gómez.

**Variabilidad de las características:** El "hue" del horizonte Ap-A, es 10 YR con "values" que van del 2/ a 3/ y comprenden, 10YR 2/1, 10YR 2/2, 10YR 2/3, en húmedo y con texturas franco limoso a franco arcillo limoso. El horizonte AB, entre 22 a 50 cm. de espesor con porcentajes de limos (2-50 µ) del 63 a 68 %. El espesor del "solum" Ap-A-2Btss1-2Btss2, varía entre 120 a 150 cm. de espesor.

**Fases:** Por drenaje y pendiente (erosión hídrica potencial).

**Series similares:** Magdalena.

**Suelos asociados:** Integrando asociaciones con Ignacio Correa, Poblet, Vieytes y en forma de consociación con la serie Ignacio Correa.

**Distribución geográfica:** Partidos de San Vicente, Brandsen, este de Cañuelas, norte de General Paz y oeste de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Hojas I.G.M. 3557-19 y 20.

**Drenaje y permeabilidad:** Algo pobremente drenado, escurrimiento medio, permeabilidad lenta.

**Uso y vegetación:** Pasturas: Rye Grass (Lolium multiflorum). Vegetación natural: Nabo (Brassica campestri), Cebadilla (Bromus unioloides), Capiquí, (Stellaria media), Trébol blanco (Trifolium repens).

**Capacidad de uso:** III s


**Limitaciones de uso:** Drenaje, Bt fuertemente textural, erosión hídrica ligera.

**Índice de productividad según la región climática:** 59,8 (A)

**Rasgos diagnósticos:** Régimen de humedad údico, epipedón mólico, Ap-A-AB horizonte argílico, 2 Btss-2Bt con características vérticas ("slickensides"), grado de desarrollo del sub-horizonte 75 cm. de espesor, tonalidad de colores 7,5YR ó más rojo y cromas de 5 o más (S.T.V 2010) desde la mitad inferior del sub-horizonte 2Bt, hasta la base del perfil y que define el Subgrupo vértico.

## Descripción del perfil típico:

**1/1050 C**
**Fecha de muestreo: 25 de Octubre de 1969**
**Reconocedores: Fernández Coria - Alfieri**




**Ap** 0-15 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares, finos, medios; ligeramente duro; friable; no plástico, no adhesivo; abundantes raíces; límite abrupto, suave.

**A** 15-22 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; ligeramente duro; friable; no plástico, no adhesivo; abundantes raíces; límite claro, suave.

**AB** 22-45 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo (10YR 5/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; duro; friable; no plástico, no adhesivo; abundantes raíces; formaciones especiales: poros abundantes; límite abrupto, suave.

**2Btss1** 45-90 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris muy oscuro (10YR 3/1) en seco; arcillo limoso; prismas gruesos y fuertes que rompe a bloques subangulares, medios, moderados; extremadamente duro; firme; muy plástico, adhesivo; abundantes "clayskins"; "slickensides" comunes; raíces comunes; límite claro, suave.

**2Btss2** 90-120 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; arcillo limoso; prismas gruesos, fuertes que rompe a prismas medios, fuertes y bloques subangulares, finos, fuertes; duro; firme; plástico y ligeramente adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; moteados abundantes, medios y precisos; "slickensides" muy abundantes; raíces comunes; límite claro, suave.

**3BCk** 120-160 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares medios, moderados; duro; firme; plástico, ligeramente adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; abundantes concreciones de carbonato de calcio; moteados abundantes, finos y precisos; raíces escasas.

**3C** 160-206 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; arcillo limoso; escasas raíces.

**Observaciones:** Las caras de fricción "slickensides" tienen dimensiones de 10 a 15 cm. de extensión, esto ocurre porque son arcillas muy expandibles debido a los cambios de humedad permanentes.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | Ap | A | AB | 2Btss1 | 2Btss2 | 3BCk | 3C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 0-15 | 15-22 | 22-40 | 45-90 | 90-120 | 127-158 | 168-200 |
| Mat. orgánica (%) | 4,15 | 3,44 | 2,22 | 1,46 | 0,91 | 0,46 | 0,17 |
| Carbono total (%) | 2,39 | 2,00 | 1,29 | 0,85 | 0,53 | 0,27 | 0,10 |
| Nitrógeno (%) | 0,231 | 0,194 | 0,125 | 0,092 | 0,056 | - | - |
| Relación C/N | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | - | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 24,7 | 26,5 | 21,5 | 47,5 | 46,8 | 42,9 | 40,8 |
| Limo 2-20 µ (%) | 37,6 | 37,2 | 44,2 | 25,2 | 27,2 | 30,5 | 29,6 |
| Limo 2-50 µ (%) | 61,9 | 60,6 | 66,2 | 42,8 | 45,9 | 43,8 | 50,3 |
| AMF 50-75 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMF 75-100 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMF 50-100 µ (%) | 12,7 | 11,8 | 9,2 | 8,6 | 6,7 | 6,7 | 8,2 |
| AF 100-250 µ (%) | 0,2 | 1,1 | 3,1 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 0,7 |
| AM 250-500 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG 500-1000 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMG 1-2 mm (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calcáreo (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | vest. | 5,6 | vest. |
| Eq.humedad (%) | 30,8 | 33,1 | 29,8 | 54,2 | 49,9 | 43,9 | 39,8 |
| Re. pasta Ohms | 8872 | 5687 | 9327 | 2320 | 1729 | 1592 | 1911 |
| Cond. mmhos/cm | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
| pH en pasta | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,1 | 7,5 | 7,4 |
| pH H2O 1:2,5 | 6,2 | 6,1 | 6,9 | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 8,3 |
| pH KCL 1:2,5 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 6,9 |
| Cationes de cambio | | | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 12,6 | 12,8 | 11,4 | 25,7 | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 7,2 | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 1,8 |
| K+ m.eq./100gr | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| H+ m.eq./100gr | 10,0 | 9,2 | 5,1 | 5,9 | - | - | - |
| Na (% de T) | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 6,0 |
| Suma de Bases | 15,3 | 15,5 | 14,4 | 35,6 | - | - | - |
| CIC m.eq./100gr | 21,1 | 21,1 | 16,2 | 37,3 | 43,0 | 33,1 | 29,8 |
| Sat. con bases (%) | 61 | 63 | 74 | 83 | - | - | - |