CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

General Conesa (GC)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo, de aptitud ganadera, que se encuentra en una antigua planicie marina de inundación, integrada por albardones y canales de mareas de la "Subregión Geomorfológica Llanura Marina del Río Samborombón", posición tendido bajo, algo pobremente drenado, evolucionado sobre sedimentos marinos M2 + M4 (J.Tricart), con fuerte alcalinidad sódica desde superficie, moderadamente salino de 0 a 48 cm, con pendientes de 0.5 %.

Clasificación taxonómica: Natracuert típico, muy fina, montmorillonítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2010).
Pelludert típico, fina, illítica, térmica (7ª Aprox. USDA-Soil Taxonomy V.1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 36º 21' 26". Longitud O: 57º 09' 43". Altitud 1 m.s.n.m. a 23 km al NE de General Conesa, partido de Tordillo, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3757-9-2, Ea. Rincón de Ajó.

Variabilidad de las características: El horizonte "O" de 2-5 cm. de espesor; horizonte An, de 3-8 cm. y colores que van del 10YR 3.5/1 al 3/1, 3/2 en húmedo; Btssn1 de 11-24 cm. y colores de 10YR 2/1 a 3/1, contenido de arcilla de 65-70 %; Btssn2 de 18-23 cm. y colores gley pardo grisáceo oscuro (2.5Y 4/2) en húmedo, gris oliva (5Y 4/2) en seco.

Fases: Fuertemente salinas, descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: General Madariaga, Vieytes, El Tordillo, General Lavalle.

Suelos asociados: Formando complejo de suelos con El Tordillo, Ea. La Victoria, El Tuyú, Gral. Lavalle, Mal Abrigo, Estación Segurola, Pinamar, Gral. Madariaga, Santa Teresita, Villa Roch, Bahía de Samborombón y en forma de consociación con 100 % de Gral. Conesa.

Distribución geográfica: Partidos de Castelli, Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Pinamar, Dolores, Tordillo, Maipú. Mosaicos 3557-32, 33; 3757-3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad muy lenta, capa freática 90-100 cm.

Uso y vegetación: Ganadero, no apto para cultivos. Pelo de chancho (Distichlis sp.), Yerba del mosquito (Phila canescens), Malvilla (Sida leprosa), vegetación halófila.

Capacidad de uso: VII ws


Limitaciones de uso: Drenaje deficiente, anegamiento, alcalinidad sódica, salinidad moderada, el Bt fuertemente textural.

Índice de productividad según la región climática: 6.62 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizontes nátrico y argílico entre los 7 y 77 cm. con propiedades vérticas, planos de fricción, "slickensides" abundantes, grietas de 50 mm. de ancho, subhorizonte Bt, con 66.8 a 77.6 % de arcilla.

Descripción del perfil típico:

16/389 C
Fecha de muestreo: 12 de Diciembre de 1974
Reconocedores: Jacyszyn - Díaz R. - Costa



On 4-0 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris muy oscuro (10YR 3/1) en seco; franco limoso; granular y migajosa; duro; ligeramente firme; no plástico, no adhesivo; abundantes raíces; límite inferior abrupto, suave.

An 0-3 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris muy oscuro (10YR 3/1) en seco; arcilloso; bloques angulares medios, fuertes, que rompe a bloques angulares finos; extremadamente duro; firme; plástico, adhesivo; abundantes raíces; límite inferior abrupto, ondulado.

Btssn1 3-19 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; arcilloso; columnar gruesa fuerte, que rompe a prismas gruesos; extremadamente duro; firme; plástico, adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos; abundantes "slickensides"; abundantes raíces; límite inferior claro, irregular.

Btssn2 19-48 cm; pardo grisáceo oscuro (2,5Y 4/2) en húmedo; prismas compuestos, medios gruesos, fuertes, que rompe a bloques angulares gruesos, fuertes; duro; firme; plástico, adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos; moteados de hierro comunes, medios y precisos; formaciones especiales: gley y grietas de 1 cm. de diámetro x 50 cm. de longitud; abundantes "slickensides"; raíces comunes; escasa reacción al carbonato de calcio en la masa; límite inferior claro, suave.

2BCcnz 48-77 cm; (5Y 5/2) en húmedo; gris oliva (5Y 4/2) en seco; arcilloso; prismas gruesos fuertes a moderados, que rompe a bloques angulares; duro; firme; plástico, adhesivo; concreciones de hierro-manganeso; moteados de hierro abundantes, medios y sobresalientes; escasos slickensides; escasas raíces; débil reacción al carbonato de calcio en la masa; límite inferior abrupto, irregular.

2Ccnz 77-100 cm; gris oliva (5Y 5/2) en húmedo; arcilloso; prismas gruesos fuertes, que rompe a bloques angulares fuertes; firme; muy plástico, muy adhesivo; abundantes concreciones de hierro-manganeso; moteados de hierro abundantes, medios y sobresalientes; escasas raíces; débil reacción al carbonato de calcio en la masa.

Observaciones: El horizonte On no fue muestreado; el 2BCcnz, tiene tonalidades gley de color pardo grisáceo (2,5Y 5/2). Evidencia procesos pedogenéticos típicos de argiturbación, característica principal de los suelos con arcillas expandibles, pequeñas concentraciones de sales cristalizadas de 1 cm. de diámetro. Otros perfiles: 176 C; 174 C; 8/2420 C.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	An	Btssn1	Btssn2	2BCcnz	2Ccnz
Profundidad (cm)	1-3	5-16	23-45	52-75	80-95
Mat. orgánica (%)	40,32	7,79	0,89	0,25	-
Carbono total (%)	23,39	4,52	0,52	0,15	-
Nitrógeno (%)	2,088	0,632	0,077	-	-
Relación C/N	11	7	7	-	-
Arcilla <2 µ (%)	56,2	66,8	77,6	76,0	71,5
Limo 2-20 µ (%)	26,6	26,1	15,9	17,9	21,3
Limo 2-50 µ (%)	38,8	29,7	17,9	17,1	23,2
AMF 50-75 µ (%)	3,1	2,0	2,1	2,1	1,7
AMF 75-100 µ (%)	1,7	1,3	2,2	1,9	1,5
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	0	0	vest.	2,8	1,8
Eq.humedad (%)	40,3	57,6	85,9	85,0	73,3
Re. pasta Ohms	792	513	308	150	235
Cond. mmhos/cm	3,29	3,38	11,36	15,63	20,83
pH en pasta	6,0	6,6	7,7	8,0	7,9
pH H2O 1:2,5	6,6	7,4	8,2	8,4	8,2
pH KCL 1:2,5	5,3	6,2	7,1	7,5	7,4
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	27,3	20,0	13,0	17,2	24,6
Mg++ m.eq./100gr	14,5	18,3	23,7	24,7	37,8
Na+ m.eq./100gr	3,7	9,1	80,0	116,0	156,0
K+ m.eq./100gr	4,7	3,9	5,6	4,3	6,3
H+ m.eq./100gr	28,9	11,6	-	-	-
Na (% de T)	6	17	-	-	-
Suma de Bases	50,2	51,3	-	-	-
CIC m.eq./100gr	57,9	54,5	-	-	-
Sat. con bases (%)	87	94	-	-	-