CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Pandorga (LPg)

Descripción

Es un suelo muy oscuro, profundo, con fuerte grado de desarrollo, su aptitud es agrícola-ganadero, se encuentra en un paisaje de lomas con ondulaciones marcadas y bajos, en posición de loma en la Subregión Pampa Austral Interserrana, moderadamente bien drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos franco arenosos; fuerte alcalinidad sódica entre 55 y 126 cm, leve a moderada salinidad entre 74 a 126 cm con pendientes de 0.5 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natrudol típico, limosa fina, illítica, profunda, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).
Hapludol thapto nátrico, limosa fina, illítica, térmica (ADA-INTA-Soil Taxonomy V.1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 38° 42' 8.41". Longitud W: 59º 22' 8.08". Altitud: 16 msnm; Ea. La Pandorga, a 15,7 km al S de la localidad de Energía, partido de Necochea, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3960-17-1, La Pandorga.

Variabilidad de las características: Epipedón mólico Ap/A/An, entre 50 y 65 cm, "solum" 90 a 128 cm.

Fases: Algo pobremente y pobremente drenada; débilmente salina por depresión y sodicidad superficial delgada por depresión.

Series similares: La Tigra, Ayacucho, Monte, Rauch, Apeadero Las Vaquerías, El Carmen, General La Madrid, La Nueva Esperanza.

Suelos asociados: Formando Complejos, Asociaciones y Consociación de series con Estancia La Salada, Necochea, Paraje Los Ángeles, Mechongué, Nicanor Otamendi, La Otomana, La Malacara.

Distribución geográfica: Partidos de Necochea y San Cayetano. Fotomosaicos 3960-11 y 17.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada, profundidad de la capa freática >1,30 m.

Uso y vegetación: Agrícola-ganadero. Cultivo de girasol.

Capacidad de uso: IV ws


Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica, salinidad.

Índice de productividad según la región climática: 43,3 (D); 35,7 (E).

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (Ap), régimen de humedad údico, horizonte nátrico (acumulación >15 % Na+), horizonte argílico (arcilla % relación B/A >1.2), saturación de bases (entre 76 a 100 %).

Descripción del perfil típico:

25/1254 C
Fecha de muestreo: 12 de Noviembre de 1983



Apn 0-20 cm; negro a pardo muy oscuro (10YR 2.5/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares gruesos, moderados, que rompe a bloques subangulares medios, finos y granular; suelto; friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.

An 20-36 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares gruesos, moderados, que rompe a bloques subangulares medios, finos y granular; suelto; friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.

An/En 36-55 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, gruesos, débiles, que rompe en bloques subangulares medios, finos y granular; ligeramente duro; friable; no plástico, no adhesivo; raíces comunes; formaciones especiales, poros abundantes; límite inferior abrupto, ondulado.

2Btn 55-74 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; prismas compuestos regulares, medios, moderados, que rompe a prismas irregulares medios; firme; ligeramente plástico, adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.

3BCnz 74-99 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, gruesos moderados, que rompe a bloques subangulares medios y finos; friable; no plástico, no adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; escasos barnices húmico-arcillosos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.

3Cnz 99-126 cm. a + cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares gruesos, débiles que rompe a bloques subangulares y granos simple; suelto; friable; no plástico, no adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; vestigios de raíces.

Observaciones: Otros perfiles: 16/394 C; a 20 km. al sur de General Lavalle (Ea. Los Hinojales).

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

Horizontes	Apn	An	An/En	2Btn	3BCnz	3Cnz
Profundidad (cm)	0-20	20-36	36-55	55-74	74-99	99-126
Mat. orgánica (%)	6.79	5.37	1.41	0.60	0.29	0.18
Carbono total (%)	3.94	3.12	0.82	0.35	0.17	0.11
Nitrógeno (%)	0.414	0.262	0.078	0.056	-	-
Relación C/N	9.5	11.9	10.5	6.2	-	-
Fósforo (PPM)	8.3	2.9	1.2	0.7	1.1	1.3
Arcilla <2 µ (%)	18.1	18.8	14.0	28.1	19.0	18.3
Limo 2-20 µ (%)	14.9	13.0	10.4	7.3	7.4	7.4
Limo 2-50 µ (%)	29.7	28.7	28.5	21.0	21.5	22.0
AMF 50-75 µ (%)	24.5	25.5	28.3	25.5	28.6	25.6
AMF 75-100 µ (%)	15.0	14.0	17.0	14.7	11.1	20.2
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	12.3	12.9	12.0	10.5	19.7	13.6
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	-	-	-
Eq.humedad (%)	22.2	21.0	14.9	29.8	21.0	19.8
Re. pasta Ohms	1481	2783	5118	1257	987	461
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	3.3	7.6
pH en pasta	4.7	5.4	6.8	7.5	8.0	8.2
pH H2O 1:2,5	5.0	5.8	7.2	8.5	8.7	8.7
pH KCL 1:2,5	4.3	5.0	5.8	6.7	6.8	6.6
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	12.2	13.9	6.6	10.4	5.7	4.1
Mg++ m.eq./100gr	3.7	4.0	4.6	5.6	6.2	3.7
Na+ m.eq./100gr	0.9	1.1	1.6	6.3	7.8	9.4
K+ m.eq./100gr	3.0	2.3	1.3	2.8	2.7	3.0
H+ m.eq./100gr	11.9	8.1	2.8	-	-	-
Na (% de T)	3.4	4.1	12.0	26.0	38.0	50.0
Suma de Bases	19.8	21.3	14.0	25.1	22.4	20.2
CIC m.eq./100gr	25.9	26.5	13.2	23.8	20.3	18.8
Sat. con bases (%)	76	80	100	100	100	100