CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# La Escocia (LEs)

## Descripción

Es un suelo gris muy oscuro, moderadamente profundo y de aptitud ganadera que se encuentra en posición de tendido (relieve subnormal) del derrame con "tosca" generalizada de la Subregión Sierra y Pedemonte del Sistema de Tandilia, pobremente drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos finos, con fuerte grado de desarrollo, alcalino después de los 42 cm., no salino, con pendientes de 0-1 %.

**Clasificación taxonómica:** Natrudol petrocálcico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 2006).
Natracuol típico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (USDA-7ª Aprox. ST V.1975).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 36º 41' 28.15". Longitud W 60º 13' 42.81". Altitud 133 m.s.n.m. Ea. Mi Recuerdo, a 15.9 km al N de la localidad de Sierra Chica, partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Fotomosaico I.G.M. 3760-15-2, Estación Teniente General Miñana.

**Variabilidad de las características:** Espesor del A (15 a 22 cm.), con Chromas más oscuros que (10YR 3/1) en húmedo; franco; profundidad del Bt (50 cm.), franco arcilloso a arcilloso, alcalinidad entre los 20 a 50 cm., la profundidad del "solum" varía entre 42 a 100 cm.

**Fases:** Por alcalinidad, anegabilidad.

**Series similares:** Santa Paula.

**Suelos asociados:** Formando asociaciones y complejos con Balcarce, Blanca Chica, Chelforó, Coronel Bunge, Ea. Aldecoa, Estación Quilcó, Gral. Guido, Gral. Lamadrid, La Alianza, La Barrancosa, La Delicia, La Loma, La Nueva Esperanza, La Tigra, Las Margaritas, Las Martinetas, Miñana, Napaleufú, Olavarría, Sierra Chica y Tandileufú.

**Distribución geográfica:** Partidos de Azul, Bolívar, General Alvear, Gral. Lamadrid, Laprida, Tapalqué, en las Hojas I.G.M. 3760-7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27.

**Drenaje y permeabilidad:** Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad muy lenta, napa freática profunda.

**Uso y vegetación:** Ganadero. Pasturas naturales: Cebadilla (Bromus unioloides), Artemisia (Artemisia verlotorum), Cardo (Cynara cardunculus), Plumerillo (Oxipetalum solanoides).

**Capacidad de uso:** VI ws


**Limitaciones de uso:** Drenaje, alcalinidad y profundidad.

**Índice de productividad según la región climática:** 11,2

**Rasgos diagnósticos:** Régimen de humedad údico, epipedón mólico, horizonte argílico con 37 cm. de espesor, (Rel.arc. B/A >1.2), horizonte nátrico (19 % de Na+), horizonte petrocálcico 2Ckkm ("plancha de tosca") dentro del metro de profundidad.

## Descripción del perfil típico:

**7/1581 C**
**Fecha de muestreo: 25 de Febrero de 1971**




**A** 0-21 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris oscuro (10YR 4/1) en seco; franco limoso; bloques subangulares medios fuertes; friable; moteados comunes, finos y precisos; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior abrupto y ondulado.

**Bt** 21-42 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas compuestos irregulares, medios y moderados; ligeramente firme; plástico; adhesivo; moteados comunes finos y débiles; raíces escasas; límite inferior claro y ondulado.

**Btkn** 42-58 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas compuestos irregulares, medios, moderados; firme; muy plástico, adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio; abundantes barnices húmico arcillosos; moteados comunes finos y débiles; límite inferior abrupto y ondulado.

**2Ckkm** 58-100 cm; "tosca" en plancha.

**Observaciones:** El perfil está interrumpido entre 50 y 100 cm. de profundidad por una plancha de tosca cementada. Otros perfiles 23/802/C.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | A | Bt | Btkn | 2Ckm |
|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 3-10 | 26-38 | 42-58 | 58-100 |
| Mat. orgánica (%) | 6,17 | 1,45 | 0,57 | - |
| Carbono total (%) | 3,58 | 0,84 | 0,34 | - |
| Nitrógeno (%) | 0,301 | 0,076 | 0,053 | - |
| Relación C/N | 12 | 11 | 7 | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 24,3 | 42,3 | 54,0 | - |
| Limo 2-20 µ (%) | 29,5 | 24,9 | 21,6 | - |
| Limo 2-50 µ (%) | 56,9 | 42,5 | 31,5 | - |
| AMF 50-75 µ (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| AMF 75-100 µ (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| AMF 50-100 µ (%) | 15,1 | 14,4 | 13,6 | - |
| AF 100-250 µ (%) | 3,7 | 0,8 | 0,6 | - |
| AM 250-500 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG 500-1000 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMG 1-2 mm (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calcáreo (%) | 0 | vest. | 0,3 | - |
| Eq.humedad (%) | 30,5 | 43,7 | 65,1 | - |
| Re. pasta Ohms | 4410 | 1940 | 1455 | - |
| Cond. mmhos/cm | - | - | - | - |
| pH en pasta | 6,5 | 8,0 | 8,3 | - |
| pH H2O 1:2,5 | 7,0 | 8,7 | 9,2 | - |
| pH KCL 1:2,5 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | - |
| Cationes de cambio | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 14,7 | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 5,8 | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 0,9 | 5,0 | 8,2 | - |
| K+ m.eq./100gr | 1,3 | 2,0 | 2,6 | - |
| H+ m.eq./100gr | 6 | - | - | - |
| Na (% de T) | 3,89 | 13 | 19 | - |
| Suma de Bases | 22,7 | - | - | - |
| CIC m.eq./100gr | 23,1 | 38,6 | 42,3 | - |
| Sat. con bases (%) | 79 | - | - | - |