CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Perfiles Representativos de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# La Esmeralda

## Descripción

La Esmeralda pertenece a un grupo de suelos que aparecen en el segundo nivel escalonado interfluvial (Nei2) del noreste del partido. Se reconocen dentro de un sector suave a moderadamente ondulado, con pendientes que oscilan entre el 1 y el 3 %, donde ocupan posición de lomas y están desarrollados a partir de sedimentos arenosos. Son excesivamente drenados y profundos.

En este perfil se diferencian dos horizontes, denominados A y C, ambos arenosos, con estructura masiva y pH cercano a la neutralidad. El primero es ligeramente más oscuro que el segundo, aunque con una provisión de materia orgánica muy baja. Ninguno de los dos presenta reacción de los carbonatos libres en la masa.

**Clasificación taxonómica:** Cuarzipsament típico (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 38º 53' 35.0". Longitud W 62º 28' 40.7". El perfil La Esmeralda fue reconocido a 5.8 km al NE de la localidad de Ombucta.


**Drenaje y permeabilidad:** Algo excesivamente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad rápida.

**Limitaciones de uso:** Clima, peligro de erosión eólica.

**Índice de productividad:** 26

## Descripción del perfil típico:

**C-54**
**Fecha de muestreo: Noviembre de 1989**
**Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca**




**A** 0-25 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; arenoso; masivo; suelto en seco; no plástico, no adhesivo; muy débilmente ácido; raíces comunes; límite claro, suave.

**C** 25-150 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco; arenoso; masivo; suelto en seco; no plástico, no adhesivo; muy débilmente ácido.

**Observaciones:** Cobertura vegetal 80 %.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Número de Laboratorio | 35501 | 35502 |
|---|---|---|
| Horizontes | A | C |
| Profundidad (cm) | 0-25 | 25-150 |
| Factor de Humedad | 1.00 | 1.00 |
| Materia Orgánica (%) | 0.27 | 0.17 |
| Carbono Orgánico (%) | 0.16 | 0.09 |
| Nitrógeno (%) | - | - |
| Relación C/N | - | - |
| Fósforo (ppm) | 26.4 | 11.5 |
| Arcilla <2 µ (%) | - | 1.2 |
| Limo 2-20 µ (%) | 1.5 | 3.0 |
| Limo 2-50 µ (%) | 2.7 | 6.2 |
| AMF 50-75 µ (%) | 0.6 | 0.6 |
| AMF 75-100 µ (%) | 3.3 | 2.9 |
| AMF 50-100 µ (%) | 3.9 | 3.5 |
| AF 100-250 µ (%) | 92.2 | 87.5 |
| AM 250-500 µ (%) | 1.2 | 1.6 |
| AG 500-1000 µ (%) | 0.0 | 0.0 |
| AMG 1-2 mm (%) | 0.0 | 0.0 |
| Calcáreo (%) | - | - |
| Equivalente de Humedad (%) | 2.6 | 3.1 |
| Re. pasta. Ohms | - | - |
| Conductividad eléctrica (mS/cm) | 0.08 | 0.06 |
| pH en pasta de saturación | 6.6 | 6.6 |
| pH H2O (1:2.5) | 7.1 | 7.1 |
| pH KCL (1:2.5) | 6.0 | 6.0 |
| Cationes de Cambio | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 3.8 | 2.8 |
| Mg++ m.eq./100gr | 1.1 | 1.2 |
| Na+ m.eq./100gr | 0.2 | 0.1 |
| K+ m.eq./100gr | 0.6 | 0.6 |
| H+ m.eq./100gr | 1.2 | 0.8 |
| PSI (%) | 3 | 2 |
| Agua de Saturación (%) | 29 | 25 |
| Suma de bases [cmol(+)/kg] (S) | 5.7 | 4.7 |
| CIC [cmol(+)/kg] (T) | 5.9 | 4.8 |
| Saturación de bases (%) (S/T) | 97 | 98 |
| % de Saturación (S+H) | 83 | 85 |