CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Lazzarino (Lz)

## Descripción

La serie Lazzarino es un suelo desarrollado bajo un proceso eólico de acumulación - deflación. Aparece principalmente en los sectores planos extendidos de escaso desagüe vinculados a los sistemas de lagunas más importantes (La Picaza, Martín García, etc.) o en ciertos bajos elongados que se alternan con cordones medanosos.

El horizonte superficial es pardo grisáceo oscuro, con una provisión de materia orgánica algo superior al 2 %, que decrece rápidamente al 1 % a partir de los 20 cm de profundidad; la textura es franca a franco arenosa (con 15 % de arcilla); la consistencia es friable y la reacción neutra.

A los 30 cm de profundidad se encuentra un horizonte AC, considerado el sedimento de depósito más reciente, que ha dado origen a la capa superficial. Se extiende unos 15 cm, es de textura franca, estructura masiva y reacción alcalina.

Abruptamente, a partir de los 45 cm, se produce un cambio textural y se encuentra el horizonte 2Bt (con 23 % de arcilla) que representa el comienzo de un perfil desarrollado más antiguamente. Este horizonte presenta una estructura prismática fuerte, con abundantes moteados de hierro y altos valores de sodio en el complejo de intercambio. En forma gradual va disminuyendo el contenido de arcillas y aparecen concreciones de tosca.

A los 100 cm se alcanza el sustrato (horizonte C) de color pardo, de textura franco arenosa y fuerte reacción alcalina.

**Clasificación taxonómica:** Hapludol thapto nátrico, limosa fina (sin ubicación en el Soil Taxonomy V. 1975. Adaptación en la clasificación de los suelos argentinos, Mapas-INTA).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 33º 49' 16" y Longitud W 62º 3' 0". Altitud 110 m.s.n.m. a 11,5 km al SW de la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López, provincia de Santa Fe. Mosaico IGN 3363-35-2.

**Variabilidad de las características:** Generalmente se encuentran estos perfiles saturados de agua por el drenaje de las zonas altas circundantes y por ascenso de la capa freática en épocas lluviosas.

**Fases:** Se reconocieron en diversos grados por anegamiento y fueron descriptas en las unidades cartográficas.

**Series similares:** La Zoraida; Rawson.

**Suelos asociados:** Amenábar, Aarón Castellano, San Gregorio, María Teresa, Santa Isabel, Santa Ana, Vedia, Fortín Tiburcio, Saforcada y Lincoln.

**Distribución geográfica:** Partidos de Leandro N. Alem, General Pinto y General Villegas, en las hojas I.G.M. 3363-5 y 6; 3563-9, 11, 12 y 18 .

**Drenaje y permeabilidad:** Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta.

**Uso y vegetación:** Pastura para ganadería, vegetación natural.

**Capacidad de uso:** IV ws


**Limitaciones de uso:** Excesos de agua, provenientes de los sitios vecinos más altos, ascenso de la capa freática en las épocas lluviosas, drenaje y alcalinidad sódica.

**Índice de productividad según la región climática:** 35,0 (A)

**Rasgos diagnósticos:** Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizontes álbico, argílico y nátrico.

## Descripción del perfil típico:

**173 C**




**A1** 0-19 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite inferior claro y suave.

**A2** 19-32 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares medios moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite inferior claro y ondulado.

**AC** 32-44 cm; pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco; masiva; muy friable; límite inferior abrupto y suave.

**2Bt** 44-80 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; prismas compuestos medios fuertes que rompen a bloques angulares irregulares medios; firme; plástico y adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; límite inferior claro y ondulado.

**2BC** 80-103 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; bloques angulares irregulares medios y moderados; friable; plástico y adhesivo; concreciones de calcáreo comunes; límite inferior gradual y ondulado.

**2C** 103-120; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; bloques angulares irregulares débiles y finos; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes finos y débiles.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | A1 | A2 | AC | 2Bt | 2BC | 2C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 5-15 | 15-30 | 35-40 | 50-70 | 90-100 | 100-120 |
| Mat. orgánica ( %) | 2,12 | 1,05 | 0,51 | 0,10 | - | - |
| Carbono total ( %) | 1,23 | 0,61 | 0,30 | 0,06 | - | - |
| Nitrógeno ( %) | 0,118 | 0,076 | 0,053 | - | - | - |
| Relación C/N | 10 | 8 | 6 | - | - | - |
| Arcilla <2 µ ( %) | 17,8 | 14,6 | 11,5 | 22,9 | 18,4 | 16,8 |
| Limo 2-20 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| Limo 2-50 µ ( %) | 35,9 | 34,9 | 38,5 | 33,5 | 33,8 | 31,9 |
| AMF 50-75 µ ( %) | 28,9 | 27,5 | 28,0 | 24,1 | 29,6 | 26,1 |
| AMF 75-100 µ ( %) | 18,3 | 21,4 | 19,2 | 17,9 | 16,7 | 22,9 |
| AMF 50-100 µ ( %) | 47.2 | 48.9 | 47.2 | 42.0 | 46.3 | 49.0 |
| AF 100-250 µ ( %) | 1,1 | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 1,5 | 2,3 |
| AM 250-500 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| AG 500-1000 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| AMG 1-2 mm ( %) | - | - | - | - | - | - |
| Calcáreo ( %) | 0 | 0 | 0 | vest. | vest. | vest. |
| Eq.humedad ( %) | 18,1 | 15,3 | 12,3 | 25,4 | 18,9 | 16,3 |
| Re. pasta. Ohms | - | - | - | - | - | - |
| Cond. mmhos/cm | - | - | - | - | - | - |
| pH en pasta | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 9,0 |
| pH H2O 1:2,5 | 7,4 | 7,3 | 8,4 | 9,1 | 9,5 | 9,8 |
| pH KCL 1:2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Cationes de Cambio | | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 5,2 | 5,9 | 5,2 | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 3,3 | 1,6 | 3,8 | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 5,4 | 3,3 | 8,6 |
| K+ m.eq./100gr | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 5,8 | 2,3 | 9,8 |
| H+ m.eq./100gr | 4,9 | 3,5 | - | - | - | - |
| Na ( % de T) | 3,2 | 5,0 | 23,0 | 27,0 | 29,0 | 68,0 |
| Suma de bases | 12,0 | 10,9 | 13,2 | - | - | - |
| CIC m.eq./100gr | 12,2 | 11,3 | 7,3 | 20,0 | 11,4 | 9,8 |
| Sat. con bases ( %) | 98 | 97 | 100 | - | - | - |