CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Los Mochos (LM)

Descripción

Es un suelo gris pardo claro, poco profundo, de aptitud ganadera, se encuentra en loma plana (Glasis de ladera s/Tricart) en posición de microdepresiones en la Subregión Pampa Ondulada baja, transición a la Subregión de la Pampa Deprimida, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos loéssicos limosos finos, alcalino sódico y débilmente salino entre los 12 cm. a 54 cm. de profundidad, con pendientes de 0-0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf típico fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2006).
Natrudalf típico, fina, illítica, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud: S 35° 14' 46.64''. Longitud: W 58º 19' 19.66''. Altitud: 18 m.s.n.m. a 7,9 km. al ENE de la Estación de Loma Verde, partido de Brandsen, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3557-19-3, Loma Verde.

Variabilidad de las características: Epipedón ócrico de 15 cm; parte del 2Btn, modificado en AB-BA; colores de 10YR 6/1-5/2; espesor del 2Btn, 40-60 cm; Na >85 %. Perfiles decapitados.

Fases: Drenaje, anegabilidad, pendiente, erosión en distintos grados.

Series similares: Gowland; Las Heras, La Paulina.

Suelos asociados: Formando complejos con Udaondo, Brandsen y asociaciones con Abott, San Luis Beltrán.

Distribución geográfica: Partidos de Brandsen, San Vicente, General Paz. Fotomosaicos 3557-19, 20, 25 y 26.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, lento, permeabilidad lenta, anegamiento ocasional.

Uso y vegetación: Ganadería. Pradera natural (60 %): Trébol blanco (Trifolium repens), Cebadilla (Bromus uniloides), Poa (Poa pratensis), Cola de zorro (Cortadeira selloana), Hinojo (Foeniculum vulgare).

Capacidad de uso: VI ws


Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica, salinidad moderada, el 2Btn-2Btkn fuertemente textural, napa freática a 1.50 m.

Índice de productividad según la región climática: 14,0 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico, régimen de humedad ácuico, horizonte argílico (Rel.arc. B/A 1.88), horizonte nátrico con un (PSI) mayor del 15 %.

Descripción del perfil típico:

9/1433 C
Fecha de muestreo: 22 de Octubre de 1969
Reconocedores: Hurtado - Serpa



An 0-10 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris pardo claro (10YR 6/2) en seco; franco arcilloso; bloques subangulares medios moderados que rompe a bloques menores; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes finos y precisos; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

2Btn 10-25 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; arcilloso; simicolumnar; muy duro; firme; plástico; adhesivo; concreciones abundantes de calcio; "clayskins" abundantes; moteados comunes, medios y precisos; escasas raíces; límite abrupto y suave.

2Btkn 25-60 cm; pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arcillo limoso; prismas compuestos irregulares medios fuertes que rompen a bloques subangulares; duro; firme; plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes y escasas concreciones de hierro; "clayskins" comunes; moteados comunes, medios y precisos; reacción moderada en la masa; límite claro y suave.

3BCn 60-140 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; rosado (7,5YR 7/4) en seco; franco; bloques subangulares medios y débiles; duro; firme; ligeramente plástico; no adhesivo; concreciones de carbonato de calcio comunes; moteados escasos, finos y débiles; reacción a los carbonatos moderada en la masa; límite claro y suave; ligera cementación.

3Cknx 140-175 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; rosado (7,5YR 7/4) en seco; franco; cementado; ligeramente duro; friable; no plástico; no adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio.

Observaciones: Evolución del suelo sobre sedimentos eólicos Postplatense; Postquerandinense; Pampiano superior.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	An	2Btn	2Btkn	3BCn	3Cknx
Profundidad (cm)	3-10	12-23	42-54	75-95	150-175
Mat. orgánica (%)	2,79	1,67	0,39	0,20	0,25
Carbono total (%)	1,62	0,97	0,23	0,12	0,15
Nitrógeno (%)	0,162	0,108	-	-	-
Relación C/N	10	9	-	-	-
Fósforo ppm	-	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	27,4	51,7	30,2	24,6	26,7
Limo 2-20 µ (%)	19,8	12,7	26,5	24,6	23,0
Limo 2-50 µ (%)	46,9	35,3	50,4	47,2	49,7
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	24,3	12,3	18,2	22,7	-
AMF 50-100 µ (%)	24,3	12,3	18,2	26,6	22,7
AF 100-250 µ (%)	1,4	0,7	1,2	1,6	0,9
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	vest.	vest.	0	0
Eq.humedad (%)	42,6	75,8	40,5	33,9	32,4
Re. pasta Ohms	1401	794	747	1401	1961
Cond. mmhos/cm	-	2,14	1,94	-	-
pH en pasta	7,1	8,2	8,2	7,7	7,5
pH H2O 1:2,5	8,1	9,2	9,1	8,6	8,5
pH KCL 1:2,5	6,5	7,3	7,1	6,7	6,5
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	7,4	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	5,8	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	5,2	15,0	16,6	9,9	8,8
K+ m.eq./100gr	3,4	4,8	4,6	3,4	3,3
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-	-
Na (% de T)	26	45	59	49	45
V.S m.eq./100gr	21,8	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	20,0	33,4	28,1	20,1	19,2
Sat. con bases (%)	100	-	-	-	-