CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Maipú (Mpu)

Descripción

Es un suelo pardo oscuro, profundo, de aptitud agrícola, que se encuentra en un paisaje de lomas acordonadas y lomas planas extendidas, con relieve normal en la Subregión geomorfológica Pampa Deprimida Sector Oriental, en posición de loma, moderadamente bien drenado, con horizontes Bt, fuertemente textural y características vérticas, no alcalino, no salino, con pendientes de 0,5-1 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol vértico, fina, illítica, térmica (Key to Soil Taxonomy V.2014).
Hapludol thapto árgico (Adaptación mapas - INTA a 7ª Aproximación S.T. V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 37º 3' 24". Longitud W: 57º 9' 47". Altitud: 7 msnm. Estancia El Amanecer, a 6,6 km al SW de la ciudad y cabecera del Partido de General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Fotomosaico IGM 3757-21-2, Estación Juancho.

Variabilidad de las características: Se pueden encontrar perfiles con un horizonte E que varía entre 10-12 cm, puede haber una pequeña transición (espesores variables).

Fases: Fueron reconocidas fases por erosión.

Series similares: Ramallo, Peyrano, Portela, Chascomús, Tres Esquinas.

Suelos asociados: Cobo, Juancho, Estación Invernadas, Las Armas, Coronel Vidal, Monsalvo, Estancia Tarrhué, Chelforó, General Guido, Ayacucho, General Pirán, Santo Domingo, Napaleufú.

Distribución geográfica: Partidos de Ayacucho, Maipú, General Juan Madariaga y norte de Balcarce, distribuidas en hojas IGM 3557-13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Pastura natural: Rye grass (Lolium multiflorum), Trebol blanco (Trifolium repens) Malezas: Cardo Negro (Cirsium vulgare), Rama negra (Conyza bonariensis), Paspalum dilatatum, Altamisa.

Capacidad de uso: II ws


Limitaciones de uso: Drenaje y permeabilidad.

Índice de productividad según la región climática: 72,9 (B)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizontes argílicos (2Btss1 y 2Btss2) con una relación de arcilla B/A 1,7 y características vérticas, con más del 30 % de arcilla y presencia de caras de fricción "slickensides".

Descripción del perfil típico:

8/2410 C
Fecha de muestreo: 5 de Agosto de 1972
Reconocedores: Rizzolo - Arteaga - Magneres



Ap 0-26 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco; franco arcilloso; bloques subangulares medios y débiles que rompe a granular; ligeramente duro; friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; formaciones especiales: presencia de "krotovinas"; límite claro, suave.

E 26-44 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco; bloques subangulares medios débiles, que rompe a bloques menores; ligeramente duro; muy friable; no plástico, no adhesivo; moteados de Fe escasos, finos, débiles; raíces comunes; límite abrupto, ondulado.

Btss1 44-65 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco; arcilloso; semi-columnar que rompe a prismas medios débiles; extremadamente duro; firme; muy plástico, adhesivo; barnices "clayskins" abundantes; "slickensides" comunes; concreciones de Fe-Mn escasas; raíces escasas; límite claro, suave.

Btss2 65-98 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arcilloso; prismas medios, débiles que rompe a bloques subangulares medios, fuertes; extremadamente duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; barnices "clayskins" escasos; "slickensides" comunes; concreciones de Fe-Mn escasas; límite gradual, suave.

2BCx 98-145 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; bloques subangulares, medios, fuertes ; extremadamente duro; muy firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, finos, débiles; formaciones especiales: parte inferior ligeramente cementado con Fe.

Observaciones: Se presenta el fondo del perfil ligeramente cementado con Fe, carácter de fragipán (BCx).

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

Horizontes	Ap	E	Btss1	Btss2	2BCx
Profundidad (cm)	5-20	30-40	50-60	75-90	110-120
Mat. orgánica (%)	7,39	1,68	0,99	0,82	-
Carbono total (%)	4,29	0,98	0,58	0,49	-
Nitrógeno (%)	0,374	0,072	0,069	0,052	-
Relación C/N	12	14	9	9	-
Arcilla <2 µ (%)	29,1	18,8	41,0	33,8	24,4
Limo 2-20 µ (%)	17,7	12,3	9,8	12,7	13,9
Limo 2-50 µ (%)	36,7	37,6	28,1	32,9	34,5
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	30,5	38,4	28,5	31,8	37,0
AF 100-250 µ (%)	3,7	4,5	2,4	1,5	3,7
AM 250-500 µ (%)	0	0,7	0	0	0,4
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	-	-	-	-	-
Eq.humedad (%)	26,2	13,6	29,4	26,7	21,2
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,8	6,2	6,0	6,6	6,5
pH H2O 1:2,5	6,0	6,4	6,8	7,2	7,2
pH KCL 1:2,5	5,2	5,5	5,3	5,5	5,5
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	16,7	8,0	14,8	13,0	10,6
Mg++ m.eq./100gr	3,2	1,6	5,5	5,3	3,7
Na+ m.eq./100gr	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6
K+ m.eq./100gr	1,3	0,5	1,3	0,9	0,8
H+ m.eq./100gr	10,6	4,2	6,4	5,2	5,4
Na (% de T)	2,0	4,0	3,0	3,0	4,0
Suma de Bases	21,8	10,6	22,3	19,8	15,7
CIC m.eq./100gr	26,2	11,6	25,1	20,6	16,7
Sat. con bases (%)	83	91	89	96	94