CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Olavarría (Ola)

Descripción

Es un suelo negro a pardo oscuro, moderadamente profundo, con aptitud agrícola, se encuentra en un paisaje de lomas y pendientes inclinadas, en la Subregión de las Sierras, en posición de loma, formado sobre sedimentos loéssicos sobre una costra calcárea de extensión regional "tosca", no salino y sin alcalinidad.

Clasificación taxonómica: Argiudol petrocálcico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (Soil Taxonomy 2014).
Argiudol típico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (USDA- 7ª Aprox. ST V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 36º 56' 40.84". Longitud W 60º 25' 34.73". Altitud 188 m.s.n.m. a 10,5 km al WSW de la plaza de Olavarría y a 5 km del casco de la Estancia Las Dos Hermanas, partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3760-15-3, Olavarría.

Variabilidad de las características: Es variable la profundidad en la que aparece la costra calcárea.

Fases: Por pendiente y por drenaje.

Series similares: La Retranca.

Suelos asociados: Tandil y Cinco Cerros.

Distribución geográfica: Partidos de Olavarría y Tapalqué.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento medio a rápido, permeabilidad moderada.

Uso y vegetación: Agrícola. Vegetación natural: Abre Puño (Centaurea calcitrapa), Cardos (Cynara cardunculus), Raygrass (Lolium multiflorum), Tréboles (Triflolium repens) y Cirsium vulgare.

Capacidad de uso: IV es


Limitaciones de uso: Moderada profundidad del solum (horizonte petrocálcico a los 70 cm).

Índice de productividad según la región climática: 53,9 (B)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte argílico con más de 30 % de arcilla en todo el perfil y >del 40 % en el Bt, apoyado sobre una costra Calcárea (horizonte petrocálcico 2Ckkm que comienza a los 66 cm de profundidad y se prolonga con extrema dureza.

Descripción del perfil típico:

7/1753 C
Fecha de muestreo: 25 de Mayo de 1971
Reconocedores: Moscatelli - Wermster



Ap 0-14 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios moderados; friable; abundantes raíces; límite inferior claro y suave.

A 14-25 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios débiles y granulares; friable; escasos barnices de arcilla; raíces comunes; límite inferior claro y suave.

BA 25-32 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas irregulares medios moderados que rompen a prismas menores; friable; firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices de "clayskins" y "clayhumus" abundantes; raíces escasas; límite inferior claro y suave.

Bt1 32-47 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas irregulares medios fuertes que rompen a bloques subangulares medios moderados; fresco; plástico y adhesivo; muy abundantes barnices de arcilla "sclayskins" ; raíces escasas; límite inferior claro y suave.

Bt2 47-66 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; prismas irregulares compuestos medios moderados que rompen a prismas menores; friable; firme; escasas concreciones de calcáreo; muy abundantes de barnices de arcilla "sclayskins"; raíces vestigios; moteados comunes precisos y finos; límite inferior claro y suave.

2Ckkm 66 a más cm; costra calcárea (horizonte petrocálcico), rosado (7,5YR 8/4) en húmedo.

Observaciones: En todo el perfil aparecen rodaditos de cuarcita o granito que provienen de las sierras. El horizonte 2Ckkm no fue muestreado.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	BA	Bt1	Bt2
Profundidad (cm)	0-14	14-25	25-32	32-47	47-66
Mat. orgánica (%)	7,27	5,96	2,81	1,65	0,82
Carbono total (%)	4,22	3,46	1,63	0,96	0,48
Nitrógeno (%)	0,342	0,287	0,140	0,098	0,059
Relación C/N	12	12	12	10	8
Arcilla <2 µ (%)	33,8	34,3	36,6	40,7	41,2
Limo 2-20 µ (%)	25,9	26,2	14,3	18,7	19,2
Limo 2-50 µ (%)	42,4	42,9	40,5	33,2	43,5
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	19,5	18,7	18,8	18,3	18,4
AF 100-250 µ (%)	4,3	4,1	4,1	7,8	5,9
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	0	0
Eq.humedad (%)	32,9	32,2	30,4	33,5	34,1
Re. pasta Ohms	5629	7577	8227	6928	3637
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	6,2	5,4	5,6	5,7	6,5
pH H2O 1:2,5	6,6	6,3	6,7	7,0	7,6
pH KCL 1:2,5	5,7	4,8	5,0	5,3	-
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	22,7	19,2	17,9	21,2	24,5
Mg++ m.eq./100gr	2,4	2,5	1,8	4,4	3,9
Na+ m.eq./100gr	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7
K+ m.eq./100gr	2,4	1,6	1,0	1,3	1,2
H+ m.eq./100gr	10,5	12,4	8,4	7,5	6,5
Na (% de T)	1,6	1,3	1,4	1,6	2,1
Suma de Bases	28,0	23,7	21,1	27,4	30,3
CIC m.eq./100gr	31,2	29,9	26,7	30,9	32,4
Sat. con bases (%)	90	80	79	89	94