CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Pichincha (Pch)

Descripción

Es un suelo pardo, profundo, de aptitud agrícola-ganadero, se encuentra en un paisaje de planicies suavemente ondulada de la "Subregión Pampa Arenosa", en posición de media loma baja, algo pobremente drenado, poli-genético formado por arenas finas de origen eólico, que sepulta un Bt nátrico, sedimento mas antiguo de textura franco arenoso a franco arcillo arenoso, fuertemente alcalino a partir de los 57 cm de profundidad, no salino, con pendientes de 0,5 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Hapludol thapto nátrico, franca fina, mixta, térmica (Adaptación de la clasificación de los suelos argentinos al Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S: 34º 31' 53". Longitud W: 62º 21' 3". Altitud: 108 msnm; a 5 km al N de la Estación Pichincha, partido General Villegas, provincia de Buenos Aires. Mosaico IGM 3563-11-3, Blaquier.

Variabilidad de las características: El horizonte argílico puede alcanzar hasta 32 cm de espesor; el horizonte nátrico siempre aparece entre 35 y 42 cm de profundidad y con alto contenido de Na (50 a 60 %).

Fases: No se reconocieron.

Series similares: Nueve de Julio, La Albina, Cacharí y Carlos Salas.

Suelos asociados: Cañada Seca, Lincoln, Balbín, Aaron Castellanos, Fortín Tiburcio, Estancia Santa Ana.

Distribución geográfica: Partido de Villegas, Lincoln, Rivadavia, Trenque Lauquén, General Pinto, Ameghino, Carlos Tejedor; en las hojas IGM 3563-10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada, con presencia de la napa freática 2 m.

Uso y vegetación: En la fecha del reconocimiento el uso es agrícola-ganadero, con pasturas naturales (Trifolium, Panicum deltae, Digitaria sanguinalis, Medicago sp.)

Capacidad de uso: IV ws


Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica.

Índice de productividad según la región climática: 39,8 (B); 37,7 (C)

Rasgos diagnósticos: Poligenético, con epipedón mólico, régimen de humedad údico, 35 cm de material arenoso que sepulta un horizonte argílico-nátrico de formación anterior. Relación Arc. B/A >1,2 con espesor de 22 cm.

Descripción del perfil típico:

9 C
Fecha de muestreo: Noviembre de 1986



An 0-24 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco arenoso; bloques subangulares medios moderados, que rompe a bloques subangulares finos y granular; ligeramente duro; friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; galerías de gusanos; límite inferior claro, suave.

ACn 24-35 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco arenoso; bloques subangulares medios y finos débiles, rompe a grano simple; blando; muy friable; abundantes raíces; límite inferior abrupto, suave.

2Btn 35-57 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco; franco arcilloso arenoso; prismas regulares medios y gruesos, fuertes, que rompe a bloques angulares medios fuertes; extremadamente duro; extremadamente firme; muy plástico y adhesivo; escasas concreciones de Calcio; abundantes "Clay skins"; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.

3BCn1 57-81 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco arenoso; bloques subangulares y angulares medios, moderados; ligeramente duro; friable; escasas concreciones de hierro-manganeso y Calcio; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.

3BCn2 81-105 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco arenoso; bloques angulares finos moderados, rompe a bloques angulares finos; friable; no plástico; escasas concreciones de hierro-manganeso y Calcio; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.

3Cn 105-132 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco arenoso; bloques subangulares finos, débiles, rompe a masivo; friable; escasas concreciones de Calcio; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces escasas; límite inferior abrupto.

4Ckn 132-150 cm; abundante presencia de Carbonato de Calcio.

Observaciones: El horizonte 4Ck (no fue muestreado), aparece en profundidades variables con Carbonato de Calcio pulvurelento y a continuación la costra calcárea fuertemente cementada; otros perfiles RP C-21 (en Mosaico 3563-35-2).

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

Horizontes	An	ACn	2Btn	3BCn1	3BCn2	3Cn
Profundidad (cm)	7-19	27-33	40-55	65-75	85-100	110-125
Mat. orgánica (%)	2.15	0.65	0.96	-	-	-
Carbono total (%)	1.25	0.38	0.32	0.06	0.04	0.04
Nitrógeno (%)	0.114	0.042	0.032	-	-	-
Relación C/N	10.9	9.0	10.0	-	-	-
Fósforo (PPM)	6.4	5.3	2.1	6.1	9.6	7.8
Arcilla <2 µ (%)	13.3	10.5	21.8	17.6	16.5	15.4
Limo 2-20 µ (%)	14.7	12.8	11.5	11.2	9.9	10.7
Limo 2-50 µ (%)	29.8	27.9	23.2	22.5	24.0	24.4
AMF 50-75 µ (%)	10.7	10.3	9.7	8.7	10.6	11.9
AMF 75-100 µ (%)	21.3	21.9	22.1	22.8	24.1	20.4
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	24.2	28.4	23.2	27.5	24.3	27.1
AM 250-500 µ (%)	0.7	1.0	-	0.9	0.5	0.8
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	-	0.01	0.02
Eq.humedad (%)	15.2	11.0	20.1	18.3	17.7	17.1
Re. pasta Ohms	6735	12876	2179	1783	1486	1387
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	6.0	6.3	7.5	8.5	9.0	9.0
pH H2O 1:2,5	6.5	6.9	8.2	9.3	9.5	9.5
pH KCL 1:2,5	5.2	5.0	6.0	6.9	6.9	7.5
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	6.4	3.9	8.5	5.4	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2.4	3.2	6.6	2.3	-	-
Na+ m.eq./100gr	0.5	0.8	2.4	4.1	7.1	8.8
K+ m.eq./100gr	1.2	0.8	1.9	1.9	1.8	1.8
H+ m.eq./100gr	6.5	4.0	-	-	-	-
Na (% de T)	4.2	9.7	12.0	37.0	64.0	72.0
Suma de Bases	10.5	8.7	19.4	13.7	-	-
CIC m.eq./100gr	11.9	8.2	19.8	11.0	11.0	12.0
Sat. con bases (%)	95	100	98	100	-	-