CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Puesto El Zorro (PEZ)

Descripción

Los suelos que representa este perfil se reconocen en posición de bajo en la llanura litoral marina. El perfil típico que se describe a continuación presenta permeabilidad moderadamente lenta y está formado a partir de sedimentos limosos. Desde la superficie, el perfil es fuertemente salino y presenta elevados valores de sodio de intercambio.

El perfil denominado Puesto El Zorro está formado por tres capas sucesivas de materiales de textura franca a franco arcillosa. La capa Cknz1, de 20 cm de espesor, posee regular provisión de materia orgánica y reacción fuertemente alcalina. La capa 2Cknz2 tiene una potencia de 60 cm y moteados de hierro-manganeso, lo que denota su marcado hidromorfismo. Finalmente, se reconoce la capa 3Cknz3 que se extiende hasta los 140 cm de profundidad: presenta textura franco arcillosa y es fuertemente alcalina.

Clasificación taxonómica: Ustifluvent ácuico, franca fina, mixta, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 39º 17' 44.6". Longitud: W 62º 13' 49.6", a 7.5 km al NO del puesto El Zorro, en la Península Verde.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Cobertura Vegetal 30 %.


Capacidad de uso: VIII

Limitaciones de uso: Salinidad, alcalinidad sódica, clima, peligro de anegamiento.

Índice de productividad según la región climática: 5.

Descripción del perfil típico:

C-42
Fecha de muestreo: Noviembre de 1989
Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca



Cknz1 0-20 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco; franco; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; límite claro, suave.

2Cknz2 20-80 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco arcillo limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierro-manganeso comunes, medios y precisos; límite claro, suave.

3Cknz3 80-140 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris (10YR 5/1) en seco; franco arcilloso; masivo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Cknz1	2Cknz2	3Cknz3
Nº de laboratorio	35447	35448	35449
Profundidad (cm)	0-20	20-80	80-140
Factor de Humedad	1.05	1.09	1.10
Mat. orgánica (%)	1.52	1.55	1.80
Carbono Orgánico (%)	0.88	0.90	1.10
Nitrógeno (%)	0.088	0.046	0.046
Relación C/N	20	20	24
Fósforo asimilable (ppm)	11.7	6.2	-
Arcilla <2 µ (%)	20.4	33.5	29.4
Limo 2-20 µ (%)	18.3	26.9	19.2
Limo 2-50 µ (%)	47.5	42.2	41.2
AMF 50-74 µ (%)	13.8	11.1	7.5
AMF 74-100 µ (%)	5.9	4.8	4.9
AMF 50-100 µ (%)	19.7	15.9	12.4
AF 100-250 µ (%)	10.6	4.1	11.5
AM 250-500 µ (%)	1.0	0.1	0.1
AG 500-1000 µ (%)	0.2	0.1	0.1
AMG 1-2 mm (%)	0.0	0.0	0.0
Calcáreo (%)	0.6	4.1	5.3
Eq.humedad (%)	29.6	39.6	35.1
Cond. de la pasta (mmhs/cm)	27.2	35.3	34.6
pH en pasta	8.5	8.3	8.4
pH H2O 1:2,5	9.0	8.8	8.9
pH KCL 1:2,5	8.0	7.8	8.0
Cationes de cambio			
Ca++ m.eq./100gr	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	8.3	4.0	6.0
K+ m.eq./100gr	3.1	3.6	4.0
PSI (%)	32	15	21
Agua de Saturación (%)	48	68	63
Suma de bases [cmol (+)/kg] (S)	-	-	-
CIC [cmol (+)/kg] (T)	25.9	27.0	28.4
Saturación de bases % (S/T)	-	-	-
Saturación % (S+H)	-	-	-