CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Querandíes (Que)

Descripción

Es un suelo muy oscuro, de aptitud ganadera, que se encuentra en las vías de escurrimiento sin cauce elaborado, cerca de los planos bajos del arroyo Tapalqué, ocupa los sitios bajos del relieve dentro de la Subregión Sierra y Pedemonte de Tandilia, transición a los derrames, pobre a algo pobremente drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos, con alcalinidad sódica, débilmente salino, pendiente de 0,5-1 %.

Clasificación taxonómica: Natracuol vértico-cálcico, muy fina, moderadamente profunda, térmica. Adaptación de la clasificación de los suelos argentinos al S.T. 2010.
Natracuol típico, muy fina, térmica (7ª Aproximación Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 37° 06' 00ᶻ Longitud W 60° 25' 00". Altitud 195 m.s.n.m. Campo Pené, a 3.4 km al N de la Estación Santa Luisa, partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3760-21-1, Santa Luisa.

Variabilidad de las características: Horizonte Apn, de 18 a 23 cm., color negro (10YR 2/2) en húmedo, franco arcilloso liviano; BAtn, 20-32 cm., pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; Btssn, 34-55 cm., color pardo (7,5YR 3/1), en húmedo; 2BCk, 55-90 cm., franco arcilloso, variaciones del pH en campo de 8,0 a 8,4.

Fases: No presenta.

Series similares: No se encontraron.

Suelos asociados: Formando complejos de series con Miñana, Ea. Aldecoa y Napaleofú.

Distribución geográfica: Partidos de Olavarría, Tapalqué, Azul, Laprida, y Juárez, provincia de Buenos Aires. En las cartas I.G.M. 3760-9, 14, 15, 16, 20, 21, 27.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta, capa freática a 90 cm.

Uso y vegetación: Ganadero. Pasturas.

Capacidad de uso: VI ws


Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica desde la superficie (18 cm).

Índice de productividad según la región climática: 17,2

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (Apn) con 18 cm. de espesor, régimen de humedad ácuico, horizontes diagnósticos subsuperficiales: nátrico >15 % de Na+ a los 18 cm.; argílico con fuerte desarrollo genético (Rel. arc. B/A >2.3 con 69 cm. de espesor); fue decisiva para la clasificación la presencia de "slickensides" y el alto contenido de arcilla (47,3 a 66,2 %) para ser incluido en el Subgrupo vértico, no se describieron grietas por el alto porcentaje de humedad en el suelo; cálcico (2BCk) con 27,4 % de calcáreo.

Descripción del perfil típico:

7/2328 C
Fecha de muestreo: 31 de Agosto de 1972
Reconocedores: Wermbter



Apn 0-18 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcilloso; granular y bloques subangulares medios débiles; ligeramente duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; micro-concreciones de carbonatos de calcio abundantes; límite claro, suave.

BAtn 18-28 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; arcilloso; bloques subangulares medios moderados; muy duro; firme; plástico, adhesivo; micro-concreciones de carbonatos de calcio comunes; límite claro, suave.

Btssn 28-53 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas irregulares medios moderados que rompe a prismas menores y bloques angulares medios moderados; extremadamente duro; muy firme; plástico y muy adhesivo; moteados finos, comunes y precisos; presencia de "slickensides"; límite claro, ondulado.

2BCk 53-100 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; laminar moderada; moderadamente duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; micro-concreciones de carbonatos de calcio abundantes; fuerte reacción de carbonatos de calcio en la masa; moteados finos, comunes y precisos.

W 90 cm; capa freática.

Observaciones: No se realizó textura del horizonte 2BCk, por alto contenido de carbonatos de calcio (CO3Ca). El nivel general de la capa freática es de 1,5 m. de profundidad.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Apn	BAtn	Btssn	2BCk
Profundidad (cm)	5-15	20-25	30-50	60-80
Mat. orgánica (%)	5-48	1-41	1-03	0-41
Carbono total (%)	3,18	0,82	0,60	0,24
Nitrógeno (%)	0,285	0,091	0,065	-
Relación C/N	11	9	9	-
Arcilla <2 µ (%)	32,3	47,3	66,2	-
Limo 2-20 µ (%)	0	0	0	0
Limo 2-50 µ (%)	43,5	35,7	23,9	-
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	20,6	14,6	4,0	-
AF 100-250 µ (%)	3,6	2,4	1,0	-
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	vest.	4,9	27,4
Eq.humedad (%)	37,5	60,7	98,9	45,7
Re. pasta Ohms	1738	1159	602	847
Cond. mmhos/cm	-	1,10	2,20	1,56
pH en pasta	7,8	7,9	7,8	7,9
pH H2O 1:2,5	8,5	8,8	8,7	8,8
pH KCL 1:2,5	7,4	7,4	7,5	7,6
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	26,0	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	10,0	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	3,2	7,3	13,0	-
K+ m.eq./100gr	1,9	1,4	2,1	-
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-
Na (% de T)	8	18	21	-
Suma de Bases	41,1	-	-	-
CIC m.eq./100gr	39,9	39,5	63,0	-
Sat. con bases (%)	100	-	-	-