CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

San Pedro (SPr)

Descripción

Es un suelo liviano y oscuro, formado por acumulaciones de materiales loéssicos pampeanos, que se apoyan sobre una costra calcárea de extensión regional, su aptitud es agrícola y se encuentra en planicies que incluyen montículos medanosos en posición de loma con forma circular, en la "Subregión Pampa Interserrana", algo excesivamente drenado, no tiene alcalinidad y salinidad, con pendiente del 1 %.

Clasificación taxonómica: Hapludol cumúlico, limosa fina, mixta, profunda, térmica (Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S: 38° 25' 19''. Longitud W: 58° 52' 01''. Altitud 38 m.s.n.m. a 8,3 km. al noroeste del Aeroclub Necochea; partido Necochea; provincia de Buenos Aires. Mosaico 3960-12-1, Semillero Rita.

Variabilidad de las características: El espesor del horizonte A, varía entre 29 y 67 cm. en ciertos perfiles; luego del horizonte AC (a + de 70 cm. de profundidad) suele aparecer un suelo enterrado (Ab), por lo tanto la secuencia de horizontes en dichos casos es: A-2AC-3Ab.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: O'Brien (con características similares hasta el nivel de los Subgrupos).

Suelos asociados: Formando consociación, asociaciones y complejos con las series Semillero Buck, Azul, La Ponderosa, Villa, Ramón Santamarina, Comandante N. Otamendi, La Malacara, Necochea.

Distribución geográfica: Este del partido de San Cayetano, Necochea y Lobería, provincia de Buenos Aires. Hojas I.G.M. 3960-11 y 3960-12.

Drenaje y permeabilidad: Algo excesivamente drenado, escurrimiento rápido y permeabilidad moderadamente rápida, sin peligro de anegamiento, profundidad de la capa freática mayor a 1,50 m.

Uso y vegetación: Pastoreo. Raigrass (Lolium multiflorum).

Capacidad de uso: III es


Limitaciones de uso: Drenaje excesivo, baja fertilidad, leve peligro por erosión hídrica, retención de humedad.

Índice de productividad según la región climática: 58,8 (D)

Rasgos diagnósticos: Cumple todos los requerimientos de color, estructura y materia orgánica de un epipedón mólico con más de 40 cm. de acumulación hasta 1m. de profundidad, régimen de humedad údico, disminución irregular en el contenido de carbono orgánico entre una profundidad de 25 a 125 cm.

Descripción del perfil típico:

25/418 C
Fecha de muestreo: 5 de Noviembre de 1981
Reconocedores: Jacyszyn - Carboni



Ap 0-23 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco arcillo arenoso; bloques subangulares medios moderados que rompe a bloques subangulares finos y granular; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.

A 23-42 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco arcillo arenoso; bloques subangulares y angulares medios, moderados que rompe a bloques angulares y grano simple; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

A/B 42-56 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco; franco arcillo arenoso; bloques subangulares medios, moderados que rompe a bloques subangulares, finos, débiles y granular; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces comunes; formaciones especiales: estratificación de materiales; límite inferior abrupto, suave.

2AC1 56-82 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en seco; franco arenoso; bloques subangulares medios, moderados a débiles que rompe a bloques subangulares finos y grano simple; blando; muy friable; ligeramente plástico, no adhesivo; raíces escasas; formaciones especiales: materiales de horizonte Ab enterrado; límite inferior abrupto, suave.

2AC2 82-143 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en seco; franco arenoso; bloques subangulares medios y gruesos, débiles que rompe a bloques subangulares finos y grano simple; blando; muy friable; ligeramente plástico, no adhesivo; raíces escasas; formaciones especiales: estratificación de materiales; límite inferior abrupto, suave.

2Ckkm 143 a + cm; tosca en plancha (capa subsuperficial de carbonato de calcio, $CaCO_3$).

Observaciones: En la base del epipedón mólico "A" se observaron vestigios de barnices de arcilla (clayhumus).

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	A/B	2AC1	2AC2
Profundidad (cm)	8-19	26-39	45-52	60-76	105-124
Mat. orgánica (%)	3,09	2,07	2,43	1,52	1,55
Carbono total (%)	1,79	1,20	1,41	0,88	0,90
Nitrógeno (%)	0,175	0,112	0,119	0,084	0,091
Relación C/N	10,2	10,7	11,8	10,5	9,9
Arcilla <2 μ (%)	20,6	21,9	22,8	15,5	18,5
Limo 2-20 μ (%)	-	-	-	-	-
Limo 2-50 μ (%)	20,4	21,6	20,8	10,5	17,4
AMF 50-75 μ (%)	26,7	32,9	27,9	16,9	22,7
AMF 75-100 μ (%)	21,0	17,3	18,4	36,4	25,2
AMF 50-100 μ (%)	47,7	50,2	46,3	53,3	47,9
AF 100-250 μ (%)	11,3	6,3	10,1	20,7	16,2
AM 250-500 μ (%)	-	-	-	-	-
AG 500-1000 μ (%)	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	-	-
Eq.humedad (%)	18,4	16,3	17,0	11,2	14,0
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	6,1	6,4	6,4	6,2	6,9
pH H2O 1:2,5	6,6	6,8	7,0	7,3	7,4
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	12,1	12,1	13,7	10,5	13,1
Mg++ m.eq./100gr	2,2	2,4	2,6	1,5	1,3
Na+ m.eq./100gr	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4
K+ m.eq./100gr	2,3	1,8	2,0	1,3	0,5
H+ m.eq./100gr	4,9	2,3	2,4	3,2	3,8
Na (% de T)	2,7	3,5	2,9	3,4	2,3
Suma de Bases	17,3	16,9	18,9	13,8	15,3
CIC m.eq./100gr	18,3	18,5	20,4	14,7	17,3
Sat. con bases (%)	95	91	93	94	88