CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Azcuénaga (Azg)

Descripción

Es un suelo pardo, profundo, de aptitud ganadera, se encuentra en un paisaje de lomas planas con micro-relieve manchado, en posición de loma baja, en la Subregión Pampa Ondulada Alta, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos limosos finos, alcalino desde los 15 cm. de profundidad y no salino, con pendientes de 0 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf mólico, fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 2006). Natracualf típico, fina, illítica, térmica (7ª Aproximacion USDA- Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 34º 25' 0.0". Longitud W 59º 20' 60.0". Altitud 35 m.s.n.m. a 7 km al W de la Estación Ruiz (F.C.G.U.), partido de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Mosaico I.G.M. 3560-11-1, San Andrés de Giles.

Variabilidad de las características: El epipedón ócrico tiene entre 12 y 23 cm., alcanza a superar el 1 % de materia orgánica hasta los 35 cm. de profundidad. A veces se pueden encontrar escasos "slikensides" y concreciones calcáreas de manganeso desde los 30 o 40 cm.

Fases: Se reconocieron en diversos grados por drenaje, erosión e inclinación y fueron descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: Tatay, Santa Lucía.

Suelos asociados: Series Gowland, Gouin y Solís.

Distribución geográfica: Centro oeste del partido San Andrés de Giles, y oeste de Luján, provincia de Buenos Aires. En las cartas I.G.M. 3560-11-1 y 2.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Pastura para ganadería, vegetación natural, Rygrass, Disticlis spicata.

Capacidad de uso: VI ws


Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica desde los 12 cm. de profundidad.

Índice de productividad según la región climática: 10 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico, régimen de humedad ácuico, horizonte nátrico con mas de 15 % de PSI desde los 12 cm. de profundidad, con fuertes rasgos de hidromorfismo.

Descripción del perfil típico:

5/574C
Fecha de muestreo: 25 de Abril de 1967
Reconocedores: Taddei - Viale - Salcedo



An 0 a 12 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro y suave.

BAtn 12 a 28 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; arcillo limoso; prismas finos moderados; muy duro; firme; barnices húmicos arcillosos escasos; moteados escasos finos y débiles; límite inferior claro y suave.

Btn 28 a 47 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en seco; arcillo limoso; prismas gruesos moderados; muy duro; muy firme; plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; abundantes barnices húmicos arcillosos; moteados de hierro escasos, débiles y finos; raíces escasas; límite inferior gradual y suave.

Btkn 47 a 78 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; arcillo limoso; prismas medios fuertes; muy duro; muy firme; plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; barnices húmicos arcillosos muy abundantes; moteados de hierro abundantes, débiles y finos; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; límite inferior gradual y suave.

BCckn 78 a 105 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios moderados; firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; barnices húmicos arcillosos escasos; moteados de hierro abundantes, precisos y medios; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; límite inferior gradual y ondulado.

Ckk 105 a 190 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios débiles; firme; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; barnices escasos; moteados abundantes, precisos y medios; carbonatos libres en la masa abundantes.

Observaciones: el A con 24 % de arcilla puede alcanzar 15 cm. de espesor, El Bt alcanza unos 65 cm. de espesor, es en parte calcáreo. El Ckk contiene 10,5 % de calcáreo.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	An	BAtn	Btn	Btkn	BCckn	Ckk
Profundidad (cm)	0-12	21-28	28-47	47-78	78-105	105-190
Mat. orgánica (%)	2,90	1,90	0,80	0,40	0,20	0,10
Carbono total (%)	1,69	1,09	0,47	0,25	0,14	0,08
Nitrógeno (%)	0,161	0,114	0,066	0,039	-	-
Relación C/N	10	9	7	6	-	-
Arcilla <2 µ (%)	23,8	43,7	54,8	43,3	36,8	26,1
Limo 2-20 µ (%)	28,3	20,9	20,3	23,2	26,2	27,3
Limo 2-50 µ (%)	64,5	48,3	41,7	46,9	53,8	57,8
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	10,8	7,5	6,2	7,3	7,4	4,8
AF 100-250 µ (%)	0,9	0,5	0,3	0,4	0,4	0,8
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	2,1	1,6	10,5
Eq.humedad (%)	27,6	60,9	73,9	45,5	36,8	31,5
Re. pasta Ohms	3264	2901	2901	2901	3228	3264
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	6,4	6,9	7,8	7,8	7,7	7,6
pH H2O 1:2,5	7,0	8,0	8,8	8,8	8,4	8,4
pH KCL 1:2,5	5,7	6,1	6,7	7,0	7,1	7,0
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	10,2	13,5	12,8	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	5,8	14,4	11,4	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	1,5	4,7	7,0	4,7	4,3	1,6
K+ m.eq./100gr	1,6	1,3	3,3	2,4	2,7	2,0
H+ m.eq./100gr	3,4	3,3	-	-	-	-
Na (% de T)	7	15	21	25	26	10
V.S m.eq./100gr	19,1	33,9	34,2	-	-	-
CIC m.eq./100gr	20,7	32,3	33,3	19,0	16,5	16,1
Sat. con bases (%)	93	100	100	-	-	-