CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Calderón (Cdn)

Descripción

Es un suelo originado a partir de limos, se encuentra dentro de un paisaje de tendido alto y relieve subnormal en posición de loma, con pendientes de 0 a 1 %. Es un suelo profundo y presenta como vegetación un cultivo de trigo. Es moderadamente bien drenado; tiene escurrimiento medio y permeabilidad moderadamente lenta; es no alcalino y no salino. Su limitante para el uso es climática.

Clasificación taxonómica: Haplustol tapto árgico, franca fina, mixta, térmica.

Ubicación del perfil: Latitud S 38º 45' 1.98". Longitud W 62º 2' 14.55". Altitud 70 msnm, a 10.5 km al E de la Base Aeronaval Comandante Espora, partido Coronel de Marina Leonardo Rosales, provincia de Buenos Aires. Mosaico correspondiente a Carta topográfica IGM 3963-17-2, Base Aeronaval Comandante Espora.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Trigo.


Capacidad de uso: III cs

Limitaciones de uso: Clima.

Índice de productividad según la región climática:
41

Descripción del perfil típico:

C-63
Fecha de muestreo: Noviembre de 1989
Reconocedores: Luis Gómez, Miguel Cuenca



Ap 0-22 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco arenoso; masivo; friable en húmedo, no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; límite claro, suave.

AC 22-41 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; raíces comunes; límite claro, suave.

2Bt 41-62 cm; pardo (7.5YR 5/2) en seco; pardo oscuro (7.5YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares, medios, moderados; firme en húmedo, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices de clayskins, escasos; raíces escasas; límite claro, suave.

2BC 62-88 cm; gris (7.5YR 5/1) en seco, pardo oscuro (7.5YR 3/4); franco arcilloso; bloques subangulares, medios, moderados; friable en húmedo, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices de clayskins escasos; raíces escasas; límite claro, suave.

2Ck 88-105 a + cm; rosado (7.5YR 8/4) en seco, pardo claro (7.5YR 6/4); franco arcillo arenoso; masivo; firme en húmedo, no plástico, no adhesivo; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Número de Laboratorio	35538	35539	35540	35541	35542
Horizontes	Ap	AC	2Bt	2BC	2Ck
Profundidad (cm)	5-20	25-40	45-60	65-85	90-105
Factor de Humedad	1.02	1.02	1.05	1.04	1.04
Materia Orgánica (%)	2.70	2.00	1.80	0.78	0.81
Carbono Orgánico (%)	1.50	1.20	1.00	0.45	0.47
Nitrógeno (%)	0.173	0.149	0.129	0.080	0.080
Relación C/N	9	8	8	6	6
Fósforo (ppm)	57.5	37.3	11.3	-	-
Arcilla <2 µ (%)	17.3	18.1	35.8	32.1	33.3
Limo 2-20 µ (%)	9.6	13.5	15.6	16.6	9.1
Limo 2-50 µ (%)	21.9	26.2	30.2	36.3	17.1
AMF 50-75 µ (%)	9.3	5.6	10.8	8.5	9.8
AMF 75-100 µ (%)	13.8	20.5	11.1	11.7	8.0
AMF 50-100 µ (%)	23.1	26.1	21.9	20.2	17.8
AF 100-250 µ (%)	35.1	28.4	11.3	10.9	10.6
AM 250-500 µ (%)	2.6	1.2	0.7	0.4	1.0
AG 500-1000 µ (%)	-	-	0.1	0.1	0.2
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	-	20.0
Equivalente de Humedad (%)	22.6	17.6	29.3	25.0	29.9
Re. pasta. (Ohms/cm)	-	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	0.77	0.25	0.32	0.45	0.58
pH en pasta de saturación	5.8	6.5	7.1	7.2	8.1
pH H2O (1:2.5)	6.4	7.0	7.6	7.8	8.5
pH KCL (1:2.5)	5.4	6.0	6.5	6.6	7.5
Cationes de Cambio					
Ca++ m.eq./100gr	6.7	11.3	22.6	20.0	-
Mg++ m.eq./100gr	2.3	2.5	4.2	7.5	-
Na+ m.eq./100gr	0.6	0.3	0.4	1.0	1.5
K+ m.eq./100gr	4.2	4.1	4.3	1.5	0.8
H+ m.eq./100gr	4.6	3.0	2.1	2.1	-
PSI (%)	3	1	1	3	4
Agua de Saturación (%)	45	40	57	47	61
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	13.8	18.3	31.5	30.0	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	16.8	18.8	31.4	29.9	32.4
Saturación de bases (%) (S/T)	82	97	100	100	-
% de Saturación (S+H)	75	86	94	94	-