CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Cascada (Cda)

## Descripción

Es un suelo oscuro, poco profundo con textura franco-arcillosa y "tosca" a 60 cm. de profundidad, con aptitud agrícola-ganadera, se encuentra en un paisaje de planicies suavemente onduladas, en la "Subregión del Pedemonte y Sierras de Ventania", bien drenado, formado en sedimentos eólicos finos, no alcalino, no salino, con pendiente de 0-1 %.

**Clasificación taxonómica:** Argiudol petrocálcico, limosa fina, mixta, moderadamente profunda, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2014).
Argiudol lítico, fina, illítica, moderadamente somera, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.1975).

**Ubicación del perfil:** Latitud S: 37° 11' 8.85", Longitud W: 62° 25' 2.44". Altitud: 200 m.s.n.m. a 9 km al NNE de la Estancia "15 de Abrilz a 19 km al S de la Ciudad de Guaminí, partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3763-23-3, Cascada.

**Variabilidad de las características:** La profundidad del horizonte petrocálcico 2Ckkm ("tosca"), varía entre 50 a 60 cm. de profundidad.

**Fases:** Se reconocieron por erosión y drenaje en distintos grados.

**Series similares:** Pillahuincó y Tres Arroyos (difieren en la familia Fina).

**Suelos asociados:** La Colina, Estación La Nevada, Laprida, La Loma, Sierra Chica.

**Distribución geográfica:** Partidos de Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Saavedra y oeste de General La Madrid.

**Drenaje y permeabilidad:** Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada.

**Uso y vegetación:** Agrícola: rastrojo de cultivo de trigo (Triticum aestivum).

**Capacidad de uso:** IV s


**Limitaciones de uso:** Profundidad del solum.

**Índice de productividad según la región climática:** 42,5 (D); 35 (E); 25 (F).

**Rasgos diagnósticos:** Epipedón mólico (Ap), régimen de humedad údico, tiene un horizonte argílico (Bt) con relación arcilla B/A de 1,26 y un horizonte petrocálcico (2Ckkm), a los 60 cm. de profundidad.

## Descripción del perfil típico:

**23/1353 C**
**Fecha de muestreo: 2 de Diciembre de 1989**
**Reconocedores: Ferrao - Grinberg**




**Ap** 0-20 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, moderados que rompe a bloques menores; friable; no plástico, no adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

**Bt** 20-42 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios; ligeramente duro; firme; plástico, adhesivo; barnices Clayskins abundantes; raíces escasas; límite inferior, claro suave.

**BC** 42-60 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios, moderados a fuertes; ligeramente duro; firme; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior, abrupto suave.

**2Ckkm** 60-75 cm a +; tosca cementada; horizonte petrocálcico, estructura con orientación horizontal, continua, violenta reacción positiva al test de calcáreo y abundante concreciones de Carbonato de Calcio.

**Observaciones:** El horizonte 2Ckkm no fue muestreado.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | Ap | Bt | BC |
|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 0-20 | 20-42 | 40-60 |
| Mat. orgánica (%) | 3,80 | 2,50 | 1.35 |
| Carbono total (%) | 2,20 | 1,40 | 0,78 |
| Nitrógeno (%) | 0,222 | 0,222 | 0,087 |
| Relación C/N | 9,9 | 6,3 | 8,9 |
| Fósforo (PPM) | 5,6 | 2,3 | 0,0 |
| Arcilla <2 µ (%) | 24,1 | 30,6 | 28,0 |
| Limo 2-20 µ (%) | 18,5 | 12,6 | 11,8 |
| Limo 2-50 µ (%) | 37,0 | 31,8 | 29,3 |
| AMF 50-75 µ (%) | 16,2 | 15,2 | 9,7 |
| AMF 75-100 µ (%) | 8,3 | 11,4 | 18,8 |
| AMF 50-100 µ (%) | - | - | - |
| AF 100-250 µ (%) | 13,8 | 10,6 | 13,9 |
| AM 250-500 µ (%) | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| AG 500-1000 µ (%) | - | 0,1 | - |
| AMG 1-2 mm (%) | - | - | - |
| Calcáreo (%) | - | - | - |
| Eq.humedad (%) | 20,9 | 24,0 | 23,1 |
| Re. pasta Ohms | - | - | - |
| Cond. mmhos/cm | 0,40 | 0,19 | 0,33 |
| pH en pasta | 5,7 | 6,0 | 6,6 |
| pH H2O 1:2,5 | 6,3 | 6,6 | 7,2 |
| pH KCL 1:2,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 |
| Cationes de cambio | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 15,5 | 17,0 | 17,5 |
| Mg++ m.eq./100gr | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Na+ m.eq./100gr | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| K+ m.eq./100gr | 1,7 | 1,6 | 1,2 |
| H+ m.eq./100gr | 5,4 | 4,9 | 3,3 |
| Na (% de T) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Suma de Bases | 20,0 | 21,9 | 22,6 |
| CIC m.eq./100gr | 23,4 | 24,9 | 23,2 |
| Sat. con bases (%) | 85 | 88 | 97 |