CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Chasicó (Chas)

Descripción

Es un suelo gris a pardo oscuro, moderadamente profundo, que se apoya sobre una costra calcárea (tosca) de extensión regional, con aptitud agrícola, se encuentra en un paisaje de lomas planas extendidas, en la Subregión de las Sierras y Pedemonte de Ventania, en posición de loma, formado sobre sedimentos loéssicos, no salino y sin alcalinidad, con pendiente 1 - 2 %.

Clasificación taxonómica: Haplustol petrocálcico, franca fina, mixta, somera, térmica (AD-INTA-ST.2010).
Haplustol tapto petrocálcico, fina, illítica, moderadamente somera, térmica (USDA - 7ª Aprox. ST V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 37º 58' 19,45". Longitud W 62º 51' 39,61". Altitud 232 msnm a 10 km al SE de la ciudad 17 de Agosto, partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires; mosaico I.G.M. 3763-34-3, 17 de Agosto.

Variabilidad de las características: La profundidad en que aparece la costra calcárea es entre 52 a 67 cm.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: Alta Vista.

Suelos asociados: López Lecube, Estela, Saavedra, San Germán, Fuerte Argentino, Abra Rivera, Napostá.

Distribución geográfica: Partidos de Puan y Tornquist, en las hojas 3963-9 y 10.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Agrícola. Pasturas implantadas (Alfalfa, Cebadilla criolla, Rygrass).

Capacidad de uso: IV sc


Limitaciones de uso: Moderada profundidad del solum (horizonte petrocálcico a los 67 cm.)

Índice de productividad según la región climática: 49 (E)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (espesor 67 cm), régimen de humedad ústico, horizonte Bw cámbico (relación de arcilla B/A 1,05), presencia de tosca (costra calcárea 2Ckk) a los 67 cm de profundidad, descripto en el campo como IICam, con extrema dureza (no fue muestreado) y considerado horizonte petrocálcico, definiendo ese requisito su clasificación taxonómica.

Descripción del perfil típico:

72 C
Fecha de muestreo: 15 de Noviembre de 1989
Reconocedores: Maldonado - Luters - Arteaga



Ap 0-25 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco; bloques subangulares medios moderados y bloques menores; no plástico; no adhesivo; fresco; límite inferior claro y suave.

Bw 25-67 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios moderados; barnices de "clays humus" escasos; raíces escasas; límite inferior abrupto y suave.

2Ckkm 67 a + cm; costra calcárea (horizonte petrocálcico), rosado (7,5YR 7/4) en húmedo.

Observaciones: El horizonte 2Ckkm no fue muestreado por su extrema dureza.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	Bw
Profundidad (cm)	0-25	25-67
Mat. orgánica (%)	3,80	3,40
Carbono total (%)	2,20	2,00
Nitrógeno (%)	0,185	0,185
Relación C/N	11,9	10,8
Fósforo (PPM)	22,9	-
Arcilla <2 µ (%)	27,0	28,4
Limo 2-20 µ (%)	18,4	15,6
Limo 2-50 µ (%)	29,1	32,8
AMF 50-75 µ (%)	17,2	17,1
AMF 75-100 µ (%)	14,8	13,9
AMF 50-100 µ (%)	0	0
AF 100-250 µ (%)	11,1	7,1
AM 250-500 µ (%)	0,2	0,2
AG 500-1000 µ (%)	0,4	0,5
AMG 1-2 mm (%)	0	0
Calcáreo (%)	0,2	0
Eq.humedad (%)	24,3	24,3
Re. pasta Ohms	-	-
Cond. mmhos/cm	0,65	0,41
pH en pasta	7,4	7,2
pH H2O 1:2,5	7,8	7,6
pH KCL 1:2,5	6,7	6,5
Cationes de cambio		
Ca++ m.eq./100gr	-	22,3
Mg++ m.eq./100gr	-	2,6
Na+ m.eq./100gr	0,4	0,6
K+ m.eq./100gr	1,9	1,0
H+ m.eq./100gr	-	-
Na (% de T)	2	2
Suma de Bases	S/D	26,5
CIC m.eq./100gr	20,6	27,4
Sat. con bases (%)	-	97