CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Coronel Bunge (CBu)

## Descripción

Es un suelo moderadamente profundo, de aptitud ganadera, se encuentra en un paisaje muy suavemente ondulado, en la zona de los derrames con "tosca" generalizada, en depresiones cerradas y tendidos bajos en las Sierras y Pedemonte de Tandilia, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos limosos sobre "tosca", levemente salino, sódico de superficie, con pendientes de 0 a 1 %.

**Clasificación taxonómica:** Natracualf petrocálcico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (Adaptación INTA al USDA- Soil Taxonomy V. 2010).
Natracualf mólico, limosa fina, illítica, térmica (7ª Aproximacion USDA- Soil Taxonomy V. 1975).

**Ubicación del perfil:** Latitud S: 37º 28' 00". Longitud O: 60º 42'00". Altitud 209 m.s.n.m. a 12,3 km. al noreste de la ciudad cabecera del partido de Laprida, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3760-26-3, Laprida.

**Variabilidad de las características:** En algunos perfiles el horizonte petrocálcico puede aparecer a los 70 cm. de profundidad.

**Fases:** No se reconocieron.

**Series similares:** La Paulina, Las Margaritas, Tecua y Miñana.

**Suelos asociados:** Santa Luisa, La Tigra, Estancia Aldecoa.

**Distribución geográfica:** Partidos de General La Madrid y Laprida, en las hojas 3760-19, 20, 25, 26, 27 y 28.

**Drenaje y permeabilidad:** Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta.

**Uso y vegetación:** Pastura para ganadería, vegetación natural, Pelo de chancho (Disticlis spicata), Gramilla (Cyperaceas sp.), Agropiro.

**Capacidad de uso:** VI ws


**Limitaciones de uso:** Moderada profundidad del solum, alcalinidad sódica desde la superficie y peligro de anegamiento.

**Índice de productividad según la región climática:** 7,94 (A)

**Rasgos diagnósticos:** Epipedón mólico, incluye un Ap1 - Ap2 - AB; régimen de humedad údico; horin posición depresiones cerradas y tendidos bajos, tiene epipedón ócrico, ubicada en la región climática "D", con régimen de humedad ácuico, horizonte nátrico con mas de 56 % de sodio de intercambio desde la superficie, horizonte petrocálcico (2Ckkm) a los 83 cm. con 27,2 % de CaCo3.

## Descripción del perfil típico:

**52 C**
**Fecha de muestreo: Noviembre de 1988**




**An** 0-16 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares medios, moderados; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; límite inferior claro y suave.

**Btkn** 16-42 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; arcilloso; prismas compuestos irregulares, medios fuertes; ligeramente firme; plástico, adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; barnices de "Clayskins" escasos, medios; moteados de hierro-manganeso escasos, finos y débiles; límite inferior claro, difuso.

**BCn** 42-64 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; laminar, fina, moderada; muy firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; barnices "clayskins" escasos, finos; moderada reacción a los carbonatos libres en la masa; límite claro y suave.

**Cn** 64-80 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; masivo; muy friable; no plástico, no adhesivo; débil reacción a los carbonatos libres en la masa; límite abrupto y suave.

**2Ckkm** 80-95 cm. a +; costra calcárea, horizonte petrocálcico, gris rosáceo (7,5YR 7/4) en húmedo.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | An | Btkn | BCn | Cn | 2Ckkm |
|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 0-15 | 16-42 | 42-64 | 64-80 | 85-90 |
| Mat. orgánica ( %) | 1,60 | 0,81 | 0,25 | 0,11 | 0,23 |
| Carbono total ( %) | 0,93 | 0,47 | 0,15 | 0,06 | 0,13 |
| Nitrógeno ( %) | 0,105 | 0,057 | - | - | - |
| Relación C/N | 8,8 | 8,2 | - | - | - |
| Arcilla <2 µ ( %) | 17,0 | 43,9 | 11,8 | 11,3 | 11,4 |
| Limo 2-20 µ ( %) | 25,9 | 24,8 | 22,0 | 21,0 | 11,4 |
| Limo 2-50 µ ( %) | 45,2 | 34,9 | 46,6 | 44,4 | 24,3 |
| AMF 50-75 µ ( %) | 18,1 | 10,4 | 24,2 | 21,7 | 23,3 |
| AMF 75-100 µ ( %) | 15,8 | 7,9 | 9,0 | 16,5 | 9,3 |
| AMF 50-100 µ ( %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF 100-250 µ ( %) | 3,9 | 2,9 | 4,9 | 4,8 | 4,5 |
| AM 250-500 µ ( %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG 500-1000 µ ( %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMG 1-2 mm ( %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calcáreo ( %) | vest. | vest. | 3,5 | 1,3 | 27,2 |
| Eq.humedad ( %) | 22,2 | 54,7 | 15,5 | 12,7 | 19,2 |
| Re. pasta Ohms | - | - | - | - | - |
| Cond. mmhos/cm | - | - | - | - | - |
| pH en pasta | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,6 |
| pH H2O 1:2,5 | 9,1 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 9,2 |
| pH KCL 1:2,5 | 6,9 | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 7,3 |
| Cationes de cambio | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | - | - | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | - | - | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 6,1 | 26,6 | 24,8 | 19,7 | 2,4 |
| K+ m.eq./100gr | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 0,7 |
| H+ m.eq./100gr | - | - | - | - | - |
| Na ( % de T) | 56 | 70 | 75 | 78 | 70 |
| Suma de Bases | - | - | - | - | - |
| CIC m.eq./100gr | 10,8 | 37,8 | 33,1 | 27,9 | 23,3 |
| Sat. con bases ( %) | - | - | - | - | - |