CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Fortín Tiburcio (FT)

## Descripción

Es un suelo profundo, con aptitud agrícola, situado en las cercanías de los cauces y lagunas del partido de Junín, en posición de lomas, en la Subregión Pampa Ondulada alta, moderadamente bien drenado, desarrollado a partir de un sedimento relativamente liviano con texturas francas, levemente ácido en superficie y ligeramente alcalino en profundidad, no salino, con pendientes de 1 a 3 %.

**Clasificación taxonómica:** Hapludol típico, limosa fina, mixta, térmica (USDA- S. Taxonomy V. 2006).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 34° 22' 43'' y Longitud W 60° 56' 20''. Altitud 72 m.s.n.m. a 14,3 km. al oeste sudoeste de la estación Rafael Obligado, partido de Rojas, provincia de Buenos Aires. Hoja IGN 3560-8-1 Rafael Obligado.

**Variabilidad de las características:** El A puede tener de 18 a 22 % de arcilla . El horizonte Bw puede tener entre 22 a 25 % de arcilla. Algunos perfiles no tienen sodio hasta los 150 cm. de profundidad.

**Fases:** Por pendiente y erosión.

**Series similares:** Delgado, Santa Isabel.

**Suelos asociados:** Las Nutrias.

**Distribución geográfica:** Norte del partido de Junín y Sudeste de General Arenales. Hojas I.G.M. 3560-1; 3560-7 y 1; 3560-8.

**Drenaje y permeabilidad:** Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada a rápida, sin peligro de anegamiento.

**Uso y vegetación:** Pradera natural (Cynara cardunculus, Bromus uniloides), manzanilla silvestre.

**Capacidad de uso:** II e


**Limitaciones de uso:** Peligro de erosión hídrica.

**Índice de productividad según la región climática:** 81.23 (A)

**Rasgos diagnósticos:** Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte Cámbico (relación arcilla del B/A 0,96).

## Descripción del perfil típico:

**12/788 C**
**Fecha de muestreo: 17 de Noviembre de 1966**
**Reconocedores: Jacyszyn - Giagnoni - Scoppa - Galazzi - Peter Meyer**




**Ap1** 0-13 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco; bloques subangulares medios que rompe en granular fino; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

**Ap2** 13-29 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco; bloques subangulares medios moderados que rompe en granular; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

**Bw** 29-58 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares medios moderados y fuertes que rompe en bloques angulares finos; friable; plástico; adhesivo; escasos barnices húmicos arcillosos; límite inferior claro, suave.

**BC** 58-120 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo, franco; bloques angulares medios moderados a fuertes; ligeramente duro; friable; plástico; adhesivo; escasos barnices húmicos arcillosos, límite inferior gradual, suave.

**Cc** 120 a + 150 cm; pardo amarillento a pardo amarillento oscuro (10YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; suelto; no plástico; no adhesivo; escasas concreciones finas de hierro-manganeso; moteados de hierro abundantes medios y precisos; escasos carbonatos en microconcreciones.

**Observaciones:** Importante actividad biológica (Lombriz=Annelida oligochaeta), en el Ap1 y Ap2.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | Ap1 | Ap2 | Bw | BC | Cc |
|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 0-13 | 13-29 | 29-58 | 58-120 | 120-140 |
| Mat. orgánica (%) | 4,17 | 3,05 | 0,83 | 0,3 | 0,2 |
| Carbono total (%) | 2,42 | 1,77 | 0,48 | 0,21 | 0,09 |
| Nitrógeno (%) | 0,263 | 0,187 | 0,068 | 0,029 | - |
| Relación C/N | 9 | 9 | 7 | 7 | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 19,8 | 19,4 | 22,1 | 15,8 | 7,0 |
| Limo 2-20 µ (%) | - | - | - | - | - |
| Limo 2-50 µ (%) | 48,4 | 49,0 | 39,6 | 41,1 | 54,1 |
| AMF 50-75 µ (%) | - | - | - | - | - |
| AMF 75-100 µ (%) | - | - | - | - | - |
| AMF 50-100 µ (%) | 29,8 | 28,7 | 35,8 | 39,6 | 35,2 |
| AF 100-250 µ (%) | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 3,7 |
| AM 250-500 µ (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AG 500-1000 µ (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMG 1-2 mm (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Calcáreo (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | vest. | vest. |
| Eq.humedad (%) | 28,1 | 26,9 | 26,6 | 21,7 | 17,5 |
| Re. pasta Ohms | - | - | - | - | - |
| Cond. mmhos/cm | - | - | - | - | - |
| pH en pasta | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 8,4 |
| pH H2O 1:2,5 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 8,7 |
| pH KCL 1:2,5 | - | - | - | - | - |
| Cationes de cambio | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 13,4 | 12,5 | 9,1 | 7,6 | 5,0 |
| Mg++ m.eq./100gr | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,0 |
| Na+ m.eq./100gr | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
| K+ m.eq./100gr | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 2,5 |
| H+ m.eq./100gr | 6,8 | 6,5 | 4,7 | 2,7 | 1,8 |
| Na (% de T) | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 10,0 |
| Suma bases | 17,9 | 16,5 | 13,7 | 12,7 | 12,8 |
| CIC m.eq./100gr | 20,1 | 18,5 | 15,5 | 13,5 | 12,7 |
| Sat. con bases (%) | 89 | 89 | 88 | 94 | 100 |