CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Indacochea (In)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo con fuerte desarrollo, su aptitud es agrícola, se encuentra en un área de paisaje suavemente ondulado ocupando un micro-relieve bajo entre lomas dentro de la Subregión Pampa Ondulada alta, moderadamente bien drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos franco limosos, no salino, no alcalino en pendientes de 0-0,5 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2006). Argiudol ácuico, limosa fina, mixta, térmica (7ª Aproximación USDA-Soil Taxonomy V.1975.

Ubicación del perfil: Latitud: S 34° 49' 11''. Longitud: W 60º 14' 21''. Altitud: 51 m.s.n.m. a 3 km. al sureste de la estación Benítez (F.C.G.B.), partido Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3560-15-4, Chivilcoy.

Variabilidad de las características: Epipedón mólico de 23 a 27 cm. (ligera lixiviación). AB, 10YR 5/3 y 6/2 en seco.

Fases: Por pendiente, erosión, drenaje y engrosada en distintos grados.

Series similares: Chacabuco, Rojas.

Suelos asociados: Villa Moll, O´Higgins, Gorostiaga, Teodelina, Agustín Roca.

Distribución geográfica: Partidos de Chivilcoy, Alberti, Chacabuco. Fotomosaicos: 3560-15 y 21.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderada.

Uso y vegetación: Agrícola. Vegetación natural: Cebadilla, (Bromus uniloides). Trébol blanco, (Trifolium repens). Gramillón, (Cynodon dactylon), Cardo castilla, (Cynara cardunculus).

Capacidad de uso: II w


Limitaciones de uso: Drenaje; encharcamientos ocasionales por exceso de precipitación.

Índice de productividad según la región climática: 90 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, incluye un Ap1-Ap2-AB; régimen de humedad údico; horizonte argílico (relación de arcilla B/A: 1.5) entre los 48 a 78 cm. de profundidad.

Descripción del perfil típico:

4/571 C
Fecha de muestreo: 25 de Octubre de 1967
Reconocedores: Vargas Gil - Salazar Lea Plaza - Iozzia



Ap 0-15 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco; granular fina, débil; muy friable; no plástico, no adhesivo; abundantes raíces; límite inferior claro, suave.

A 15-27 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco; granular fina, débil; muy friable; no plástico; no adhesivo; abundantes raíces; límite inferior claro, ondulado.

AB 27-48 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, débiles; friable; no plástico; no adhesivo; abundantes raíces; límite inferior claro y ondulado.

Bt1 48-78 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas irregulares, compuestos, medios, fuertes; firme; plástico y adhesivo; escasas concreciones de hierro manganeso; abundantes barnices húmico-arcillosos de color pardo oscuro; moteados escasos, finos y débiles; abundantes raíces; límite inferior claro y ondulado.

Bt2 78-107 cm; pardo amarillento oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; prismas irregulares medios, moderados; friable; plástico; adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; escasos barnices húmico-arcillosos; moteados escasos, finos y débiles; abundantes raíces; límite inferior gradual, ondulado.

BCc 107-165 cm; pardo amarillento oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; prismas irregulares, medios, débiles; muy friable; no plástico; no adhesivo; abundantes concreciones de hierro-manganeso; moteados comunes, sobresalientes y gruesos de color pardo rojizo oscuro (5YR 3/3); límite inferior difuso y ondulado.

C 165 a + cm; pardo amarillento oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; masivo, ligeramente cementado; muy friable; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes sobresalientes y gruesos de color pardo rojizo oscuro (5YR 3/3); raíces comunes.

Observaciones: Galerías de lombrices en gran parte del perfil (krotovinas).

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	AB	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad (cm)	0-15	15-27	27-48	48-78	78-107	107-165	165 a +
Mat. orgánica (%)	3,70	2,82	1,13	0,98	0,36	0,13	1,06
Carbono total (%)	2,15	1,64	0,66	0,57	0,21	-	0,62
Nitrógeno (%)	0,225	0,144	0,080	0,069	0,029	-	-
Relación C/N	10	11	8	8	7	-	9
Arcilla <2 µ (%)	21,4	20,9	20,2	31,2	19,2	12,5	15,5
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	48,2	47,5	43,5	39,1	42,2	42,3	38,5
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	27,8	29,8	33,9	28,3	36,8	42,2	38,5
AF 100-250 µ (%)	2,6	1,8	2,4	1,4	1,8	3,0	2,9
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	0	0	0	0
Eq.humedad (%)	23,6	24,6	22,7	29,0	24,6	19,6	20,3
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	4,9	5,2	5,2	5,7	6,0	5,9	5,5
pH H2O 1:2,5	5,1	5,5	5,4	5,9	6,6	6,5	6,2
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-	-	-
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	11,9	11,1	7,7	9,9	8,5	6,4	6,8
Mg++ m.eq./100gr	2,5	3,1	2,1	5,8	4,5	3,9	1,9
Na+ m.eq./100gr	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4
K+ m.eq./100gr	2,5	2,3	2,0	2,1	1,6	1,7	1,4
H+ m.eq./100gr	5,2	4,3	2,4	2,0	1,4	1,0	2,0
Na (% de T)	0,9	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	3,3
V.S m.eq./100gr	17,1	16,6	11,9	18,0	14,8	12,2	10,5
CIC m.eq./100gr	21,8	20,4	14,8	20,9	17,2	14,0	12,0
Sat. con bases (%)	80	81	80	86	86	87	88