CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Ingeniero Silveyra (ISy)

## Descripción

Es un suelo profundo, pardo grisáceo muy oscuro con aptitud ganadera que se encuentra en una planicie que incluye microdepresiones dentro de cuencas cerradas y cañadas de poco desagüe en posición de bajo cóncavo de la Subregión Pampa Ondulada alta, pobremente drenado, evolucionado sobre sedimentos loéssicos francos limosos, exceso de sodio desde superficie y alcalinidad sódica hasta después de los 100 cm. de profundidad, levemente salino, con pendientes que no superan el 0-0.5 %.

**Clasificación taxonómica:** Natracuol típico, fina, illítica, térmica. (USDA- Soil Taxonomy V. 2006).

**Ubicación del perfil:** Latitud: S 34° 37' 42''. Longitud: W 60º 16' 18''. Altitud: 59 m.s.n.m. a 4,5 km. al este-sudeste de la localidad de Rawson, partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Fotomosaico I.G.M. 3560-9-4.

**Variabilidad de las características:** No hay transición BA al Bt, es abrupto el límite con 40 a 60 cm. de espesor.

**Fases:** Drenaje, erosión, engrosada.

**Series similares:** Los Indios.

**Suelos asociados:** Chacabuco, Rawson.

**Distribución geográfica:** En los partidos de Chacabuco, Suipacha, Alberti, Chivilcoy, San Andrés de Giles y al sur de los partidos de Salto y Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Fotomosaicos: 3560-9, 3560-10, 3560-15, 3560-16.

**Drenaje y permeabilidad:** Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad muy lenta, muy anegable.

**Uso y vegetación:** Ganadero. Pastura natural.

**Capacidad de uso:** VI ws


**Limitaciones de uso:** Alcalinidad sódica, salinidad y drenaje deficiente.

**Índice de productividad según la región climática:** 10 (A)

**Rasgos diagnósticos:** Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizonte argílico, horizonte nátrico (saturación de Na >15 %).

## Descripción del perfil típico:

**13/545 C**
**Fecha de muestreo: 19 de Octubre de 1966**
**Reconocedores:Peña - Rossetti - Scoppa**




**An** 0-20 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares medios y finos moderados; muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; formaciones especiales lombrices; límite claro y suave.

**BAn** 20-30 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos escasos; moteados comunes, débiles, finos; raíces comunes; límite claro y ondulado.

**Btn** 30-58 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco arcillo limoso; prismas finos fuertes; firme; muy plástico; muy adhesivo; concreciones calcáreas escasas; concreciones ferro-manganésicas escasas; barnices húmico-arcillosos (10YR 3/2) muy abundantes; moteados comunes, débiles y finos; raíces escasas; límite claro y suave.

**BCcn1** 58-86 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco; franco limoso; prismas medios moderados; firme; plástico y adhesivo; concreciones ferro-manganésicas abundantes; barnices húmico-arcillosos abundantes; moteados escasos, débiles, finos; límite claro y suave.

**BCcn2** 86-150 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; franco limoso; bloques angulares medios fuertes; friable; concreciones calcáreas escasas; concreciones ferro-manganésicas abundantes; barnices húmico-arcillosos escasos; moteados escasos, finos, precisos; ligeramente cementado; límite claro y suave.

**Cm** 150-180 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; rosado (7,5YR 7/4) en seco; franco limoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; concreciones ferro-manganésicas escasas; moderada cementación.

**Observaciones:** La napa freática fluctúa entre 1,5 y 2,5 mts. de profundidad.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | An | BAn | Btn | BCcn1 | BCcn2 | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 0-20 | 20-30 | 30-58 | 58-86 | 86-150 | 150-180 |
| Mat. orgánica ( %) | 2,6 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Carbono total ( %) | 1,54 | 0,63 | 0,45 | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
| Nitrógeno ( %) | 0,186 | 0,079 | 0,055 | 0,026 | 0,022 | 0,021 |
| Relación C/N | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Arcilla <2 µ ( %) | 14,8 | 16,9 | 38,0 | 17,0 | 15,0 | 14,0 |
| Limo 2-20 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| Limo 2-50 µ ( %) | 69,9 | 59,9 | 52,7 | 69,7 | 60,0 | 61,9 |
| AMF 50-75 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| AMF 75-100 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| AMF 50-100 µ ( %) | 14,3 | 21,7 | 8,7 | 12,4 | 23,6 | 22,8 |
| AF 100-250 µ ( %) | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,3 |
| AM 250-500 µ ( %) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG 500-1000 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| AMG 1-2 mm ( %) | - | - | - | - | - | - |
| Calcáreo ( %) | 0 | 0 | 0,3 | 1,1 | 0 | 0 |
| Eq.humedad ( %) | 27,6 | 26,5 | 67,4 | 37,3 | 28,0 | 26,7 |
| Re. pasta Ohms | 1951 | 1951 | 554 | 798 | 1995 | 751 |
| Cond. mmhos/cm | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - |
| pH en pasta | 6,3 | 8,1 | 8,8 | 8,6 | 7,9 | 7,5 |
| pH H2O 1:2,5 | 6,7 | 8,5 | 9,1 | 9,1 | 8,5 | 8,0 |
| pH KCL 1:2,5 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 5,8 |
| Cationes de cambio | | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 8,8 | 6,4 | 6,7 | 7,3 | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 2,3 | 1,8 | 3,8 | 4,8 | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 3,1 | 4,7 | 15,5 | 11,8 | 5,3 | 2,9 |
| K+ m.eq./100gr | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 3,7 | 2,7 | 2,6 |
| H+ m.eq./100gr | 4,5 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | - | - |
| Na ( % de T) | 18 | 40 | 45 | 50 | 30 | 18 |
| V.S m.eq./100gr | 15,2 | 14,1 | 18,5 | 17,6 | - | - |
| CIC m.eq./100gr | 17,0 | 15,0 | 33,3 | 27,1 | 19,9 | 18,8 |
| Sat. con bases ( %) | 89 | 94 | 93 | 94 | - | - |