CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Lobería (Lo)

Descripción

Es un suelo muy oscuro y fuertemente textural, desarrollado a partir de materiales loéssicos pampeanos, que se apoyan sobre una costra calcárea de extensión regional, su aptitud es agrícola y se encuentra en un plano bajo extendido con relieve subnormal en la "Subregión Pampa Interserrana", en posición de bajo, moderadamente bien drenado, ligera alcalinidad por debajo de los 44 cm., no salino, con pendiente de 0.5 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol ácuico, fina, illítica, profunda, térmica, (USDA-S.Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S: 38° 8' 36.98'' y Longitud O: 58° 39' 42.03''. Altitud 74 m.s.n.m. a 8,5 km al SW de la Estación El Moro, partido Lobería, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3960-6-2, Estación El Moro.

Variabilidad de las características: El material parental (Cn), entre 77 a 100 cm. de profundidad, cuyo contenido de sodio (Na+) es de 17 %, puede variar de 14 a 18 %. El horizonte A, puede tener una textura de franco arcilloso a franco arcillo arenoso con 20 a 30 % de arcilla.

Fases: Por drenaje (moderadamente bien drenado) descripta en las unidades cartográficas.

Series similares: Gouin, Santa Luisa, Arrecifes, Chascomús.

Suelos asociados: Formando complejos y asociaciones con las series Tandil, Azul, La Malacara, Cte. N. Otamendi, Chocorí, Mechongué, Napaleofú, Tandileofú, Cinco Cerros, La Alianza, El Gavilán, El Vigilante, Micaela Cascallares.

Distribución geográfica: Partidos de Lobería, General Alvarado, González Chaves, San Cayetano, Coronel. Dorrego, Tres Arroyos. Hojas I.G.M. 3760-36; 3957-1; 3960-4, 8, 9, 14, 15.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta, peligro de anegamiento en épocas excepcionales. Puede ascender la capa freática en algún período del año.

Uso y vegetación: Pastura natural para ganadería, vegetación natural: Paja vizcachera (Stypa ambigua Spegazzini), Cynodon s.p. , cobertura vegetal 100 %.

Capacidad de uso: IV ws


Limitaciones de uso: Drenaje, horizonte subsuperficial Bt fuertemente textural, ligera alcalinidad.

Índice de productividad según la región climática: 48,2 (D)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (A) entre 0 y 24 cm, régimen de humedad údico (los suelos están húmedos por períodos de más de 90 dias), horizonte argílico (acumulación de arcilla iluvial), que incluye un Bt de 20 cm de espesor (relación arcilla del B/A 1,4 %); rasgos hidromórficos a partir de los 24 cm.

Descripción del perfil típico:

23/283 C
Fecha de muestreo: 5 de Octubre de 1982



Ap 0-24 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios, moderados que rompe granular, medios, débiles; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces abundantes; formaciones especiales: actividad biológica (lombrices); límite inferior claro, suave.

Bt 24-44 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas simples irregulares, medios, moderados que rompe a bloques subangulares medios, moderados; muy duro; firme; plástico, adhesivo; barnices de arcilla (clayskins) muy abundantes; clayhumus escasos; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; escasos; límite inferior claro, suave.

BC 44-58 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco; prismas simples, irregulares, medios moderados, que rompe a bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; concreciones de calcáreo escasas; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; barnices húmico-arcillosos escasos; límite inferior abrupto, suave.

BCk 58-77 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco; bloques subangulares medios, moderados; blando; friable; no plástico, no adhesivo; concreciones de calcáreo abundantes; moteados comunes, medios, precisos; moderada reacción de carbonatos libres en la masa; límite inferior abrupto, suave.

Cn 77-110 cm; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco; masivo; blando; friable; no plástico, no adhesivo.

Observaciones: El ambiente incluye bajos encharcables (vías de agua). La distribución de la humedad es uniforme en todo el perfil (fresco). "Tosquillas"de carbono de calcio en la estructura del horizonte BC.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	Bt	BC	BCk	Cn
Profundidad (cm)	0-24	24-44	44-58	58-77	77-100
Mat. orgánica (%)	5,59	2,68	0,39	0,20	0,12
Carbono total (%)	3,25	1,56	0,23	0,12	0,07
Nitrógeno (%)	0,326	0,176	-	-	-
Relación C/N	9,9	8,9	-	-	-
Fósforo ppm	5,0	2,3	1,5	2,9	2,7
Arcilla <2 µ (%)	30,1	42,4	24,6	17,8	15,2
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	33,5	29,2	40,1	34,6	42,5
AMF 50-75 µ (%)	24,0	20,9	24,0	28,5	26,1
AMF 75-100 µ (%)	8,9	5,1	6,5	7,3	12,6
AMF 50-100 µ (%)	3,5	2,4	3,5	2,5	3,4
AF 100-250 µ (%)	0	0	0	0	0
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	1,3	9,3	0,2
Eq.humedad (%)	24,6	35,3	30,6	24,1	18,9
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,8	5,9	7,8	8,4	8,2
pH H2O 1:2,5	6,0	6,2	8,3	8,8	8,7
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-
Cationes de cambio	22,4	19,2	10,3	10,2	7,6
Ca++ m.eq./100gr	11,1	14,4	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	4,9	7,9	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,4	0,9	3,3	2,1	3,5
K+ m.eq./100gr	3,1	3,1	3,3	2,7	2,4
H+ m.eq./100gr	10,9	8,7	-	-	-
Na (% de T)	2	3	14	7	17
Suma de Bases	19,5	26,3	-	-	-
CIC m.eq./100gr	23,5	33,9	24,0	30,8	20,8
Sat. con bases (%)	83	78	-	-	-