CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Perfiles Representativos de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Los Alamos

## Descripción

Los Alamos es un perfil que se seleccionó para representar a suelos del ambiente continental que aparecen en posición de pendientes, en un sector suave a moderadamente ondulado cercano a la salina La Aurora (unidad geoedáfica Da), en el noroeste del partido. Es un perfil profundo, formado a partir de arenas, con permeabilidad rápida a muy rápida y algo excesivamente drenado.

El perfil de representativo está formado por materiales franco arenosos y areno francos. En superficie, se reconoce un horizonte Ap de 19 cm de espesor, moderadamente alcalino y con una provisión de materia orgánica cercana al 1 %. El horizonte A que se describe a continuación, tiene sólo 5 cm de espesor y presenta características similares al Ap. El horizonte transicional ACk aparece a los 24 cm y se extiende hasta los 48 cm de profundidad. Finalmente, un horizonte Ck fuertemente alcalino se describe hasta una profundidad de 130 cm.

**Clasificación taxonómica:** Haplustol éntico (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 38º 42' 22.3". Longitud W 62º 58' 36.4". El perfil Los Alamos fue reconocido a 10 km al NNO de la salina La Aurora.


**Drenaje y permeabilidad:** Algo excesivamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad rápida a muy rápida.

**Limitaciones de uso:** Clima, peligro de erosión eólica, drenaje excesivo.

**Índice de productividad:** 49

## Descripción del perfil típico:

**C-15**
**Fecha de muestreo: Noviembre de 1989**
**Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca**




**Ap** 0-19 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco arenoso a areno franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; moderadamente alcalino; límite abrupto, suave.

**A** 19-24 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco arenoso a areno franco; estructura en bloques subangulares finos, débiles; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; moderadamente alcalino; límite claro, suave.

**ACk** 24-48 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco; areno franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; moderadamente alcalino; débil reacción de los carbonatos libres en la masa; límite claro, suave.

**Ck** 48-130 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en húmedo; pardo muy pálido (10YR 7/4) en seco; areno franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; débil reacción de los carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Número de Laboratorio | 35115 | 35116 | 35117 | 35118 |
|---|---|---|---|---|
| Horizontes | Ap | A | ACk | Ck |
| Profundidad (cm) | 0-19 | 19-24 | 24-48 | 48-130 |
| Factor de Humedad | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Materia Orgánica (%) | 0.99 | 0.90 | 0.49 | 0.39 |
| Carbono Orgánico (%) | 0.57 | 0.52 | 0.28 | 0.22 |
| Nitrógeno (%) | 0.053 | 0.053 | - | - |
| Relación C/N | 11 | 10 | - | - |
| Fósforo (ppm) | 15.5 | 8.8 | 4.8 | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 9.3 | 8.8 | 4.5 | 4.0 |
| Limo 2-20 µ (%) | 2.7 | 1.7 | 4.2 | 4.2 |
| Limo 2-50 µ (%) | 11.6 | 10.3 | 15.1 | 15.4 |
| AMF 50-75 µ (%) | 12.0 | 14.0 | 11.7 | 11.7 |
| AMF 75-100 µ (%) | 16.1 | 20.6 | 15.6 | 20.1 |
| AMF 50-100 µ (%) | 28.1 | 34.6 | 27.3 | 31.8 |
| AF 100-250 µ (%) | 47.4 | 42.6 | 49.1 | 42.8 |
| AM 250-500 µ (%) | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.8 |
| AG 500-1000 µ (%) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| AMG 1-2 mm (%) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Calcáreo (%) | - | vest. | vest. | 1.6 |
| Equivalente de Humedad (%) | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 7.6 |
| Re. pasta. Ohms | - | - | - | - |
| Conductividad eléctrica (mS/cm) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| pH en pasta de saturación | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.1 |
| pH H2O (1:2.5) | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.5 |
| pH KCL (1:2.5) | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.5 |
| Cationes de Cambio | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 9.3 | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 0.9 | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| K+ m.eq./100gr | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 |
| H+ m.eq./100gr | - | - | - | - |
| PSI (%) | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Agua de Saturación (%) | 35 | 30 | 30 | 32 |
| Suma de bases [cmol(+)/kg] (S) | 11.8 | - | - | - |
| CIC [cmol(+)/kg] (T) | 9.2 | 9.8 | 8.6 | 9.4 |
| Saturación de bases (%) (S/T) | 100 | - | - | - |
| % de Saturación (S+H) | - | - | - | - |