CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Olascoaga (Olg)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo, de aptitud ganadera, que se encuentra en un paisaje de planos altos extendidos con ligeras depresiones y cubetas de la Subregión Pampa Ondulada alta, en posición de bajo, pobremente drenado, formado sobre sedimentos loéssicos de textura franco limosa fina, no alcalino, no salino con pendientes de 0 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Argialbol argiácuico, limosa fina, mixta, térmica, (USDA- Soil Taxonomy V. 2006).

Ubicación del perfil: Latitud: S 35° 18' 16''. Longitud: W 60º 34' 57'', Altitud: 61 m.s.n.m. a 6 km. al nor-noroeste en la localidad de Comodoro Py, partido Bragado, provincia de Buenos Aires; fotomosaico 3560-20-4, Comodoro Py.

Variabilidad de las características: Epipedón mólico (Ap) 15-20 cm; Value de 3 y chroma 2 en húmedo. (E) de 14-20 cm; límite abrupto-suave; argílico (Btc-Bts), 40-50 cm. Solum 90-110 cm; El (C) >de 100 cm. de profundidad.

Fases: Drenaje, anegabilidad, pendiente.

Series similares: Tambo Nuevo, Agustín Roca, Las Gamas.

Suelos asociados: Norumbega, Ortiz de Rosas, Lincoln, Teodelina, Nueve de Julio, Vedia, Morse.

Distribución geográfica: Noroeste a sudeste de los partidos de 25 de Mayo, Nueve de Julio, Pehuajó, Carlos Casares, Gral. Viamonte, Junín y Bragado, en la provincia de Buenos Aires.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento y permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Cultivo de soja (Glycine max), sectores sin germinar. El suelo presenta características apropiadas para la implantación de pasturas (ganadería).

Capacidad de uso: V w


Limitaciones de uso: No apto para cultivos. Drenaje deficiente; exceso de humedad; napa freática a 120 cm de profundidad, horizonte (Bt), fuertemente textural; frecuente anegabilidad.

Índice de productividad según la región climática: 50,0 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (Ap), Régimen de humedad ácuico, horizontes álbico y argílico bien desarrollados con espesor de 41 cm (Btc-Bts), relación arc. B/A = 1.4.

Descripción del perfil típico:

23/193 C
Fecha de muestreo: 23 de Diciembre de 1986
Reconocedores: Maldonado - Grimberg - Díaz - Malone



Ap 0-22 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, moderados; raíces abundantes; límite inferior abrupto y suave.

E 22-36 cm; pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco; prismas simples, débiles; moteados comunes, medios y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto y suave.

Btc 36-57 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas, medios, gruesos; plástico y adhesivo; abundantes concreciones de hierro y manganeso; abundantes barnices húmico-arcilloso; moteados abundantes, gruesos y precisos; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

Bt 57-77 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas medios, gruesos; plástico y adhesivo; escasas concreciones de hierro y manganeso; abundantes barnices húmico-arcilloso; moteados comunes, precisos y medios; límite inferior claro, suave.

BC 77-100 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, medios, moderados; ligeramente plástico y adhesivo; escasas concreciones de calcáreo; moteados escasos, finos y precisos; límite inferior claro, suave.

C 100-120 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; masivo.

W 120 cm; napa freática.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	E	Btc	Bt	BC	C
Profundidad (cm)	0-22	22-36	36-57	57-77	77-100	100-120
Mat. orgánica (%)	2,33	0,55	0,40	0,24	0,10	0,05
Carbono total (%)	1,35	0,32	0,23	0,14	0,06	0,03
Nitrógeno (%)	0,135	0,047	-	-	-	-
Fósforo (ppm)	15,1	1,2	1,8	1,8	2,9	3,5
Relación C/N	10	6,8	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	19	17,8	32,3	29,4	18,9	15
Limo 2-20 µ (%)	21,9	17,5	12,5	15,7	9,8	9,6
Limo 2-50 µ (%)	38,5	36,1	24,2	29,8	25,9	18,7
AMF 50-75 µ (%)	15,3	16,2	15	16,9	18,6	21,3
AMF 75-100 µ (%)	13,3	15,7	12,7	16,2	16,9	22,7
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	13,1	13,2	15	7	18,8	21,3
AM 250-500 µ (%)	0,8	1,0	0,8	0,7	0,9	1,0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	0	0	0
Eq.humedad (%)	21	18,6	26,5	27,4	19,4	14,2
Re. pasta Ohms	0	0	0	0	0	0
Cond. mmhos/cm	0	0	0	0	0	0
pH en pasta	5,6	6,0	6,2	7,5	7,2	7,3
pH H2O 1:2,5	6,1	6,5	6,8	7,9	7,5	7,7
pH KCL 1:2,5	5,0	5,1	5,3	6,5	6	6
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	6,9	6,9	14	17	12,8	9,7
Mg++ m.eq./100gr	2,7	2,2	4,6	7,2	2,5	4,9
Na+ m.eq./100gr	0,5	0,3	0,6	0,9	0,6	0,4
K+ m.eq./100gr	1,3	0,9	1,8	2,5	2,3	1,3
H+ m.eq./100gr	6,5	4,6	5,4	3,7	3,5	3
Na (% de T)	4,3	2,9	2,8	3,2	3,2	2,4
V.S m.eq./100gr	11,4	10,3	21	27,6	18,2	16,3
CIC m.eq./100gr	12,2	10,1	20,5	25,1	15,0	-
Sat. con bases (%)	93	100	100	100	100	100