CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Orense (Os)

Descripción

La serie Orense se desarrolla en un paisaje plano uniforme extendido en posicion tendida con pendientes inferiores al 1 %. La napa freatica se encuentra profunda.Es alcalino sodico debajo de los 20 cm de profundidad y no es salino.

Clasificación taxonómica: Hapludol thapto natrico, franca fina, mixta, termica.

Ubicación del perfil: Latitud S 38º 46' 7". Longitud W 59º 39' 40". Altura: 12 msnm, Ea. Huinca Zoo, a 13 km al SE de la localidad de Orense, partido de Tres Arroyos.

Drenaje y permeabilidad: Imperfectamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta.


Capacidad de uso: VI ws

Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sodica.

Índice de productividad según la región climática: 22.9 (D)

Descripción del perfil típico:

23/619 C
Fecha de muestreo: 15 de Diciembre de 1983
Reconocedores: Maldonado - Cuenca



Akn1 0-20 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en humedo; franco arenoso; migajosa, fina, debil; suelto en seco, muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; se observan detritos de conchilla; límite inferior difuso, suave.

Akn2 20-32 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco arenosa; bloques subangulares, medios, debiles que rompen a granular; blando en seco, friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; se observan detritos de conchilla; limite inferior claro, suave.

ACn 32-50 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco arenosa; masiva; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; moteados comunes, precisos y medios; raíces abundantes; se observan detritos de conchilla; limite inferior abrupto, suave.

2Btbn 50-76 cm; pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo arenosa; bloques subangulares, medios, moderados; firme en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio; abundantes barnices de arcilla y abundantes complejos húmico-arcillosos; moteados abundantes, precisos y medios; raíces comunes; se observan chorreaduras de materia orgánica; limite inferior claro, suave.

2BCbcn 76-95 cm; pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo arenosa; bloques subangulares, medios, moderados que rompen a granular; firme en húmedo, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio; moteados comunes, precisos y medios; escasos complejos húmico-arcillosos; raíces escasas.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Akn1	Akn2	ACn	2Btbn	2BCbcn
Profundidad (cm)	0-20	20-32	32-50	50-76	76-95
Materia Orgánica (%)	3.02	1.57	0.53	0.19	0.07
Carbono Orgánico (%)	1.75	0.91	0.31	0.11	0.04
Nitrógeno (%)	0.168	0.082	0.034	-	-
Relación C/N	10	11	9	-	-
Fósforo (ppm)	5.0	2.5	1.1	1.1	1.1
Arcilla <2 μ (%)	10.9	12.6	11.2	25.3	24.4
Limo 2-20 μ (%)	5.9	11.0	14.1	8.2	10.1
Limo 2-50 μ (%)	13.1	21.4	29.3	21.3	20.3
AMF 50-75 μ (%)	12.6	18.3	19.3	21.1	15.0
AMF 75-100 μ (%)	29.6	13.0	21.0	12.2	18.5
AMF 50-100 μ (%)	42.2	31.3	40.3	33.3	33.5
AF 100-250 μ (%)	12.4	27.5	18.2	18.5	20.5
AM 250-500 μ (%)	9.2	3.6	0.1	0.1	0.1
AG 500-1000 μ (%)	8.4	2.2	0.8	1.2	1.0
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	2.4	1.3	vest.	0.2	-
Equivalente de Humedad (%)	11.4	15.1	17.8	36.9	28.1
Re. pasta. Ohms	1863	2033	2711	762	2541
Conductividad eléctrica (mS/cm)	-	-	-	2.5	-
pH en pasta de saturación	7.0	8.0	8.6	8.5	8.3
pH H2O (1:2.5)	7.2	8.5	9.0	9.0	8.7
pH KCL (1:2.5)	6.8	7.1	7.1	7.3	6.8
Cationes de Cambio					
Ca++ m.eq./100gr	-	-	-	3.5	-
Mg++ m.eq./100gr	-	-	-	8.2	-
Na+ m.eq./100gr	2.0	3.2	5.0	11.7	12.7
K+ m.eq./100gr	0.7	0.7	0.8	1.5	1.8
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-	-
PSI (%)	8	28	48	58	53
Agua de Saturación (%)	-	-	-	-	-
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	-	-	-	26.1	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	14.2	11.5	10.5	20.1	23.7
Saturación de bases (%) (S/T)	-	-	-	100	-