CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Paraje Arenas Verdes (AV)

Descripción

Es un suelo arenoso poco profundo, desarrollado a partir de sedimentos marinos arenosos. Se encuentra en posición de interduna en un paisaje de dunas costeras de relieve norma con pendientes del 3 %. Es excesivamente drenado, de escurrimiento lento y permeabilidad rápida. Es alcalino desde la superficie y no salino. Sus limitaciones de uso son el grave peligro de erosión eólica, la deficiente retención de humedad, la baja fertilidad y la erosionabilidad no determinada. La napa freática se encuentra en profundidad.

Clasificación taxonómica: Cuarzipsamente típico, mixta, térmica.

Ubicación del perfil: Latitud S 38º 31' 3". Longitud W 58º 31' 33". Altitud 14 msnm, a 15.5 km al E de Necochea, partido de Lobería, provincia de Buenos Aires. Mosaico correspondiente a Carta topográfica IGM 3960-12-4, Necochea.

Drenaje y permeabilidad: Excesivamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad rápida.

Uso y vegetación: Vegetacion natural: Poa spp., Stipa spp., Panicum spp.


Capacidad de uso: VII es

Limitaciones de uso: Grave peligro de erosión eólica, deficiente retención de humedad, baja fertilidad.

Índice de productividad según la región climática: 2,4 (D)

Descripción del perfil típico:

25/548 C
Fecha de muestreo: 15 de Mayo de 1982



ACk 0-14 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en seco y pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; arenoso, sin estructura (granos simples sueltos); suelto en húmedo; no plástico, no adhesivo; abundantes concreciones calcáreas; abundantes raíces; fresco; moderados detritos de conchillas; limite claro, suave. suave.

C 14-60 cm; pardo (10YR 4/3) en húmedo; arenoso; sin estructura (granos simples suelto); suelto en húmedo; no plástico, no adhesivo; abundantes detritos de conchillas; fresco/húmedo.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	ACk	C
Profundidad (cm)	2-10	30-50
Materia Orgánica (%)	0.8	0.05
Carbono Orgánico (%)	0.45	0.03
Nitrógeno (%)	-	-
Relación C/N	-	-
Fósforo (ppm)	7.7	3.5
Arcilla <2 μ (%)	2.2	2.2
Limo 2-20 μ (%)	-	-
Limo 2-50 μ (%)	0.7	0.5
AMF 50-75 μ (%)	0.8	0.1
AMF 75-100 μ (%)	1.5	2.0
AMF 50-100 μ (%)	2.3	2.1
AF 100-250 μ (%)	63.8	71.2
AM 250-500 μ (%)	19.7	16.0
AG 500-1000 μ (%)	0.3	0.4
AMG 1-2 mm (%)	-	-
Calcáreo (%)	11.0	7.6
Equivalente de Humedad (%)	3.0	1.2
Re. pasta. Ohms	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	-	-
pH en pasta de saturación	7.8	8.5
pH H2O (1:2.5)	8.2	8.8
pH KCL (1:2.5)	-	-
Cationes de Cambio		
Ca++ m.eq./100gr	-	-
Mg++ m.eq./100gr	-	-
Na+ m.eq./100gr	0.5	0.2
K+ m.eq./100gr	0.5	0.3
H+ m.eq./100gr	-	-
PSI (%)	16	8
Agua de Saturación (%)	-	-
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	3.2	2.4
Saturación de bases (%) (S/T)	-	-
% de Saturación (S+H)	-	-