CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Puesto El Zorro (PEZ)

## Descripción

Los suelos que representa este perfil se reconocen en posición de bajo en la llanura litoral marina. El perfil típico que se describe a continuación presenta permeabilidad moderadamente lenta y está formado a partir de sedimentos limosos. Desde la superficie, el perfil es fuertemente salino y presenta elevados valores de sodio de intercambio.

El perfil denominado Puesto El Zorro está formado por tres capas sucesivas de materiales de textura franca a franco arcillosa. La capa Cknz1, de 20 cm de espesor, posee regular provisión de materia orgánica y reacción fuertemente alcalina. La capa 2Cknz2 tiene una potencia de 60 cm y moteados de hierro-manganeso, lo que denota su marcado hidromorfismo. Finalmente, se reconoce la capa 3Cknz3 que se extiende hasta los 140 cm de profundidad: presenta textura franco arcillosa y es fuertemente alcalina.

**Clasificación taxonómica:** Ustifluvent ácuico, franca fina, mixta, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 39º 17' 44.6". Longitud: W 62º 13' 49.6", a 7.5 km al NO del puesto El Zorro, en la Península Verde.

**Drenaje y permeabilidad:** Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta.

**Uso y vegetación:** Cobertura Vegetal 30 %.


**Capacidad de uso:** VIII

**Limitaciones de uso:** Salinidad, alcalinidad sódica, clima, peligro de anegamiento.

**Índice de productividad según la región climática:** 5.

## Descripción del perfil típico:

**C-42**
**Fecha de muestreo: Noviembre de 1989**
**Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca**




**Cknz1** 0-20 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco; franco; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; límite claro, suave.

**2Cknz2** 20-80 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco arcillo limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierro-manganeso comunes, medios y precisos; límite claro, suave.

**3Cknz3** 80-140 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris (10YR 5/1) en seco; franco arcilloso; masivo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | Cknz1 | 2Cknz2 | 3Cknz3 |
|---|---|---|---|
| Nº de laboratorio | 35447 | 35448 | 35449 |
| Profundidad (cm) | 0-20 | 20-80 | 80-140 |
| Factor de Humedad | 1.05 | 1.09 | 1.10 |
| Mat. orgánica (%) | 1.52 | 1.55 | 1.80 |
| Carbono Orgánico (%) | 0.88 | 0.90 | 1.10 |
| Nitrógeno (%) | 0.088 | 0.046 | 0.046 |
| Relación C/N | 20 | 20 | 24 |
| Fósforo asimilable (ppm) | 11.7 | 6.2 | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 20.4 | 33.5 | 29.4 |
| Limo 2-20 µ (%) | 18.3 | 26.9 | 19.2 |
| Limo 2-50 µ (%) | 47.5 | 42.2 | 41.2 |
| AMF 50-74 µ (%) | 13.8 | 11.1 | 7.5 |
| AMF 74-100 µ (%) | 5.9 | 4.8 | 4.9 |
| AMF 50-100 µ (%) | 19.7 | 15.9 | 12.4 |
| AF 100-250 µ (%) | 10.6 | 4.1 | 11.5 |
| AM 250-500 µ (%) | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| AG 500-1000 µ (%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| AMG 1-2 mm (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Calcáreo (%) | 0.6 | 4.1 | 5.3 |
| Eq.humedad (%) | 29.6 | 39.6 | 35.1 |
| Cond. de la pasta (mmhs/cm) | 27.2 | 35.3 | 34.6 |
| pH en pasta | 8.5 | 8.3 | 8.4 |
| pH H2O 1:2,5 | 9.0 | 8.8 | 8.9 |
| pH KCL 1:2,5 | 8.0 | 7.8 | 8.0 |
| Cationes de cambio | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 8.3 | 4.0 | 6.0 |
| K+ m.eq./100gr | 3.1 | 3.6 | 4.0 |
| PSI (%) | 32 | 15 | 21 |
| Agua de Saturación (%) | 48 | 68 | 63 |
| Suma de bases [cmol (+)/kg] (S) | - | - | - |
| CIC [cmol (+)/kg] (T) | 25.9 | 27.0 | 28.4 |
| Saturación de bases % (S/T) | - | - | - |
| Saturación % (S+H) | - | - | - |