CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Rawson (Rw)

## Descripción

Es un suelo oscuro, profundo, con fuerte desarrollo, su aptitud es ganadera, se lo encuentra en un paisaje de áreas plano algo deprimidas en posición de bajos cóncavos, dentro de la Subregión Pampa Ondulada alta, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos loéssicos franco limosos, no salino, con valores de sodio intercambiable que superan el 15 %, después de los 22 cm. de profundidad en pendientes de 0-0,5 %.

**Clasificación taxonómica:** Natralbol típico, limosa fina, mixta, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2006). Natracualf mólico, limosa fina, illítica, térmica (USDA-7ª aproximación S.T. V. 1975).

**Ubicación del perfil:** Latitud: S 34° 36' 05'', Longitud: W 60º 12' 24''. Altitud: 62 m.s.n.m. a 4 km. al este-noreste de la Estación San Patricio (F.C.G.S.M.), partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, Fotomosaico I.G.M. 3560-9-4, Rawson.

**Variabilidad de las características:** Epipedón mólico (A) de 20 a 30 cm; negro (10YR 2/1), gris muy oscuro (10YR3/1) y pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo; 18 a 22 % de arcilla; franco limoso y no sódico. Horizonte álbico (E) entre 6 y 10 cm; pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2 y 4/2) con sodio alrededor del 15 %. Sub-horizonte Bt de 30 a 50 cm. con value de 10 YR, a veces columnar; sodio 30-50 %; solum muy profundo (150-180 cm). Material originario (C) pardo a pardo oscuro (7,5YR 5/4 y 4/2) en húmedo. Los horizontes inferiores pueden aparecer algo cementado.

**Fases:** Drenaje y erosión hídrica en sus distintos grados.

**Series similares:** El Recuerdo, Aarón Castellanos.

**Suelos asociados:** Chacabuco, Ingeniero Silveyra.

**Distribución geográfica:** Al sur de los partidos de Salto y Carmen de Areco, Chacabuco, San Andrés de Giles, Suipacha, Alberti y Chivilcoy. Fotomosaicos: 3560-8; 3560-9; 3560-15 y 3560-16.

**Drenaje y permeabilidad:** Pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta a lenta.

**Uso y vegetación:** Ganadero. Pasturas naturales.

**Capacidad de uso:** VI ws


**Limitaciones de uso:** Drenaje, anegabilidad, alcalinidad sódica en profundidad, napa freática fluctuante a 1,5 m.

**Índice de productividad según la región climática:** 25,0 (A)

**Rasgos diagnósticos:** Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizonte álbico (E), horizontes nátrico con más del 15 % de sodio de intercambio (PSI) y argílico (Rel. % B/A arc. $>$1.2).

## Descripción del perfil típico:

**13/537 C**
**Fecha de muestreo: 17 de Octubre de 1966**
**Reconocedores: Peña - Rossetti - Scoppa**




**A** 0-22 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; duro; muy friable; raíces abundantes, presencia de lombrices, límite abrupto y ondulado.

**En** 22-32 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares medio débiles; duro; friable; no plástico, no adhesivo; raíces escasas; poroso; límite abrupto e irregular.

**Btn1** 32-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco arcillo limoso; prismas gruesos fuertes; extremadamente duro; muy firme, muy plástico y adhesivo; barnices húmico-arcillosos abundantes; raíces escasas; límite claro y suave.

**Btn2** 60-80 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco limoso; prismas gruesos, que rompe a bloques; duro; firme; ligeramente plástico y adhesivo; micro-concreciones calcáreas abundantes; barnices húmico-arcillosos abundantes; moteados abundantes, precisos y medios; límite claro y ondulado.

**BCcn** 80-158 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados que rompe a masivo; ligeramente duro; friable; no plástico y ligeramente adhesivo; micro-concreciones calcáreas abundantes; concreciones ferro-manganésicas abundantes; barnices húmico-arcillosos escasos; moteados abundantes, precisos, medios; poros comunes; límite claro y suave.

**Cn** 158-190 a + cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4 ) en húmedo; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco; franco limoso; no plástico y no adhesivo; micro-concreciones calcáreas escasas, concreciones ferromanganésicas escasas; moteados precisos, medios y abundantes; poros comunes.

**Observaciones:** El horizonte diagnóstico (E), de alrededor de 10 cm. de espesor a veces no cumple con los requerimientos de álbico.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | A | En | Btn1 | Btn2 | BCcn | Cn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 0-22 | 22-32 | 32-60 | 60-80 | 80-158 | 158 a + |
| Mat. orgánica ( %) | 4,15 | 1,74 | 1,12 | 0,62 | 0,36 | 0,34 |
| Carbono total ( %) | 2,41 | 1,01 | 0,65 | 0,36 | 0,21 | 0,20 |
| Nitrógeno ( %) | 0,212 | 0,097 | 0,071 | 0,051 | 0,034 | 0,023 |
| Relación C/N | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Arcilla <2 µ ( %) | 19,4 | 14,1 | 32,2 | 17,3 | 12,4 | 8,6 |
| Limo 2-20 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| Limo 2-50 µ ( %) | 59,5 | 66,4 | 49,6 | 65,3 | 62,6 | 62,00 |
| AMF 50-75 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| AMF 75-100 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| AMF 50-100 µ ( %) | 20,5 | 18,5 | 7,3 | 16,0 | 23,6 | 27,7 |
| AF 100-250 µ ( %) | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
| AM 250-500 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| AG 500-1000 µ ( %) | - | - | - | - | - | - |
| AMG 1-2 mm ( %) | - | - | - | - | - | - |
| Calcáreo ( %) | - | - | - | - | - | - |
| Eq.humedad ( %) | 26,0 | 21,6 | 47,6 | 31,8 | 24,0 | 18,0 |
| Re. pasta Ohms | - | - | - | - | - | - |
| Cond. mmhos/cm | - | - | - | - | - | - |
| pH en pasta | 6,2 | 7,5 | 8,1 | 8,9 | 8,9 | 8,5 |
| pH H2O 1:2,5 | 6,9 | 8,1 | 8,4 | 9,2 | 9,0 | 8,7 |
| pH KCL 1:2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Cationes de cambio | | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 11,2 | 6,7 | 8,7 | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 3,6 | 2,9 | 7,0 | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 1,1 | 2,2 | 8,5 | 7,9 | 6,6 | 4,2 |
| K+ m.eq./100gr | 1,5 | 1,0 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | - |
| H+ m.eq./100gr | 7,7 | 2,9 | 4,3 | - | - | - |
| Na ( % de T) | 5,5 | 16,0 | 30,0 | 35,0 | 36,6 | 29,0 |
| V.S m.eq./100gr | 17,4 | 12,8 | 26,9 | - | - | - |
| CIC m.eq./100gr | 20,0 | 13,6 | 28,2 | 22,3 | 18,0 | 14,2 |
| Sat. con bases ( %) | 87 | 94 | 95 | - | - | - |