CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Rojas (Ro)

## Descripción

Es un suelo oscuro, profundo, bien provisto de materia orgánica y bien drenado, no alcalino, no salino. Se encuentra en las lomas planas y extendidas con gradiente de 0 a 1 %, de la Subregión Pampa Ondulada. Se ha formado sobre sedimentos loéssicos franco limosos.

**Clasificación taxonómica:** Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2006).

**Ubicación del perfil:** Latitud: S 34º 08' 08z Longitud W 60º 59' 45". Altitud: 80 msnm a 15,5 km al sud-sudoeste de Carabelas, partido de Rojas, provincia de Buenos Aires; hoja I.G.M .3560-2-1, Carabelas.

**Variabilidad de las características:** El espesor del horizonte A varía entre 22 y 30 cm y la textura es siempre franco limosa con contenidos de arcilla que oscilan entre 19 y 26 %. El Bt tiene un espesor que varía entre 30 y 80 cm y la textura entre franco arcillo limosa a franco arcillosa con contenidos de arcilla entre 28 y 38 %. El espesor del solum varía entre 110 y 190 cm.

**Fases:** En el oeste de la Hoja Pergamino se localizan fases por drenaje y pendiente en diversos grados.

**Series similares:** Hughes, Arroyo Dulce.

**Suelos asociados:** En varias unidades forma complejos con las series El Recuerdo, Wheelwright y El Arbolito, en los contactos geográficos con la serie Delgado aparece asociada a ésta, en las pendientes, forma asociaciones con la serie Indart.

**Distribución geográfica:** En las lomas planas y extendidas de los partidos de Salto, Rojas, Colón y del extremo nordeste de General Arenales; provincias de Santa Fe y Buenos Aires respectivamente.

**Drenaje y permeabilidad:** Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada.

**Uso y vegetación:** Maíz (Zea maíz). Suelo apto para uso Agrícola con implantación de cultivos realizados con labranza convencional.

**Capacidad de uso:** I


**Limitaciones de uso:** Sin limitaciones ni restricciones para uso agrícola.

**Índice de productividad según la región climática:** 95 (A), 90 (B)

**Rasgos diagnósticos:** Régimen de humedad údico. Epipedón mólico que incluye los horizontes Ap1, Ap2 y horizonte argílico.

## Descripción del perfil típico:

**7/78 C**
**Fecha de muestreo: 14 de Julio de 1967**
**Reconocedores: Salcedo**




**Ap1** 0-13 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; granular fina débil; muy friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; límite claro, suave.

**Ap2** 13-28 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco a franco limoso; bloques angulares medios moderados; muy friable; no plástico, no adhesivo; raíces comunes; límite claro, suave.

**AB** 28-36 cm; pardo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco a franco limoso; prismas irregulares medios débiles que rompe en bloques medios moderados; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices "clayskins" escasos; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

**Bt1** 36-62 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas regulares medios moderados que rompe en bloques angulares y subangulares medios; friable; plástico, adhesivo; barnices "clayskins" abundantes, medios; raíces escasas; límite gradual, suave.

**Bt2** 62-78 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas irregulares medios débiles; friable; plástico, adhesivo; barnices "clayskins" comunes; límite gradual, suave.

**BC** 78-115 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; bloques angulares y subangulares medios débiles; friable; ligeramente plástico, no adhesivo; barnices "clayskins" escasos, finos y medios; raíces escasas; límite inferior difuso.

**C** 115-235 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; friable; no plástico, no adhesivo; raíces vestigios; límite inferior difuso.

**Ck** 235-275 a + cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; suelto; no plástico, no adhesivo; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | Ap1 | Ap2 | AB | Bt1 | Bt2 | BC | C | Ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 0-13 | 13-28 | 28-36 | 36-62 | 62-78 | 78-115 | 115-235 | 235-275 |
| Mat. orgánica ( %) | 3,05 | 3,05 | 1,72 | 0,76 | 0,57 | 0,39 | 0,22 | - |
| Carbono total ( %) | 1,77 | 1,77 | 1,00 | 0,44 | 0,33 | 0,23 | 0,13 | - |
| Nitrógeno ( %) | 0,172 | 0,173 | 0,115 | 0,040 | 0,038 | 0,030 | - | - |
| Relación C/N | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | - | - |
| Fósforo (PPM) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arcilla <2 µ ( %) | 22,9 | 23,7 | 25,5 | 35,5 | 27,8 | 16,9 | 14,4 | 12,3 |
| Limo 2-20 µ ( %) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limo 2-50 µ ( %) | 49,4 | 46,8 | 48,3 | 39,0 | 42,0 | 43,8 | 46,6 | 52,3 |
| AMF 50-75 µ ( %) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMF 75-100 µ ( %) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMF 50-100 µ ( %) | 26,8 | 28,6 | 25,0 | 24,4 | 29,2 | 37,7 | 37,3 | 31,1 |
| AF 100-250 µ ( %) | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 2,2 |
| AM 250-500 µ ( %) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AG 500-1000 µ ( %) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMG 1-2 mm ( %) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Calcáreo ( %) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| Eq.humedad ( %) | 21,8 | 22,1 | 22,5 | 25,8 | 23,3 | 15,9 | 14,2 | 14,6 |
| Re.pasta.Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cond. mmhos/cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pH en pasta | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,7 | 8,0 |
| pH H2O 1:2,5 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 8,4 |
| pH KCL 1:2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cationes de cambio | | | | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 11,1 | 10,5 | 10,5 | 11,1 | 11,2 | 7,6 | 7,3 | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 2,9 | 4,1 | 3,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,6 | - |
| Na+ m.eq./100gr | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| K+ m.eq./100gr | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,6 |
| H+ m.eq./100gr | 6,3 | 5,9 | 4,9 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 1,8 | - |
| Na ( % de T) | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | - |
| V.S m.eq./100gr | 16,0 | 16,6 | 15,3 | 17,6 | 17,7 | 14,1 | 13,6 | - |
| CIC m.eq./100gr | 18,1 | 18,4 | 17,0 | 20,5 | 18,7 | 14,0 | 12,5 | 8,2 |
| Sat.con bases ( %) | 88 | 90 | 90 | 86 | 95 | 100 | 100 | - |