CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Santa Adela (SAd)

Descripción

Es un suelo de textura franco arcillo arenosa a franco arenosa, es moderadamente profundo, se desarrolló a partir del depósito de arenas cuaternarias sobre tosca. Se encuentra en los bajos de ambiente continental. Con pendientes de a 1 %, áreas muy suavemente a suavemente onduladas. Es un suelo algo excesivamente drenado, de escurrimiento lento y permeabilidad moderadamente rápida. Es muy levemente alcalino en profundidad y no salino. Las limitaciones de uso corresponden al peligro de erosión eólica y la baja retención de húmedad.

Clasificación taxonómica: Haplustol éntico, franca fina, mixta, térmica.

Ubicación del perfil: Latitud S 39º 1' 15.01". Longitud W 62º 40' 29.51". Altitud 25 msnm, a 10 km al ONO de la localidad de Teniente Origone, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires. Mosaico correspondiente a Carta topográfica IGM 3963-22-2, Teniente Origone.

Drenaje y permeabilidad: Algo excesivamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente rápida.

Uso y vegetación: Cpbertura vegetal 90 %.


Capacidad de uso: IV ec

Limitaciones de uso: Peligro de erosión eólica, baja retención de humedad.

Índice de productividad según la región climática: 24.8 (F)

Descripción del perfil típico:

C-33
Fecha de muestreo: Noviembre de 1989
Reconocedores: Luis Gómez - Miguel Cuenca



A 0-18 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco, pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; masivo; ligeramente firme en húmedo, no plástico, no adhesivo; raíces comunes; límite claro, suave.

AC 18-38 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso; masivo; ligeramente firme en húmedo, no plástico, no adhesivo; rodados hasta 1 cm de diámetro; raíces escasas; límite claro, suave.

Ck1 38-70 cm; pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco, pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; friable en húmedo, no plástico, no adhesivo; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; rodados hasta 1 cm de diámetro; raíces escasas; límite abrupto, suave.

Ck2 70-90 cm; rosado (7.5YR 8/4) en seco, pardo claro (7.5YR 6/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; friable en húmedo, no plástico, no adhesivo; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; rodados hasta 1 cm de diámetro; raíces escasas; límite abrupto, suave.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

úmero de Laboratorio	35189	35190	35191	35192
Horizontes	A	AC	Ck1	Ck2
Profundidad (cm)	0-18	18-38	38-70	70-90
Factor de Humedad	1.03	1.03	1.03	1.05
Materia Orgánica (%)	2.40	1.23	0.65	0.51
Carbono Orgánico (%)	1.30	0.71	0.38	0.29
Nitrógeno (%)	0.094	0.072	0.051	-
Relación C/N	14	10	8	-
Fósforo (ppm)	18.5	7.8	-	-
Arcilla <2 µ (%)	26.2	19.0	18.2	19.3
Limo 2-20 µ (%)	13.9	14.9	14.4	9.1
Limo 2-50 µ (%)	26.1	22.9	26.6	12.2
AMF 50-75 µ (%)	8.4	10.3	8.3	2.7
AMF 75-100 µ (%)	5.5	9.0	8.0	3.5
AMF 50-100 µ (%)	13.9	19.3	16.3	6.2
AF 100-250 µ (%)	27.0	30.2	27.0	8.2
AM 250-500 µ (%)	5.7	6.8	6.2	3.0
AG 500-1000 µ (%)	1.1	1.8	2.2	1.3
AMG 1-2 mm (%)	-	-	0.7	0.8
Calcáreo (%)	-	-	2.8	49.0
Equivalente de Humedad (%)	22.4	19.3	18.5	23.3
Re. pasta. (Ohms/cm)	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	0.4	0.3	0.3	0.4
pH en pasta de saturación	6.7	6.9	7.9	8.3
pH H2O (1:2.5)	7.0	7.3	8.4	8.7
pH KCL (1:2.5)	6.0	6.0	7.0	7.2
Cationes de Cambio				
Ca++ m.eq./100gr	19.8	16.7	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2.4	2.6	-	-
Na+ m.eq./100gr	0.36	0.4	0.6	0.8
K+ m.eq./100gr	2.3	2.0	1.3	1.6
H+ m.eq./100gr	4.1	2.7	-	-
PSI (%)	1	1	3	4
Agua de Saturación (%)	50	45	34	40
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	24.8	21.7	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	26.9	22.6	19.4	18.3
Saturación de bases (%) (S/T)	92	96	-	-
% de Saturación (S+H)	85	89	-	-