CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Tandileofú (Tdf)

Descripción

Es un suelo profundo, de aptitud ganadera, que se encuentra en una planicie baja de áreas deprimidas, próximo a los cursos de arroyos y bajos de la Subregión Pampa Deprimida Oriental, transición a la Subregión de Sierra y Pedemonte de Tandilia, en posición de bajo, pobremente drenado, evolucionado sobre sedimentos limosos fluvio lacustres, palustres, fuerte alcalinidad y leve salinidad después de los 26 cm de profundidad, con pendientes de 0 a 0.5 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf mólico, fina, illítica, muy profunda, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 37° 9' 15.01", longitud W 58º 52' 40.03". Altitud: 116 msnm, Ea. Santa Martha, a 11.3 km al N de la localidad de Iraola, partido de Ayacucho, provincia Buenos Aires; hoja IGM 3760-24-1, Estancia La Barrancosa.

Variabilidad de las características: El contenido de sodio intercambiable, inferior al 15 % por debajo de los 25 cm de profundidad, limo de 2 a 50 entre 35 a 47 %. Colores con valores (Value de 2 y 3, chroma de 0 y 1).

Fases: Alcalina sódica de superficie.

Series similares: Chelforó.

Suelos asociados: Formando complejo con Azul, Tandil, Tres Esquinas, Chelforó y Las Armas.

Distribución geográfica: Partidos de Azul, Balcarce, Lobería; mosaicos 3760-10, 16, 36 y 3757-31.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad muy lenta.

Uso y vegetación: Ganadero, no apto para cultivos. Duraznillo blanco (Solanum glaucum), Pelo de chancho (Distichlis spicata), Mentha (Mentha rotundifolia).

Capacidad de uso: VI ws


Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica.

Índice de productividad según la región climática: 13,5 (D)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico, no reúne requisitos para mólico por tener espesor 15 cm, cumple con los requisitos de color, y materia orgánica, incluye horizonte (An), régimen de humedad ácuico, horizontes nátrico y argílico entre los 26 y 80 cm.

Descripción del perfil típico:

12/2963 C
Fecha de muestreo: 22 de Marzo de 1973



A 0-15 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris muy oscuro (10YR 3/1) en seco; franco; bloques subangulares y angulares medios, moderados que rompe a bloques menores y granular; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces abundantes; fresco; límite claro, suave.

Ecn 15-23 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en seco; franco; masivo a bloques irregulares medio débiles que rompe a grano simple; duro; muy friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; concreciones de hierro y manganeso abundantes; moteados abundantes, precisos y medios; raíces escasas; límite abrupto, ondulado.

2Btn1 23-56 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; arcilloso; columnas gruesas, fuertes, rompe a prismas simples irregulares medio fuertes; extremadamente duro; firme; muy plástico y muy adhesivo; escasas concreciones de calcáreo; barnices húmico-arcillosos abundantes; moteados comunes medios y precisos; raíces escasas; formaciones especiales: cabezas columnares lixiviadas; límite claro, suave.

2Btn2 56-78 cm; pardo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo oscuro (10YR 4/3) en seco; arcilloso; prismas medios fuertes, rompe a bloques finos fuertes; muy duro; firme; muy plástico y muy adhesivo; concreciones de calcio comunes; barnices húmico-arcillosos abundantes; moteados comunes medios precisos; raíces escasas; límite claro, suave.

2BCn 78-127 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco; franco arcilloso; bloques subangulares gruesos, moderados, rompe a bloques subangulares medios; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso y calcio comunes; barnices arcillosos comunes; moteados abundantes medios precisos; raíces escasas; límite abrupto, ondulado.

3Ckn1 127-159 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; laminar a bloques medios moderados; duro; firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de calcio abundantes; moteados comunes medios precisos; fuerte reacción a los carbonatos; límite claro, ondulado.

3Ckn2 159-165 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; ligeramente duro; ligeramente firme; laminar, medio moderado; concreciones de calcio abundantes; moteados abundantes sobresalientes y gruesos.

Observaciones: El horizonte 3Ckn2, no fue analizado por el alto contenido de carbonatos de calcio (CaCO3), fluctuaciones de la capa freática.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	Ecn	2Btn1	2Btn2	2BCn	3Ckn1	3Ckn2
Profundidad (cm)	5-12	16-21	26-53	58-76	80-120	130-155	160-165
Mat. orgánica (%)	5,12	0,82	0,79	0,32	0,22	-	-
Carbono total (%)	2,97	0,48	0,46	0,19	0,13	-	-
Nitrógeno (%)	0,304	0,053	0,050	-	-	-	-
Relación C/N	10	9	9	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	22,2	17,3	54,3	45,9	36,9	24,4	-
Limo 2-20 µ (%)	25,5	24,8	12,7	18,9	23,0	21,4	-
Limo 2-50 µ (%)	45,9	47,7	25,5	28,2	37,0	41,7	-
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0	0	-
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0	-
AMF 50-100 µ (%)	31,2	34,5	19,8	25,0	25,5	31,5	-
AF 100-250 µ (%)	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,8	-
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0	-
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0	-
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0	-
Calcáreo (%)	0	0	vest.	0,4	vest.	1,6	40,8
Eq.humedad (%)	24,8	20,4	60,7	45,8	41,0	30,8	31,5
Re. pasta Ohms	2474	8921	872	973	1845	1703	2352
Cond. mmhos/cm	-	-	1,82	1,19	-	-	-
pH en pasta	5,4	7,3	8,3	8,3	7,8	8,0	8,2
pH H2O 1:2,5	6,1	7,5	9,2	9,4	8,9	9,1	8,9
pH KCL 1:2,5	5,0	5,9	7,2	7,3	6,5	7,4	7,6
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	7,9	4,0	-	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	3,1	3,3	-	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,6	0,9	5,0	6,1	4,5	10,2	-
K+ m.eq./100gr	1,8	0,7	3,0	3,9	2,7	3,0	-
H+ m.eq./100gr	8,6	1,8	-	-	-	-	-
Na (% de T)	5,2	10,8	21,0	24,0	23,0	52,0	-
Suma de Bases	13,4	8,9	-	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	17,3	8,3	24,2	25,0	19,9	19,7	-
Sat. con bases (%)	77	100	-	-	-	-	-