CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Tronconi (Tri)

Descripción

Es un suelo pardo grisáceo, somero, fuertemente desarrollado, de aptitud ganadera que se encuentra en una planicie muy extendida de la Subregión Pampa Ondulada baja, transición a la Subregión Pampa Arenosa, ocupando los microrelieves, formado sobre sedimentos loéssicos limosos finos, algo pobremente drenado, alcalinidad sódica, moderada salinidad con pendientes de 0-0,5 %.

Clasificación taxonómica: Duracuol nátrico, limosa fina, mixta, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 2006).

Ubicación del perfil: Latitud S 35º 49' 42.45". Longitud W 58º 53' 25.23". Altitud 23 m.s.n.m. a 17,7 km al SSE de Estación Gorchs, partido de Monte, provincia de Buenos Aires, mosaico I.G.M. 3560-36-1, Gorchs.

Variabilidad de las características: Algunos perfiles pueden tener 3 mmhos. de conductividad eléctrica, otros presentan planos de fricción en ángulos de 45° (Slikensides). Variación del espesor del horizonte argílico mayor de 87 cm.

Fases: Se reconocieron por drenaje y anegabilidad en sus distintos grados.

Series similares: No se registró.

Suelos asociados: Formando una consociación con la serie Goyeneche, y en asociación con Saladillo, Pueblitos, Tuyutí, Estación Chas, La Libertad, Videla Dorna, y La Albina.

Distribución geográfica: Partidos de Monte, Saladillo, Roque Pérez, Las Flores, Veinticinco de Mayo, en las hojas I.G.M. 3560-36, 35, 34, 30, 29, 28 y 3557-31.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Ganadería. Pastura natural e implantación artificial: Gramilla (Cynodon dactylom), Trébol de carretilla (Medicago arabiga), Altamisa (Artemisia annua), Cardo negro (Cirsium vulgare), Trébol blanco (Trifolium repens), Gramilla (Cynodon dactilon). Cobertura vegetal del 80 % aproximadamente.

Capacidad de uso: VI ws


Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica, poca anegabilidad.

Índice de productividad según la región climática: 12,2.

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizontes diagnósticos: duripán, nátrico (alcalinidad sódica >15 % sodio), argílico (% increm. arc. B/A 1.6,) y nátrico con alcalinidad sódica >15 % sodio.

Descripción del perfil típico:

3/1993 C
Fecha de muestreo: 26 de Octubre de 1973
Reconocedores: Ferrao - Ramayo



Ap 0-28 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco; bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro; friable; no plástico, no adhesivo; friable; moteados comunes, medios y precisos; abundantes raíces; límite abrupto y ondulado.

2Btckn 28-47 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (7,5YR 4/2) en seco; franco arcilloso; semicolumnar, que rompe a a prismas compuestos regulares, medios y fuertes; extremadamente duro; firme; muy plástico; muy adhesivo; abundantes concreciones de hierro-manganeso y concreciones de carbonato de calcio; barnices húmico arcillosos abundantes; moteados abundantes medios y precisos; abundantes raíces; algo gleyzado; límite claro y suave.

3BCkmn 47-84 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 5/6) en seco; franco arcilloso arenoso; duripán; muy firme; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas y concreciones de carbonato de calcio abundantes; barnices húmico arcillosos escasos; moteados de hierro-manganeso abundantes, gruesos, precisos ; formaciones especiales: débil reacción a los carbonatos libres; límite gradual y ondulado.

3BCknz 84-115 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; gris rosa (7,5YR 7/2) en seco; franco; no plástico; no adhesivo; ligeramente firme; concreciones de hierro-manganeso escasas; concreciones de calcio abundantes; moteados de hierro comunes, medios y precisos; formaciones especiales: moderada reacción a los carbonatos libres; poroso.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	2Btckn	3BCkmn	3BCknz
Profundidad (cm)	10-20	30-45	50-55	55-115
Mat. orgánica (%)	2,51	0,75	-	-
Carbono total (%)	1,46	0,44	-	-
Nitrógeno (%)	0,152	0,056	-	-
Relación C/N	10	8	-	-
Arcilla <2 µ (%)	18,0	35,2	28,6	22,3
Limo 2-20 µ (%)	16,0	9,5	10,9	11,6
Limo 2-50 µ (%)	34,5	20,7	26,1	30,5
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	43,0	39,5	40,1	41,1
AF 100-250 µ (%)	4,5	4,6	5,2	6,1
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0
Calcáreo (%)	-	vest.	vest.	vest.
Eq.humedad (%)	19,0	51,5	30,9	24,2
Re. pasta Ohms	2272	1058	749	697
Cond. mmhos/cm	-	1,96	3,01	4,74
pH en pasta	6,9	8,4	8,9	8,7
pH H2O 1:2,5	7,7	9,3	9,8	9,7
pH KCL 1:2,5	6,5	7,2	8,1	8,1
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	7,1	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	5,2	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,4	7,6	12,7	10,1
K+ m.eq./100gr	1,9	3,7	3,5	2,9
H+ m.eq./100gr	3,1	-	-	-
Na (% de T)	2,7	25,0	53,0	52,0
Suma de Bases	14,6	-	-	-
CIC m.eq./100gr	14,8	30,2	24,1	19,3
Sat. con bases (%)	99	-	-	-