CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Vidriera (Vdr)

## Descripción

Es un suelo profundo que presenta la napa de agua a los 100 cm de profundidad y se desarrolló a partir de capas limosas cuaternarias, se encuentra en áreas muy suavemente a suavemente onduladas. Es moderadamente bien drenado, de escurrimiento lento y moderada permeabilidad. Es un suelo sódico y débilmente salino. Las limitaciones de uso están relacionadas a la alcalinidad sódica desde la superficie, la salinidad, el clima y el peligro de erosión eólica.

**Clasificación taxonómica:** Ustifluvent típico, franca fina, mixta, térmica.

**Ubicación del perfil:** Latitud S: 38º 41' 19.94". Longitud O: 62º 46' 46.04", a 16 km al NE de la Salina La Aurora (Aerofoto IIR 628-13, Mosaico 3963-16-1), partido de Villarino, provincia de Buenos Aires.


**Drenaje y permeabilidad:** Moderadamente bien drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderada.

**Limitaciones de uso:** Alcalinidad sódica desde superficie; salinidad, clima, peligro de erosión hídrica.

**Índice de productividad según la región climática:** 22

## Descripción del perfil típico:

**C - 8**
**Fecha de muestreo: Noviembre de 1989**
**Reconocedores: Luis Gómez - Miguel Cuenca**




**Ck** 0-12 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos, moderados; ligeramente friable, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; seco; raíces comunes; límite abrupto, suave.

**2Ck** 12-26 cm; pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco, pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco; laminar, fino, débil; ligeramente friable, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; fresco; raíces escasas; límite abrupto, suave.

**3Ck** 26-33 cm; pardo muy pálido (10YR 7/4) en seco, pardo amarillento (10YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; friable; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; concreciones de carbonato de calcio, comunes; fresco; límite abrupto, suave.

**4Ck** 33-62 cm; pardo muy pálido (10YR 7/3) en seco, pardo (10YR 5/3) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; fresco; límite claro, suave.

**5Ck** 62-115 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; fresco/húmedo.

**H2O** 115 a + cm.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Número de Laboratorio | 35087 | 35088 | 35089 | 35090 | 35091 |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizontes | Ck | 2Ck | 3Ck | 4Ck | 5Ck |
| Profundidad (cm) | 4-10 | 16-24 | 27-32 | 35-60 | 70-115 |
| Factor de Humedad | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| Materia Orgánica (%) | 3.20 | 0.40 | 0.66 | 0.34 | 0.22 |
| Carbono Orgánico (%) | 1.80 | 0.23 | 0.38 | 0.20 | 0.13 |
| Nitrógeno (%) | 0.160 | - | 0.032 | - | - |
| Relación C/N | 11 | - | 12 | - | - |
| Fósforo (ppm) | 7.3 | 12.1 | 4.0 | 2.4 | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 20.3 | 14.4 | 22.4 | 20.1 | 19.8 |
| Limo 2-20 µ (%) | 31.1 | 13.9 | 22.6 | 21.2 | 18.4 |
| Limo 2-50 µ (%) | 64.8 | 41.1 | 46.1 | 52.3 | 54.1 |
| AMF 50-75 µ (%) | 7.1 | 17.2 | 12.0 | 11.6 | 12.3 |
| AMF 75-100 µ (%) | 4.5 | 8.7 | 3.2 | 2.2 | 4.7 |
| AMF 50-100 µ (%) | 11.6 | 25.9 | 15.2 | 13.8 | 17.0 |
| AF 100-250 µ (%) | 0.8 | 10.5 | 5.5 | 1.3 | 2.6 |
| AM 250-500 µ (%) | - | - | - | - | - |
| AG 500-1000 µ (%) | - | - | - | - | - |
| AMG 1-2 mm (%) | - | - | - | - | - |
| Calcáreo (%) | 2.5 | 8.1 | 10.8 | 12.5 | 6.5 |
| Equivalente de Humedad (%) | 42.2 | 24.2 | 42.2 | 35.8 | 33.4 |
| Re. pasta. (Ohms/cm) | - | - | - | - | - |
| Conductividad eléctrica (mS/cm) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 1.4 |
| pH en pasta de saturación | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.0 |
| pH H2O (1:2.5) | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.6 |
| pH KCL (1:2.5) | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.8 |
| Cationes de Cambio | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | - | - | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | - | - | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 9.3 | 8.4 | 17.7 | 9.3 | 9.7 |
| K+ m.eq./100gr | 3.2 | 2.8 | 5.0 | 3.0 | 4.8 |
| H+ m.eq./100gr | - | - | - | - | - |
| PSI (%) | 36 | 48 | 50 | 35 | 39 |
| Agua de Saturación (%) | 56 | 43 | 80 | 78 | 59 |
| Suma de bases [cmol(+)/kg] (S) | - | - | - | - | - |
| CIC [cmol(+)/kg] (T) | 25.5 | 17.3 | 35.0 | 26.2 | 24.5 |
| Saturación de bases (%) (S/T) | - | - | - | - | - |
| % de Saturación (S+H) | - | - | - | - | - |

Cuadro 2: Extracto de suelo saturado

.

| Número de Laboratorio | 35087 | 35088 | 35089 | 35090 | 35091 |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizontes | Ck | 2Ck | 3Ck | 4Ck | 5Ck |
| Profundidad (cm) | 4-10 | 16-24 | 27-32 | 35-60 | 70-115 |
| pH | 7.8 | 9.0 | 9.1 | 7.7 | 8.0 |
| Conductividad eléctrica (mS/cm) | 1.3 | 4.1 | 4.8 | 3.6 | 2.5 |
| Cationes (meq/l) | | | | | |
| Ca++ | 1.30 | 0.54 | 0.63 | 1.70 | 0.80 |
| Mg++ | 1.30 | 0.64 | 1.55 | 1.60 | 0.90 |
| Na+ | 11.60 | 39.60 | 50.80 | 38.00 | 22.40 |
| K+ | 0.40 | 1.60 | 3.60 | 0.80 | 0.60 |
| Aniones (meq/l) | | | | | |
| CO3- - | - | 0.20 | 0.20 | - | - |
| HCO3- | 3.20 | 8.20 | 6.00 | 4.80 | 6.80 |
| SO4- - | 10.00 | 0.30 | 18.50 | 25.50 | 9.90 |
| CL- | 2.80 | 37.60 | 32.00 | 7.20 | 4.80 |
| Relación de Adsorción de Sodio (RAS) | 10 | 51 | 48 | 29 | 24 |