CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Villa Cañás (VC)

Descripción

Es un suelo liviano, profundo, con aptitud agrícola que ocupa áreas que presentan un paisaje suavemente ondulado de depresiones o antiguas hoyas medanosas estabilizadas, en posición de bajos, en la Subregión Pampa Ondulada alta próximo al límite con la Pampa Arenosa, bien drenado, desarrollado a partir de un sedimento franco limoso grueso, no alcalino, no salino, con pendientes que no superan el 0-0,5 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica.

Ubicación del perfil: Latitud S 33° 58' 9''. Longitud W 61° 39' 57''. Altitud 103 msnm, a 7 km al NO de la localidad de Villa Cañas, departamento General López, provincia de Santa Fe.

Variabilidad de las características: El epipedón mólico puede alcanzar los 60 cm de espesor, incluyendo el techo del BA. Se observan variables tenores de limo en el material originario desde 45 a 75 % dependiendo del tipo de hoya donde se encuentre el perfil.

Fases: Por drenaje.

Series similares: Teodelina, de la que se diferencia por tener el horizonte B menos desarrollado y no presentar hidromorfismo como aquella.

Suelos asociados: Santa Isabel y Venado Tuerto.

Distribución geográfica: Este del departamento de General López, provincia de Santa Fe y este del partido de General Arenales, en la provincia de Buenos Aires. Hojas I.G.M. 3560-1-1; 3360-31-3 y 3563-6-4.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada, sin peligro de anegamiento.

Uso y vegetación: Rastrojo de maíz (Zea maíz).


Capacidad de uso: I

Limitaciones de uso: Sin limitaciones.

Índice de productividad según la región climática: 90 (A)

Descripción del perfil típico:

6/485 C
Fecha de muestreo: 27 de Octubre de 1966
Reconocedores: Salcedo, Wembter, Ventura



Ap 0-21 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco arcillo limoso; granular media moderada; muy friable; no plástico, no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

A 21-36 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares; friable; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.

BA 36-49 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios débiles; friable; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.

Bt1 49-70 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco arcilloso prismas medios fuertes; firme; plástico; adhesivo; barnices "clay skins" abundantes; límite inferior gradual, suave.

Bt2 70-100 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco arcilloso; prismas medios débiles; firme; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "clay skins" escasos; límite inferior gradual.

BC 100-160 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; franco; bloques subangulares medios débiles; friable; no plástico; no adhesivo; límite difuso.

C 160-185 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; muy friable.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	BA	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad (cm)	0-21	21-36	36-49	49-70	70-100	100-160	160-185
Mat. orgánica (%)	4,96	3,45	2,07	1,39	0,76	0,52	-
Carbono total (%)	2,88	2,00	1,20	0,81	0,44	0,30	0,11
Nitrógeno (%)	0,235	0,163	0,109	0,080	0,052	-	-
Relación C/N	12	12	11	10	8	-	-
Arcilla <2 µ (%)	30,6	35,2	34,5	33,0	32,0	26,3	19,9
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	55,1	50,3	48,	46,2	43,6	46,0	46,0
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	13,6	14,0	17,3	19,8	23,3	26,5	32,4
AF 100-250 µ (%)	0,7	0,5	0,2	1,0	1,1	1,2	1,7
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eq.humedad (%)	31,1	30,7	28,6	27,7	27,3	24,0	19,8
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,8	5,9	5,9	6,0	6,1	6,2	6.4
pH H2O 1:2,5	6,2	6,7	6,7	7,0	7,1	7,4	7,4
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-	-	-
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	13,7	14,6	13,4	8,4	8.4	6,4	6,1
Mg++ m.eq./100gr	4,8	4,7	4,7	4,0	4,9	5,9	4,5
Na+ m.eq./100gr	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
K+ m.eq./100gr	2,8	2,0	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5
H+ m.eq./100gr	4,4	5,8	4,8	4,4	3,9	3,0	2,7
Na (% de T)	0,8	1,2	0,0	1,2	1,2	1,3	1,5
Suma Bases	21,5	21,6	20,3	14,1	15,0	14,0	12,3
CIC m.eq./100gr	22,6	23,9	22,2	15,9,	16,3	14,7	12,8
Sat. con bases (%)	95	90	91	89	92	95	96