CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Zapiola (Zp)

Descripción

Es un suelo pardo grisáceo oscuro, poco profundo, de aptitud ganadera, se encuentra en planicies bajas con depresiones y cubetas en posición de bajos deprimidos en la Subregión Pampa Ondulada Alta, pobremente drenado, formado sobre sedimentos loéssicos limosos finos, alcalino sódico y débilmente salino a los 16 cm. de profundidad, con pendientes de 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf mólico, fina, illítica, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2006).
Natracualf típico fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.1975).

Ubicación del perfil: Latitud: S 34° 49' 51''. Longitud: W 59º 46' 38'', Altitud: 46 m.s.n.m. a 9,6 km. al sudoeste de la Estación Suipacha, partido de Suipacha, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3560-16-4, J. J. Almeyra.

Variabilidad de las características: Variaciones (Ap) en el value y chroma del epipedón ócrico y profundidad; mayor porcentaje de la fracción arcilla en horizontes subsuperficiales y cambios en los espesores del solum.

Fases: Erosión, pendiente y drenaje en diversos grados; están descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: Arroyo Juárez, Faustina, Azcuénaga, Huemul.

Suelos asociados: Formando complejos y asociaciones con Gowland, Navarro, Henry Bell, Villa Moll y Lobos.

Distribución geográfica: Partidos de Chacabuco, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Navarro, Lobos, Las Heras, Cañuelas, Mercedes, en provincia de Buenos Aires. Hojas I.G.M. 3560-15, 3560-16, 3560-17, 3560-18, 3560-21, 3560-22, 3560-23, 3560-24.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Ganadería. Pradera artificial: Trébol blanco (Trifolium repens), Alfalfa (Medicago sativa), Cebadilla (Bromus uniloides). Malezas: Cardos negro (Cirsium vulgare), Gramillón (Cynodon dactylon).

Capacidad de uso: VII ws


Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica, salinidad moderada.

Índice de productividad según la región climática: 9 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico, régimen de humedad ácuico, horizonte argílico, horizonte nátrico con un (PSI) mayor del 15 %.

Descripción del perfil típico:

14/360 C
Fecha de muestreo: 18 de Octubre de 1966
Reconocedores: Speziale - Herrera - Fuente - Vargas Gil



Ap 0-16 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares medios y fuertes; muy duro; firme; límite inferior abrupto suave.

Btn 16-38 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares, medios, fuertes con tendencia a bloques finos; duro; firme; muy plástico; adhesivo; escasas concreciones calcáreas; barnices comunes; moteados comunes; raíces abundantes; límite inferior suave.

Btkn 38-73 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares medios y fuertes que rompe a bloques angulares finos; duro; firme; plástico; adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; escasos barnices; moteados abundantes precisos y medios de color pardo oscuro rojizo (5YR 2/2); raíces escasas; límite inferior gradual suave.

BCn 73-107 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, gruesos a masivo; friable; concreciones calcáreas escasas; moteados comunes débiles y medios; raíces escasas; límite inferior gradual suave.

C 107-125 a + cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; abundantes moteados débiles y gruesos; escasas raíces.

Observaciones: Reúne los requerimientos para epipedón mólico, excepto en su espesor (Ap), mezclados con el subhorizonte (Btn).

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	Btn	Btkn	BCn	C
Profundidad (cm)	0-16	16-38	38-73	73-107	107-125
Mat. orgánica (%)	3,08	0,96	0,68	0,25	0,12
Carbono total (%)	1,79	0,56	0,40	0,15	0,07
Nitrógeno (%)	0,173	0,061	0,043	-	-
Relación C/N	10	9	9	-	-
Arcilla <2 µ (%)	20,1	46,4	33,2	32,1	19,6
Limo 2-20 µ (%)	24,7	21,1	25,8	20,4	23,2
Limo 2-50 µ (%)	59,7	40,6	51,3	47,3	65,7
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	18,8	11,2	14,1	19,3	13,9
AF 100-250 µ (%)	1,4	1,0	0,7	1,3	0,8
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	0	0
Eq.humedad (%)	24,3	77,6	41,2	33,8	23,6
Re. pasta Ohms	1474	416	574	761	1763
Cond. mmhos/cm	1,47	1,82	1,34	0,57	0,47
pH en pasta	7,9	8,9	8,7	8,6	8,8
pH H2O 1:2,5	8,4	9,8	9,8	9,8	9,5
pH KCL 1:2,5	6,8	7,6	7,6	7,1	7,0
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	7,7	5,9	5,2	-	-
Mg++ m.eq./100gr	4,5	7,1	7,0	-	-
Na+ m.eq./100gr	4,9	19,5	16,5	10,6	7,1
K+ m.eq./100gr	1,8	5,4	4,9	3,7	3,1
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-	-
Na (% de T)	30	48	43	41,5	31,8
V.S m.eq./100gr	18,9	S/D	S/D	27,3	22,4
CIC m.eq./100gr	16,4	40,7	38,3	25,4	21,6
Sat. con bases (%)	-	-	-	-	-