

# Numerieke Modelling en Benadering: Practicum 1

Ellen Anthonissen      Marte Biesmans

vrijdag 21 april 2016

## Opgave 1

De Householder transformatiematrix

$$F = I - 2 \frac{vv^*}{v^*v}$$

heeft als eigenwaarden  $-1$  en  $1$  en als eigenvectoren respectievelijk  $v$  en  $w$  met  $w \perp v$ . Deze resultaten zijn als volgt gekomen: De Householder transformatiematrix  $F$  is symmetrisch

$$F^* = (I - 2 \frac{vv^*}{v^*v})^* = I - 2 \frac{vv^*}{v^*v} = F$$

en unitair

$$F^*F = FF^* = (I - 2 \frac{vv^*}{v^*v})(I - 2 \frac{vv^*}{v^*v}) = I - 4 \frac{vv^*}{v^*v} + 4 \frac{v(v^*v)v^*}{(v^*v)^2} = I.$$

Omdat  $F$  unitair is, moeten de eigenwaarden van  $F$  op de complexe eenheidscirkel gelegen zijn. Omdat  $F$  reëel en symmetrisch is, zijn de eigenwaarden reële getallen. Hieruit volgt dat de eigenwaarden enkel  $\pm 1$  kunnen zijn.

Als we nu  $Fv$  uitrekenen, bekommen we

$$Fv = v - 2 \frac{vv^*}{v^*v}v = -v.$$

Hieruit volgt dat  $v$  een eigenvector is bijhorende bij de eigenwaarde  $-1$ . Neem nu  $w$  met  $w \perp v$  en we rekenen  $Fw$  uit, dan bekommen we

$$Fw = w - 2 \frac{vv^*}{v^*v}w = w,$$

want  $v^*w = 0$ . Hieruit volgt dat  $w$  een eigenvector is bijhorende bij de eigenwaarde  $1$ .

Geometrisch gezien komt dit overeen met een spiegeling over de  $w$ -as. Neem een vector  $a$  en ontbind die in een component volgens de  $v$ -as en een component volgens de  $w$ -as. De component volgens de  $v$ -as zal vermenigvuldigd worden met  $-1$  en die volgens de  $w$ -as met  $1$ . Zo bekommen we een spiegeling rond de  $w$ -as.

$n \setminus \kappa$	1	$10^4$	$10^8$
10	0,0044	0,0022	0,0025
100	0,1883	0,1403	0,1306
1000	28,2691	27,725	27,9583

Tabel 1: De snelheid van de expliciete methode

$n \setminus \kappa$	1	$10^4$	$10^8$
10	0,0050	0,0015	0,0013
100	0,0115	0,0131	0,0163
1000	7,9605	7,7967	7,8586

Tabel 2: De snelheid van de impliciete methode

## Opgave 2

Zie de bijgevoegde MATLAB-files voor de code van de Householder\_explicit, Householder\_implicit en de Apply\_Q functies. De expliciete methode genereert de matrix  $Q$  door na de impliciete methode een nieuwe loop uit te voeren. Deze loop is gebaseerd op de functie om het product  $Qx$  te berekenen, met voor  $x$  telkens een eenheidsvector.

De tijd om het stelsel  $Ax = b$  op te lossen met de expliciete en de impliciete methode worden respectievelijk weergegeven in tabel 1 en tabel 2. Hier zien we dat de tijd om het stelsel op te lossen een orde-grootte kleiner is met de impliciete methode dan met de expliciete methode.

De ordegroottes van de relatieve fout  $\|\delta x\|/\|x\|$  van de oplossing voor de expliciete en de impliciete methode worden respectievelijk weergegeven in tabel 3 en tabel 4. De ordegroottes van de verhouding van de norm van het residu op de norm van de b-vector  $\|r\|/\|b\|$  van de oplossing voor de expliciete en de impliciete methode worden respectievelijk weergegeven in tabel 5 en 6. Deze waarden vullen we nu in in de vergelijking

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}.$$

We zien hier dat het linkerlid van de ongelijkheid veel kleiner is dan het rechterlid naarmate  $\kappa$  groter wordt. Voor  $\kappa = 1$  zien we namelijk dat het linkerlid ongeveer gelijk is aan het rechterlid. Voor  $\kappa = 10^8$  is er veel meer verschil tussen de twee leden. De achterwaartse stabiliteit van de twee methodes is ongeveer hetzelfde.

$n \setminus \kappa$	1	$10^4$	$10^8$
10	$10^{-16}$	$10^{-13}$	$10^{-9}$
100	$10^{-15}$	$10^{-13}$	$10^{-9}$
1000	$10^{-14}$	$10^{-13}$	$10^{-9}$

Tabel 3: De ordegrootte van  $\|\delta x\|/\|x\|$  van de expliciete methode

$n \setminus \kappa$	1	$10^4$	$10^8$
10	$10^{-16}$	$10^{-13}$	$10^{-9}$
100	$10^{-15}$	$10^{-13}$	$10^{-9}$
1000	$10^{-14}$	$10^{-13}$	$10^{-9}$

Tabel 4: De ordegrootte van  $\|\delta x\|/\|x\|$  van de impliciete methode

$n \setminus \kappa$	1	$10^4$	$10^8$
10	$10^{-16}$	$10^{-13}$	$10^{-9}$
100	$10^{-15}$	$10^{-13}$	$10^{-10}$
1000	$10^{-14}$	$10^{-13}$	$10^{-10}$

Tabel 5: De ordegrootte van  $\|r\|/\|b\|$  van de expliciete methode

### Opgave 3


Het kleinste kwadraten probleem  $\|b - Ax\|_2$  ziet er uit als volgt:

$$A = \begin{bmatrix} u_n & u_{n-1} & \cdots & u_1 \\ u_{n+1} & u_n & \cdots & u_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_m & u_{m-1} & \cdots & u_{m-n+1} \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} y_n \\ y_{n+1} \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix},$$

met  $u_n$  de  $n$ -de waarde uit de vector van de ingangen uit `model.mat`. Dit stelsel  $Ax = b$  lossen we op naar  $x$  met behulp van een van de algoritmes uit de vorige opgave. Om dit model te valideren stellen we op analoge wijze een matrix  $B$  op met de ingangen uit `validate.mat`. We vergelijken de verschillende modellen met behulp van de waarde  $\|y - Bx\|_2$  met  $y$  de uitgangen uit `validate.mat`. Voor verschillende tijdsvertragingen levert dit de waardes uit figuur 1. Hieruit blijkt dat 18 tijdsvertragingen het meest interessant is, of  $n = 19$ .

$n \setminus \kappa$	1	$10^4$	$10^8$
10	$10^{-16}$	$10^{-13}$	$10^{-9}$
100	$10^{-15}$	$10^{-13}$	$10^{-10}$
1000	$10^{-14}$	$10^{-13}$	$10^{-10}$

Tabel 6: De ordegrootte van  $\|r\|/\|b\|$  van de impliciete methode



Figuur 1: Validatie van het model bij verschillende tijdsvertragingen

## Opgave 4

Neem een vector  $x \in \mathbb{R}^n$ . Schrijf  $x$  als lineaire combinatie van de eigenvectoren van  $A$   $q_1, q_2 \dots q_n$  met bijhorende eigenwaarden  $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_n$ :

$$x = \sum_{j=1}^n a_j q_j,$$

dan is het Rayleigh quotiënt van  $x$ :

$$r(x) = \frac{\sum_{j=1}^n a_j^2 q_j \lambda_j}{\sum_{j=1}^n a_j^2}.$$

Het Rayleigh quotiënt is onafhankelijk van de schaal van  $x$ , dus stel  $\|a\| = \|[a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n]^T\| = 1$ , dan is  $\sum_{j=1}^n a_j^2 = 1$ . Dan wordt het Rayleigh quotiënt gelijk aan

$$r(x) = \sum_{j=1}^n a_j^2 q_j \lambda_j.$$

Stel nu dat  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ , dan is het Rayleigh quotiënt maximaal voor  $a = e_1$  met de waarde  $\lambda_{max}$  en minimaal voor  $a = e_n$  met de waarde  $\lambda_{min}$ . Dus het Rayleigh quotiënt bevindt zich in het interval  $[\lambda_{min}, \lambda_{max}]$ .

Ook is het Rayleigh quotiënt een continu voor  $a \neq 0$ , dus elke waarde tussen  $\lambda_{min}$  en  $\lambda_{max}$  wordt bereikt voor een bepaalde vector  $a$ , dus ook voor een bepaalde vector  $x$ .

## Opgave 5

'relatie tussen 4 methodes' Het QR-algoritme met of zonder shifts berekent alle eigenwaarden. 'uitspraak toelichten' 'convergentiegedrag tonen van 4 methodes'

## Opgave 6

We maken gebruik van de ongelijkheid

$$\frac{\|e_n\|_A}{\|e_0\|_A} \leq 2 \left( \frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^n.$$

Voor  $n = 10$  wordt dit

$$\frac{\|e_{10}\|_A}{\|e_0\|_A} \leq 2 \left( \frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^{10}.$$

Gebruik makende van de gegevens  $\|e_0\|_A = 1$  en  $\|e_{10}\|_A = 2 \times 2^{-10}$ , bekomen we

$$9 \leq \kappa.$$

We vinden dus een ondergrens voor  $\kappa$ .

Voor  $n = 20$  wordt de ongelijkheid

$$\frac{\|e_{20}\|_A}{\|e_0\|_A} \leq 2 \left( \frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^{20}.$$

Gebruik makende van het gegeven  $\|e_0\|_A = 1$  en het berekende  $9 \leq \kappa$ , bekomen we

$$\|e_{20}\|_A \leq 2 \times 2^{-20}.$$

We vinden dus een bovengrens voor  $\|e_{20}\|_A$ .

## Opgave 7

## Opgave 8


## Opgave 9

De interlace eigenschap van een tridiagonale, symmetrische en reële matrix  $A$  luidt als volgt. Voor  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , en  $A^{(1)}, A^{(2)} \dots A^{(n)}$  de principale vierkante submatrices van dimensie  $1, 2 \dots n$ , geldt dat de eigenwaarden van deze submatrices interlacen. Dit wil zeggen dat  $\lambda_j^{(k+1)} \leq \lambda_j^{(k)} \leq \lambda_{j+1}^{(k+1)}$ . Als  $A$  irreduceerbaar is (en dus geen nul heeft op een nevendagonaal), dan worden de ongelijkheden strikte ongelijkheden. Dit laatste is belangrijk voor de bisectie-methode.

Als voorbeeld nemen we de tridiagonale, symmetrische en reële matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 7 & 4 \end{bmatrix}.$$

We zien duidelijk op figuur 2 dat de eigenwaarden van een principale submatrix tussen de eigenwaarden van de principale submatrix van een dimensie groter liggen.



Figuur 2: De eigenwaarden van de opeenvolgende principale submatrices van A

## Opgave 10

Een algoritme in pseudo-code dat alle eigenwaarden van een symmetrische, tridiagonale en reële matrix in het interval  $[a,b)$  berekent tot op een bepaalde tolerantie met behulp van de bisectie-methode, is te vinden in algoritme 1.

---

### Algorithm 1 Bisectie-methode

---

```

queue = [[a,b]]
while queue niet leeg do
    Haal eerste interval uit de queue
     $Sturm_{links}$  = aantal tekenwisselingen in de Sturm-rij van A-linkergrens*I
     $Sturm_{rechts}$  = aantal tekenwisselingen in de Sturm-rij van A-rechtergrens*I
    #eigenwaarden =  $Sturm_{rechts} - Sturm_{links}$ 
    midden =  $0.5 * (rechtergrens - linkergrens)$ 
    if #eigenwaarden == 1 then
        if midden < tolerantie then
            Voeg linkergrens+midden toe als eigenwaarde
        else
            Voeg [linkergrens,linkergrens+midden] en [linkergrens+midden,rechtergrens]
            vooraan bij in de queue
        end if
    else if #eigenwaarden > 1 then
        Voeg [linkergrens,linkergrens+midden] en [linkergrens+midden,rechtergrens]
        vooraan bij in de queue
    end if
end while

```

---

Deze methode werd uitgeschreven in MATLAB (zie bijgevoegde MATLAB-code) en werd toegepast op enkele symmetrische, tridiagonale en reële matrices.

Als eerste voorbeeld nemen we de tridiagonale, symmetrische en reële matrix  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  met  $n = 4$ .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

Als we de eigenwaarden van deze matrix willen berekenen in het interval  $[-2, 6)$  tot op een tolerantie  $10^{-2}$ , dan vinden we de eigenwaarden  $[-1,3359375; 5,7734375]$ . Deze komen overeen met de 'exacte' eigenwaarden  $[-1,32970777874292; 5,77851991186833]$  berekend met de functie  $\text{eig}(A)$  van MATLAB. Als we beide resultaten afronden tot op twee cijfers na de komma, zien we inderdaad dat de eigenwaarden gevonden zijn tot op de gegeven absolute fout.

Een interessant testprobleem is een random symmetrische, tridiagonale en reële matrix  $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  MATLAB met  $n = 100$ . De diagonalen zijn berekend met de functie  $\text{rand}(n)$  en  $\text{rand}(n - 1)$ . We zoeken naar de eigenwaarden in het interval  $[0, 1)$  tot op een tolerantie  $10^{-2}$ . De matrix waarmee dit getest is, wordt hier niet weergegeven omdat deze veel te groot is. Het interessante aan deze matrix is dat de eigenwaarden die tussen 0 en 1 gelegen zijn, meestal dicht bij elkaar liggen dan de opgegeven tolerantie. Het algoritme dat hierboven beschreven wordt, kan toch nog steeds onderscheid maken tussen de verschillende eigenwaarden. Zo vindt het bijvoorbeeld als eerste twee eigenwaarden 0,03515625 en 0,04296875 voor de eigenwaarden (berekend met de  $\text{eig}()$  functie van MATLAB) 0,0340437309188287 en 0,0441523470170203.

Een volgend interessant testprobleem wordt bekomen door eigenwaarden als grens te nemen. Theoretisch gezien mag de eigenwaarde die de rechtergrens voorstelt niet gevonden worden. Dit is echter soms toch het geval (zeker voor grote matrices). Dit komt doordat de elementen van de Sturm-rij opgesteld worden aan de hand van vorige elementen. Zo kunnen reken- en afrondingsfouten zich voortplanten.

Ook is er tijdens het testen opgevallen dat de gevraagde nauwkeurigheid niet altijd bereikt wordt voor alle eigenwaarden. Dit komt doordat wanneer de grens van een te onderzoeken interval dicht bij een eigenwaarde komt, de Sturm-rij van  $A - xI$  slecht geconditioneerd is. Het laatste element ligt dan rond 0, waardoor er snel een tekenwissel te veel of te weinig is.