

Numerieke Modelling en Benadering: Practicum 1

Ellen Anthonissen Marte Biesmans

vrijdag 21 april 2016

Opgave 1

De Householder transformatiematrix

$$F = I - 2 \frac{vv^*}{v^*v}$$

heeft als eigenwaarden -1 en 1 en als eigenvectoren respectievelijk v en w met $w \perp v$. Deze resultaten zijn als volgt gekomen: De Householder transformatiematrix F is symmetrisch

$$F^* = (I - 2 \frac{vv^*}{v^*v})^* = I - 2 \frac{vv^*}{v^*v} = F$$

en unitair

$$F^*F = FF^* = (I - 2 \frac{vv^*}{v^*v})(I - 2 \frac{vv^*}{v^*v}) = I - 4 \frac{vv^*}{v^*v} + 4 \frac{v(v^*v)v^*}{(v^*v)^2} = I.$$

Omdat F unitair is, moeten de eigenwaarden van F op de complexe eenheidscirkel gelegen zijn. Omdat F reëel en symmetrisch is, zijn de eigenwaarden reële getallen. Hieruit volgt dat de eigenwaarden enkel ± 1 kunnen zijn.

Als we nu Fv uitrekenen, bekommen we

$$Fv = v - 2 \frac{vv^*}{v^*v}v = -v.$$

Hieruit volgt dat v een eigenvector is bijhorende bij de eigenwaarde -1 . Neem nu w met $w \perp v$ en we rekenen Fw uit, dan bekommen we

$$Fw = w - 2 \frac{vv^*}{v^*v}w = w,$$

want $v^*w = 0$. Hieruit volgt dat w een eigenvector is bijhorende bij de eigenwaarde 1 .

Geometrisch gezien komt dit overeen met een spiegeling over de w -as. Neem een vector a en ontbind die in een component volgens de v -as en een component volgens de w -as. De component volgens de v -as zal vermenigvuldigt worden met -1 en die volgens de w -as met 1 . Zo bekommen we een spiegeling rond de w -as.

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4

Neme een vector $x \in \mathbb{R}^n$. Schrijf x als lineaire combinatie van de eigenvectoren $q_1, q_2 \dots q_n$ met bijhorende eigenwaarden $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_n$ van A :

$$x = \sum_{j=1}^n a_j q_j,$$

dan is het Rayleigh quotiënt van x :

$$r(x) = \frac{\sum_{j=1}^n a_j^2 q_j \lambda_j}{\sum_{j=1}^n a_j^2}.$$

Het Rayleigh quotiënt is onafhankelijk van de schaal van x , dus stel $\|x\| = 1$, dan is $\sum_{j=1}^n a_j^2 = 1$.

Opgave 5

Opgave 6

Opgave 7

Opgave 8

Opgave 9

Opgave 10