

Eulerin ϕ -funktion koko kun $n \rightarrow \infty$

Elli Kiiski

2020

1 Tiivistelmä

2 Johdanto

3 Määritelmiä ja merkintätapoja

Merkintätapa 3.1. *Jaollisuus $a|b$*

Olkoot $a \in \mathbb{Z}$ ja $b \in \mathbb{Z}$ siten, että luku b on jaollinen luvulla a . Tällöin merkitään $a|b$.

Määritelmä 3.2. *Suurin yhteinen tekijä, $\text{syt}(a, b)$*

Olkoot $a \neq 0$ ja $b \neq 0$. Tällöin on olemassa yksiselitteinen $d \in \mathbb{N}$, jolla on seuraavat ominaisuudet:

1. $d|a$ ja $d|b$
2. jos $d'|a$ ja $d'|b$, niin $d'|d$

Lukua d kutsutaan lukujen a ja b suurimmaksi yhteiseksi tekijäksi, ja merkitään $\text{syt}(a, b) = d$.

Määritelmä 3.3. *Suhteellinen alkuluku*

Jos $\text{syt}(a, b) = 1$, kutsutaan lukuja a ja b suhteellisiksi alkuluvuiksi tai alkuluvuiksi toistensa suhteen.

Määritelmä 3.4. *Eulerin ϕ -funktio $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$*

Määritetään $\phi(1) = 1$. Kaikilla $n \geq 2$, $\phi(n)$ on lukujen $a \in \{1, 2, \dots, n\}$ määrä, joille pätee $\text{syt}(a, n) = 1$.

Toisin sanoen Eulerin ϕ -funktion arvo luonnollisella luvulla n on sitä pienempien luonnollisten lukujen määrä, jotka ovat alkulukuja sen suhteen.

4 Eulerin ϕ -funktion yläraja

Lause 4.1. *Eulerin ϕ -funktion yläraja*

Kaikilla luonnollisilla luvuilla $n \geq 2$ pätee $\phi(n) < n$.

Todistus. Suoraan määritelmästä seuraa, että $\phi(n) \leq n$, koska joukossa $\{1, 2, \dots, n\}$ on n alkia. Lisäksi, koska jokaisella n pätee $\text{syt}(n, n) = n$. Täten millään $n \geq 2$ ei voi olla $\phi(n) = n$.

Siis $\phi(n) < n$ jokaisella $n \geq 2$.

□

- 5 Asiaaa
- 6 Asiaaaa
- 7 Lähteet