

## §1. Разложение в тригонометрический ряд Фурье периодической функции с периодом $2\pi$

Рядом Фурье функции  $f(x)$ , определенной на промежутке  $[-\pi, \pi]$ , называется тригонометрический ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad (1)$$

коэффициенты которого определяются формулами

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \\ a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx \quad (k = 1, 2, 3, \dots), \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \quad (k = 1, 2, 3, \dots). \end{aligned} \quad (2)$$

Если ряд (1) является рядом Фурье функции  $f(x)$ , то употребляется следующая запись:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad (3)$$

что означает, что функции  $f(x)$  соответствует ряд Фурье.

**Замечание 1.** Не для всякой функции можно построить ряд Фурье (невозможно, например, написать ряд Фурье функции, для которой интегралы в формулах (2) не существуют).

**Замечание 2.** Не всякая функция является суммой ее ряда Фурье, даже если он сходится.

**Определение.** Функция  $f(x)$  называется кусочно-монотонной в промежутке  $[a, b]$ , если этот промежуток разбивается на конечное число промежутков  $[a, x_1], [x_1, x_2], [x_2, x_3], \dots, [x_n, b]$ , в каждом из которых функция  $f(x)$  монотонна. Кусочно-монотонная функция может иметь в промежутке  $[a, b]$  разрывы лишь первого рода.

**Теорема Дирихле.** Если функция  $f(x)$  с периодом  $2\pi$  кусочно-монотонна в промежутке  $[-\pi, \pi]$  и имеет в нем не более чем конечное число точек разрыва, то ее ряд Фурье сходится к сумме

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (4)$$

в каждой точке непрерывности и к сумме

$$\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \quad (5)$$

в каждой точке разрыва.

Высказанные условия называются условиями Дирихле.

Если функция рассматривается на открытом промежутке  $(-\pi, \pi)$ , то

$$S(\pi) = S(-\pi) = \frac{1}{2} [f(-\pi+0) + f(\pi-0)]. \quad (5')$$

Если  $f(x)$  — четная функция (т.е.  $f(-x) = f(x)$ ), то

$$b_k = 0 \quad (k = 1, 2, 3, \dots),$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx, \quad (6)$$

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos kx dx \quad (k = 1, 2, 3, \dots),$$

и ряд Фурье для четной функции записывается так:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx. \quad (7)$$



Если  $f(x)$  — нечетная функция (т. е.  $f(-x) = -f(x)$ ), то

$$\begin{aligned} a_k &= 0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots), \\ b_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin kx \, dx \quad (k = 1, 2, 3, \dots), \end{aligned} \quad (8)$$

и ряд Фурье для нечетной функции имеет вид

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx. \quad (9)$$

В случае разложения в ряд Фурье функции  $f(x)$ , удовлетворяющей тем же условиям, но заданной в произвольном промежутке  $[a, a+2\pi]$  длиной  $2\pi$ , в формулах (2) пределы интегрирования заменяются соответственно на  $a$  и  $a+2\pi$ . Например, если  $a = 0$ , то промежуток  $[a, a+2\pi]$  имеет вид  $[0, 2\pi]$ , и коэффициенты ряда Фурье определяются по формулам

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx \, dx \quad (k = 0, 1, 2, \dots), \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin kx \, dx \quad (k = 1, 2, 3, \dots). \end{aligned} \quad (10)$$

Пример 3. Разложить в ряд Фурье  $2\pi$ -периодическую функцию  $f(x) = x + |x|$  (рис.29,а), заданную на интервале  $(-\pi, \pi]$ .




Рис. 29.

Решение. Данная функция удовлетворяет условиям теоремы о разложимости функции в ряд Фурье. При этом ряд Фурье для функции  $f(x)$  сходится при всех  $x$  и значения его суммы  $S(x)$

совпадают со значениями функции  $f(x)$  во всех точках, кроме точек ее разрыва  $x = \pm(2k-1)\pi$  ( $k = 1, 2, 3, \dots$ ).

Значения функции  $S(x)$  при  $x = \pm\pi$  определяются формулой (5). В данном случае  $f(-\pi+0)=0$ ,  $f(\pi-0)=2\pi$ . Поэтому  $S(\pm\pi)=\pi$ . Так как функция  $S(x)$   $2\pi$ -периодична, то  $S(\pm(2k-1)\pi)=\pi$  ( $k = 1, 2, 3, \dots$ ).

График функции  $S(x)$  — суммы ряда Фурье для данной функции  $f(x)$  — изображен на рис.29,б.

Теперь построим ряд Фурье для рассматриваемой функции  $f(x)$ .

Вычисляя коэффициенты Фурье для функции  $f(x)$  по формулам (2) и принимая во внимание, что

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } -\pi < x \leq 0, \\ 2x & \text{при } 0 < x \leq \pi, \end{cases}$$

имеем

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 f(x) dx + \int_0^{\pi} f(x) dx \right] = \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 0 dx + \int_0^{\pi} 2x dx \right] = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x dx = \frac{1}{\pi} 2 \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\pi} = \pi. \end{aligned}$$

Далее,

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos kx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x d\left(\frac{\sin kx}{k}\right) = \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ x \frac{\sin kx}{k} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\sin kx}{k} dx \right] = \frac{2}{\pi} \frac{\cos kx}{k^2} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi k^2} [\cos k\pi - 1] = \\ &= \frac{2}{\pi k^2} [(-1)^k - 1], \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

(Для вычисления интеграла использована формула интегрирования по частям.)

Аналогично находим  $b_k$ :

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin kx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, d\left(-\frac{\cos kx}{k}\right) =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[ -x \frac{\cos kx}{k} \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos kx}{k} \, dx \right] = \frac{2}{k} (-1)^{k+1} \quad (k = 1, 2, 3, \dots).$$

Подставляя найденные значения  $a_0$ ,  $a_k$  и  $b_k$  ( $k = 1, 2, 3, \dots$ ) в ряд Фурье (1), получаем

$$S(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{2}{\pi k^2} [(-1)^k - 1] \cos kx + \frac{2}{k} (-1)^{k+1} \sin kx \right\}.$$

Этот ряд сходится при всех  $x$ . А так как  $S(x) = f(x)$ , то для всех  $x$  из интервала  $(-\pi, \pi]$  имеет место разложение

$$x + |x| = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{2}{\pi k^2} [(-1)^k - 1] \cos kx + \frac{2}{k} (-1)^{k+1} \sin kx \right\}.$$

Пример 1. Разложить в ряд Фурье функцию с периодом  $2\pi$ , определенную:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } -\pi \leq x < 0, \\ 1 & \text{при } 0 < x < b, \\ 0 & \text{при } b < x \leq \pi, \\ \frac{1}{2} & \text{при } x = 0, x = b \end{cases}$$

Пример 2. Разложить в ряд Фурье функцию с периодом  $2\pi$ , определенную равенством

$$f(x) = e^{\alpha x}, \quad -\pi < x < \pi$$

Пример 3. Разложить в ряд Фурье функцию с периодом  $2\pi$ , определенную равенством

$$f(x) = x + |x|, \quad -\pi < x \leq \pi$$

Пример 4. Разложить в ряд Фурье функцию с периодом  $2\pi$ , определенную равенством

$f(x) = x^2 \quad -\pi \leq x \leq \pi$ . При помощи полученного разложения вычислить суммы рядов

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}$$

Пример 5. Разложить в ряд Фурье функцию с периодом  $2\pi$ , определенную равенством

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & \text{при } -\pi < x < \pi \\ 0 & \text{при } x = \pi \end{cases}$$

Пример 6. Разложить в ряд Фурье функцию с периодом  $2\pi$ , определенную равенством

$$f(x) = 2x \quad \text{при } -\pi < x < \pi$$

• Разложить в ряд Фурье функции с периодом  $2\pi$ :

$$1. f(x) = \begin{cases} -3 & \text{при } -\pi < x < 0, \\ 2 & \text{при } 0 < x < \pi. \end{cases}$$

$$2. f(x) = \begin{cases} ax & \text{при } 0 \leq x < \pi, \\ bx & \text{при } -\pi < x < 0, \end{cases} \quad \text{где } a \text{ и } b \text{ — числа.}$$

а) Построить график исходной функции при  $a > 0$ ,  $b > 0$ ,  $|a| > |b|$  и найти ее разложение;

б) Рассмотреть случаи  $a = b = 1$  и  $a = 1$ ,  $b = -1$ . Построить графики этих функций и, используя их разложения в тригонометрические ряды Фурье, найти суммы числовых рядов:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} + \dots,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{(2k-1)^2} + \dots$$



$$3. f(x) = \begin{cases} -x & \text{при } -\pi \leq x \leq 0, \\ 0 & \text{при } 0 < x < \pi. \end{cases}$$

С помощью полученного разложения найти сумму числового ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{(2k-1)^2} + \dots$$

$$4. f(x) = x(\pi - x) \text{ при } -\pi < x < \pi.$$

$$5. f(x) = \pi + x \text{ при } -\pi \leq x \leq \pi.$$

$$6. f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{x}{\pi}\right) & \text{при } -\pi \leq x < 0, \\ \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{\pi}\right) & \text{при } 0 < x < \pi. \end{cases}$$

$$7. f(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } -\pi \leq x < 0, \\ -1 & \text{при } 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

$$8. f(x) = x^3 \text{ при } -\pi < x < \pi.$$

$$9. f(x) = \cos ax \text{ при } -\pi \leq x \leq \pi, a \neq k, k = 1, 2, 3, \dots$$

$$10. f(x) = |x| \text{ при } -\pi < x \leq \pi.$$

$$11. f(x) = |\sin x|.$$

$$12. f(x) = x \cos x \text{ при } -\pi < x < \pi.$$

$$13. f(x) = x \sin x \text{ при } -\pi < x < \pi.$$

$$14. f(x) = \frac{\pi - x}{2} \text{ при } 0 < x < 2\pi. \text{ Построить график суммы ряда } S(x)$$

$$15. f(x) = e^x - 1 \text{ при } 0 < x < 2\pi.$$