关于临床试验信息了解、报名渠道、条件要求的分享

--------Zgr（ID：zazqwaq） 整理于 2025/9/28

1. 如何在已知癌症类型/药物编号/基因突变类型的情况下，查找在哪里有合适的临床试验？（不介绍国外临床试验）

A：**查询途径 1**：药物临床试验登记与信息公示平台 http://www.chinadrugtrials.org.cn/index.html，这里是所有**在中国注册类药物临床试验**的官方登记窗口，受到国内最严格的监管，且为对外公开信息最全，最新的途径。

步骤一：打开网站，点击搜索栏下的“高级查询”

步骤二：按如下图建议搜索

并不是所有的空都要填满！！！一般在没有明确想要参加的药物名称或编号的临床试验的情况下，只需要填写“适应症”、“临床参加机构”即可，甚至如果对医院、就医地点也没有要求，那就只需要按图上建议填写“适应症”即可。

PS：如果已知患者的基因突变类型，想要寻找靶向药临床试验，可在搜索出来的结果里面查看患者基因型是否可以参加，具体步骤如下：

步骤三：点击进入具体试验详情页



步骤四：点+号打开“公示的试验信息”

步骤五：查看公示信息中“三、临床试验信息”-“3.受试者信息”-“入选标准”中对于基因突变类型的要求，一般都会在这里说明清楚。

联系人Email	ylwang@joyopharma.com	联系人邮政地址	上海市-上海市-浦东新区春晓路372弄115号6号楼	联系人邮编	201203

三、临床试验信息

1、试验目的

主要研究目的：确定JYP0015 的最大耐受剂量/最大给药剂量（MTD/ MAD）和JYP0015 推荐剂量（RD）；评估JYP0015 治疗RAS 突变的晚期实体瘤受试者的安全性和耐受性；次要研究目的：评价JYP0015 在RAS 突变的晚期实体瘤受试者中的药代动力学（PK）特征；评价JYP0015 在RAS 突变晚期实体瘤受试者中的初步疗效。

2、试验设计

试验分类	安全性和有效性	试验分期	其它 其他说明:I/II 期临床研究	设计类型	单臂试验
随机化	非随机化	盲法	开放	试验范围	国内试验

3、受试者信息

年龄	18岁(最小年龄)至 80岁(最大年龄)
性别	男+女
健康受试者	无

入选标准

1	患者自愿参加临床试验，并签署知情同意书
2	签署知情同意书时年龄18 周岁以上（含），80 岁以下（含），性别不限
3	经组织学/细胞学确诊的晚期实体瘤受试者I期：携带RAS 突变，经充分标准治疗后疾病进展或不耐受，或缺乏标准治疗方案，或目前不适用标准治疗，或受试者不愿接受标准治疗
4	经组织学/细胞学确诊的晚期实体瘤受试者II期：胰腺癌队列、非小细胞肺癌队列、结直肠癌队列、其他的晚期实体瘤队列
5	美国东部肿瘤协作组（ECOG）体力评分0-1分
6	预期生存时间≥3个月
7	根据RECIST1.1（实体瘤）标准，至少有一个颅外可测量的肿瘤病灶；
8	须提供肿瘤组织样本用于基因检测。肿瘤组织样本需为优选新近取得的肿瘤组织，无法提供新近取得组织的受试者可提供首次研究治疗前5年内存档的肿瘤组织样本

查询途径 2：①在各大医院微信公众号、各大医院临床试验平台公众号（如有）搜索“招募”、“临床招募”等信息，自行查看各试验对癌种、基因型等的要求。一般写的不会有**查询途径 1** 查到的详细，可以通过医院公众号中发布的信息，在**自行通过查询途径 1 自助查询详细信息。**

②在微信搜索栏搜索对应“癌肿“+临床试验（需按时间排序），进入各癌肿患者群（如公众号”熊猫和朋友们“）关注群内最新信息，**了解以后可以自行去查询途径 1 查询详细信息，方法都已经详尽告知了，尽量不做伸手党。**

2. 如何知道某临床试验在哪些医院有开展？如何参加？

A：按照上述查询途径 1-步骤四打开具体”公示的试验信息“以后，下拉至”四、研究者信息”-“2、各参加机构信息”，如下图所示，即可查看开展该临床试验及对应负责的研究者名字。如果确定符合入排，去挂这个医生的号就可以了（小概率该研究者可能没号，那么可以考虑挂该医院“临床试验科室”或“I 期临床试验科室”（如有），或挂该主要研究者（一般为主任医师）同科室其他医生（主治/副主任医师等，一般承担“执行研究者”的角色，也就是实际执行试验相关医疗记录、决策的医生）去咨询。

四、研究者信息

1、主要研究者信息

1	姓名	沈琳	学位	医学博士	职称	主任医师
	电话	010-88196861	Email	linshenpku@163.com	邮政地址	北京市-北京市-北京市海淀区阜成路81号
	邮编	100142	单位名称	北京肿瘤医院		

2、各参加机构信息

序号	机构名称	主要研究者	国家或地区	省（州）	城市
1	北京肿瘤医院	沈琳	中国	北京市	北京市
2	广东省人民医院	周清	中国	广东省	广州市
3	山西省肿瘤医院	王鑫	中国	山西省	太原市
4	湖南省肿瘤医院	张永昌	中国	湖南省	长沙市
5	重庆大学附属肿瘤医院	李咏生	中国	重庆市	重庆市
6	上海市肺科医院	苏春霞	中国	上海市	上海市
7	河南省肿瘤医院	陈小兵	中国	河南省	郑州市
8	复旦大学附属肿瘤医院	虞先濬	中国	上海市	上海市
9	福建省肿瘤医院	黄章洲	中国	福建省	福州市
10	四川省肿瘤医院	李娟	中国	四川省	成都市
11	北京协和医院	赵林	中国	北京市	北京市
12	山东省肿瘤医院	孙玉萍、牛作兴	中国	山东省	济南市
13	华中科技大学同济医学院附属协和医院	吴河水	中国	湖北省	武汉市
14	浙江省人民医院	牟一平	中国	浙江省	杭州市
15	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	张艳桥	中国	黑龙江省	哈尔滨市
16	大连大学附属中山医院	王若雨、李响	中国	辽宁省	大连市

如果患者条件暂不允许到院咨询（比如跨省、状态不佳在卧床中），可以通过上图中的”1、主要研究者信息“-”电话“咨询（适用于计划在此医院参加临床试验），或可通过沟通医院问询电话（微信一搜医院名字就有了，没有的话百度一下医院官网找一下）了解科室电话进行简单咨询（不一定所有医院都支持），或建议首次咨询尽量在线上进行（如好大夫线上问诊），或由家属代为到院咨询（带好所有既往就诊病历、影像检查、血液检查、病理检查、基因检测报告等就诊记录，不带等于白来不带等于白来不带等于白来），一切以患者出发，尽量减少患者旅途奔波带来的体力消耗甚至感染风险，基础沟通以后初步符合再带患者来都行，不着急。

3. 临床试验一般情况需要患者做好哪些自查准备（尤其是减少跨省筛选完发现入不了白跑一趟的概率）？

A：**非常重要！！！一般来讲，肿瘤试验大多对患者基础情况有要求。没有满足这些要求，不要考虑临床试验。当然，基础状况不好的患者也可以通过调养而达到试验的入排要求，建议自查搞清楚了、符合要求了再到院参加试验筛选，尤其跨省的，不然筛败了就是白跑一趟。**

常见要求 1：一般情况，必须出现一线治疗耐药、进展、不耐受情况才能进临床试验，因此，如果患者现在 I、II 线治疗稳定，基本不用考虑临床试验，想入也入不了。

常见要求 2：一般情况，不可以有大出血、不可以有血栓、不可以才手术完、不可以才化疗放疗完（一般都要求至少间隔 4 周-6 周左右间隔），所有器官要保持有最基本的运转功能（即肝肾功能、凝血等可以通过血检报告看出来的检查结果不可以偏离正常值太多，高血压高血糖等慢病可控（稳定吃药），偏一点点可以的，具体的要求一般参考 CTCAE 5.0 或 6.0 分级 不超过 1 级（可以微信搜索自学））。

常见要求 3：一般情况，靶向药试验要求患者必须有基因检测报告或病理切片（一般都是白片至少 6 片，多的会要 10+片，没有做过穿刺或者手术后样本保留的，参加试验一般会要求穿刺），有的甚至两者皆要求有，并且请提前和保留有病理组织的医院联系确认好临床试验借出白片的步骤是什么以及白片数量是否可以满足试验所需白片数量要求。

常见要求 4：一般情况，可以有过传染病，但不可以处在传染病活动期（如乙肝丙肝梅毒等，确认是否在活动期建议可以在患者当地医院提前确认）。

常见要求 5：不同试验对脑转、骨转、肿瘤包血管情况，中枢神经疾病情况要求不一样，请通过问题 1 中的查询途径 1-步骤 5 所看到的“入选标准”和“排除标准”确认。

常规要求 6：一般情况“入选标准”中会有一条：“ECOG 评分 0-1”,意思就是患者必须可以自主活动，不可以瘫痪、卧床不起，至少要满足能自由走动及从事轻体力活动，包括一般家务或办公室工作，但不能从事较重的体力活动。

其他要求要看具体试验的“入选标准”和“排除标准”如下图，可按照问题 1-查询途径 1 查到，不懂的 AI 一下：

三、临床试验信息

1、试验目的

主要研究目的：确定JYP0015 的最大耐受剂量/最大给药剂量（MTD/ MAD）和JYP0015 推荐剂量（RD）；评估JYP0015 治疗RAS 突变的晚期实体瘤受试者的安全性
JYP0015 在RAS 突变晚期实体瘤受试者中的初步疗效。

2、试验设计

试验分类	安全性和有效性	试验分期	其它 其他说明:I/II 期临床研
随机化	非随机化	盲法	开放

3、受试者信息

年龄	18岁(最小年龄)至 80岁(最大年龄)	
性别	男+女	
健康受试者	无	
入选标准	1	患者自愿参加临床试验，并签署知情同意书
	2	签署知情同意书时年龄18 周岁以上（含），80 岁以下（含），性别不限
	3	经组织学/细胞学确诊的晚期实体瘤受试者I期：携带RAS 突变，经充分标准治疗后疾病进展或不耐受
	4	经组织学/细胞学确诊的晚期实体瘤受试者II期：胰腺癌队列、非小细胞肺癌队列、结直肠癌队列、
	5	美国东部肿瘤协作组（ECOG）体力评分0-1分
	6	预期生存时间≥3个月
	7	根据RECIST1.1（实体瘤）标准，至少有一个颅外可测量的肿瘤病灶；
	8	须提供肿瘤组织样本用于基因检测。肿瘤组织样本需为优选新近取得的肿瘤组织，无法提供新近取
	9	首次使用试验药物前具有足够的器官功能：实验室检查血液学（获得实验室检查前14天内未使用任
	10	有生育能力的合格患者（男性和女性）必须同意在试验期间和末次用药后至少90天内与其伴侣一起 须为阴性
排除标准	1	既往接受针对KRAS 突变的抑制剂（适用于Ia 期）
	2	首次使用试验药物前4周内接受过任何已批准抗肿瘤药物（包括处于临床研究阶段的抗肿瘤药物）的 周内； b) 口服氟尿嘧啶类、小分子靶向药物或局部抗肿瘤药物为首次使用试验药物前2周或药物的 免疫检查点抑制剂）为首次使用试验药物前4周或药物的5个半衰期内（以时间短的为准）。
	3	受试者尚未从既往抗癌治疗导致的AE 中恢复（即，恢复至1 级或基线）；
	4	存在中枢神经系统（CNS）转移病灶；先前治疗过的脑转移的受试者，如果病情稳定（间隔至少4 周 理的松稳定剂量，则允许入组；该例外情况不包括癌性脑膜炎，无论临床稳定性如何，均将其排除。
	5	首次使用试验药物前4 周内接受过主要脏器外科手术（不包括穿刺活检、静脉置管）或出现过显著
	6	除原发肿瘤外同时存在其他活动性恶性肿瘤；接受过根治性治疗的皮肤基底细胞或鳞状细胞癌、浅
	7	患有影响药物给药/吸收的胃肠道疾病，包括吞咽困难/不能吞咽药片，吸收不良综合征，难治性恶心
	8	筛选前12个月内患有中枢神经系统疾病史的患者，如癫痫发作、脑血管缺血/出血、瘫痪、失语、中 免疫性疾病。
	9	筛选前6 个月内有活动性或持续性消化道出血
	10	存在任何显著的临床或实验室检查，研究者认为影响安全性评价者，如：无法控制的糖尿病（HbA mmHg）、慢性肾病、甲状腺功能异常（通过激素替代治疗可以控制者，可以入组）

4. 如何决定加入临床试验的时机？

A：**患者角度**：

①如果这个时候出现耐药或者不耐受，根据癌肿，比如治疗方法欠缺的胰腺癌，强烈建议参加临床试验；

②对于仍然在一线治疗中且可以有效控制疾病的患者，建议继续坚持，已上市的药物是通过大量的数据去验证了其有效性和安全性的，不建议盲目参加临床试验；

③如果是不能耐受的患者，第一要务是调整到可以进入临床试验的状态，让受试者符合进入临床试验的要求，该调理肠胃的调理肠胃，该溶栓的溶栓，该治疗大出血的治疗大出血，直到患者调整至可以参加临床试验的状态再去进行临床试验筛选。

试验角度：

一、注册类临床试验

①I/II 期临床试验探索剂量有效性和安全性，建议慎重选择,因为很可能出现，患者进入的剂量组要不没效，要不副作用特别大。当然不乏出现像 JYP0015 这种国内做 I 期，国外原研 RMC-6236 已经要做 III 期的临床试验，没有临床治疗手段可以选择的患者可以一搏。

②III 期试验进入确证性临床阶段，如果是看好的药物，尤其是靶向药，III 期是所有注册类临床试验进入最好的时候，如果这个时候已无有效临床治疗手段选择，建议可以多结合自己的基因型、基础情况对比选择参加。

二、IIT 试验（研究者发起的临床试验）

IIT 临床试验也是最近较火的临床试验，这类试验相对于注册类临床试验，对患者的约束更小（如入组后的合并用药）、入组条件更低、患者自由度更高，但相对的，报销的项目也更少。比如只报销试验用药物，其他药物、检查费、住院费、都不报销。但这类试验使用的药物大多为已上市药物，试验目的多为扩适应症，安全性较高，也值得尝试。这类试验无法在查询途径 1 查到，建议通过查询途径 2 查询或咨询医生。

5. 如何了解某临床试验的副作用有哪些?

A： ①加患者群（微信公众号：熊猫和朋友们）问群友们。

②了解某一药物副作用，可以先了解其同类药物有哪些，再直接微信搜索同类药物的副作用有哪些，例如想了解 JYP0015 的副作用，可搜索”RMC-6236 药物副作用“。