ALOPECIA ANDROGENÉTICA FEMININA E SAÚDE GASTROINTESTINAL: ESTUDO DE CASO DE UM PROTOCOLO ESTÉTICO COM FOTOBIOMODULAÇÃO, INTRADERMOTERAPIA CAPILAR E CUIDADO DOMICILIAR

Estudo de caso — Tecnologia em Estética e Cosmetologia | UNIPLAC
LOPES, Paola Bortoli Pinheiro; LIZ, Marcia de; JUSTI, Mariana Macedo
XXIX Mostra Científica UNIPLAC — 2026

INTRODUÇÃO

- Alopecia androgenética feminina (AAF): perda capilar crônica, progressiva e multifatorial, de base genética e hormonal.
- Ação da DHT sobre folículos predispostos → encurtamento da fase anágena e miniaturização folicular (Ho; Sood; Zito, 2024).
- Prevalência crescente com a idade: ~1,3% (18–29 anos) a ~11,8% (após 70 anos) (Singal; Sonthalia; Verma, 2013).
- Fatores sistêmicos modulam a velocidade de progressão — entre eles, alterações gastrointestinais que comprometem a absorção de ferro, vitamina B12 e zinco. Estudo de caso descritivo e qualitativo, em andamento; paciente do sexo feminino, nascida em 1964 (60 anos ao início, 61 na reavaliação).
- Histórico: calvície paterna, gastrite crônica em tratamento, infecção por H. pylori já erradicada e confirmada por exames.
- Antecedente: em 2023, tratamento de desinflamação do couro cabeludo (não conduzido pela autora); meses depois, piora, diagnóstico de H. pylori e gastrite, cura da infecção com antibióticos e persistência da gastrite.
- Em 2024, estimulação mais intensa: intradermoterapia (técnica de pápula, Mescla PHD) e fotobiomodulação com luz vermelha, com tônico domiciliar de Capilia Longa.
- Instrumentos: ficha de anamnese capilar, tricoscopia com fotovideodermatoscópio e registro fotográfico padronizado.

O RECORTE GASTROINTESTINAL — E SEUS LIMITES

- H. pylori está associado à anemia ferropriva por gastrite crônica e queda da acidez gástrica (Does..., 2010).
- Ferritina baixa associa-se à alopecia feminina (Kantor et al., 2003); ferro, zinco e B12 sustentam a fase anágena (Guo; Katta, 2017).
- ATENÇÃO: a evidência direta que liga H. pylori à queda capilar é de ALOPECIA AREATA (autoimune), não da androgenética.
- Ponte mecanística plausível: má absorção de micronutrientes essenciais ao folículo. Fator associado e coadjuvante — nunca causa.

OBJETIVO

- Descrever um protocolo estético com fotobiomodulação, intradermoterapia capilar e cuidado domiciliar, conduzido em paralelo ao acompanhamento médico.
- Finalidade: controle da miniaturização folicular em paciente com AAF e histórico gastrointestinal relevante.

METODOLOGIA — PROTOCOLO APLICADO

Etapa	Período	Recurso	Frequência	Como foi feito
1	Mês 1	Intradermoterapia (Mescla PHD)	1 vez por semana	técnica de pápula, agulha 30G, 2–4 mm, ~0,05–0,1 mL por ponto, pápulas a cada 2 cm
2	A partir do mês 2	Fotobiomodulação (laser vermelho 655–660 nm, ~2 J/cm², ~20 min)	1 sessão a cada 15 dias	intercalada com a intradermoterapia
2	A partir do mês 2	Intradermoterapia (mesma técnica)	1 sessão a cada 15 dias	intercalada com o laser
Contínuo	Todo o período	Tônico Capilia Longa	diário, em casa	cuidado domiciliar

ASPECTOS ÉTICOS

- Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIPLAC sob o número 6.603.39.
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pela paciente modelo, autorizando procedimentos, registro fotográfico e divulgação acadêmica das imagens, preservada a identificação.

ANDAMENTO DA PESQUISA

- Pesquisa em andamento: os resultados ainda não foram analisados.
- A análise depende do registro fotográfico final (depois), a ser obtido nas mesmas condições do inicial, e da reavaliação tricoscópica.
- Os recursos têm respaldo na literatura (Avci et al., 2014; Uzel et al., 2021); protocolo combinado, sem possibilidade de isolar a contribuição de cada recurso (Kaiser et al., 2022).

REFERÊNCIAS (SELEÇÃO)

- DOES Helicobacter pylori infection play a role in iron deficiency anemia? A meta-analysis. World J. Gastroenterol., 2010.
- GUO, E. L.; KATTA, R. Diet and hair loss. Dermatol. Pract. Concept., v. 7, n. 1, 2017.
- HO, C. H.; SOOD, T.; ZITO, P. M. Androgenetic alopecia. StatPearls, 2024.
- KANTOR, J. et al. Decreased serum ferritin is associated with alopecia in women. J. Invest. Dermatol., v. 121, n. 5, 2003.
- SINGAL, A.; SONTHALIA, S.; VERMA, P. Female pattern hair loss. IJDVL, v. 79, n. 5, 2013.
- UZEL, B. P. K. et al. Intradermal injections with 0.5% minoxidil. Dermatol. Ther., v. 34, n. 1, 2021.
- YOON, J. S. et al. Low-level light therapy using a helmet-type device. Medicine, v. 99, n. 29, 2020.

DECLARAÇÃO DE USO DE IAG

- Os autores declaram o uso da ferramenta Claude (Anthropic) para organização de ideias, revisão linguística e adequação do texto às normas do evento.
- O conteúdo gerado foi revisado e validado pelos autores, que assumem integral responsabilidade pelo texto submetido.
- Contato: paolabortolilionn@gmail.com