ALOPECIA ANDROGENÉTICA FEMININA E SAÚDE GASTROINTESTINAL: ESTUDO DE CASO DE UM PROTOCOLO ESTÉTICO COM FOTOBIOMODULAÇÃO, INTRADERMOTERAPIA CAPILAR E CUIDADO DOMICILIAR

LOPES, Paola Bortoli Pinheiro[1]
LIZ, Marcia de[2]
JUSTI, Mariana Macedo[3]

INTRODUÇÃO: A alopecia androgenética feminina (AAF) é disfunção capilar crônica, progressiva e multifatorial, marcada pela miniaturização folicular e pela rarefação difusa do topo. Sua progressão pode ser modulada por fatores sistêmicos, como alterações gastrointestinais que comprometem a absorção de ferro, vitamina B12 e zinco. O histórico de *Helicobacter pylori* e de gastrite crônica é tratado como fator associado, jamais como causa: a evidência direta que o vincula à queda capilar concentra-se na alopecia areata, autoimune e distinta. **OBJETIVO:** Descrever um protocolo estético com fotobiomodulação, intradermoterapia capilar e cuidado domiciliar, conduzido em paralelo ao acompanhamento médico. **METODOLOGIA:** Estudo de caso descritivo e qualitativo, em andamento, com paciente nascida em 1964 (60 anos ao início e 61 na reavaliação mais recente), com histórico familiar de calvície, gastrite crônica em tratamento e *H. pylori* já erradicado e confirmado por exames; a anamnese identificou ainda relato de estresse psicológico e privação de sono, associados a distúrbios capilares. Em 2023, a paciente realizou tratamento de desinflamação do couro cabeludo, não conduzido pela autora; meses depois, houve piora, e a investigação identificou *H. pylori* e gastrite, com cura da infecção após antibióticos e persistência da gastrite. Em 2024, iniciou-se estimulação mais intensa, com intradermoterapia por pápula, luz vermelha e tônico domiciliar. Usaram-se anamnese capilar, tricoscopia e registro fotográfico padronizado. Seguiu-se a Resolução 466/12 do CNS, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIPLAC sob o número 6.603.39 e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). **RESULTADOS:** A pesquisa está em andamento e os resultados ainda não foram analisados, pois dependem do registro fotográfico final e da reavaliação tricoscópica. A literatura embasa os recursos: a fotobiomodulação eleva o ATP folicular e prolonga a fase anágena (Avci et al., 2014) e a intradermoterapia entrega os ativos no plano dérmico, contornando a absorção gastrointestinal (Uzel et al., 2021). Sustenta-se ponte mecanística plausível entre o quadro gastrointestinal e a alopecia, sem causalidade.

Palavras-Chave: Alopecia androgenética feminina. Fotobiomodulação. Intradermoterapia capilar. Helicobacter pylori.

DECLARAÇÃO DE USO DE IAG: Os autores declaram o uso da ferramenta Claude (Anthropic) para organização de ideias, revisão linguística e adequação do texto às normas do evento. O conteúdo gerado foi revisado e validado pelos autores, que assumem integral responsabilidade pelo texto submetido.

[1] Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Graduanda em Tecnologia em Estética e Cosmetologia. E-mail: paolabortolilionn@gmail.com, ORCID [a confirmar], Lattes [a confirmar].

[2] Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Orientadora. Tecnóloga em Cosmetologia e Estética Facial e Corporal pela UNIPLAC. Especialista em Estética e Imagem Corporal e MBA em Tricologia. Coordenadora do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia da UNIPLAC. Tricologista. E-mail [a confirmar], ORCID [a confirmar], Lattes: http://lattes.cnpq.br/5077931888781194.

[3] Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Orientadora. Biomédica e Cosmetóloga Esteta pela UNIPLAC. Especialista em Biomedicina Estética e em Ozonioterapia na Estética. Docente do curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia da UNIPLAC. E-mail [a confirmar], ORCID [a confirmar], Lattes: http://lattes.cnpq.br/5883666144835290.