Alopecia androgenética feminina e saúde gastrointestinal

Estudo de caso — Tecnologia em Estética e Cosmetologia | UNIPLAC
LOPES, Paola Bortoli Pinheiro; LIZ, Marcia de; JUSTI, Mariana Macedo
XXIX Mostra Científica UNIPLAC — 2026

INTRODUÇÃO

- Alopecia androgenética feminina (AAF): perda capilar crônica, progressiva e multifatorial, de base genética e hormonal.
- Ação da DHT sobre folículos predispostos → encurtamento da fase anágena e miniaturização folicular (Ho; Sood; Zito, 2024).
- Prevalência crescente com a idade: ~1,3% (18–29 anos) a ~11,8% (após 70 anos) (Singal; Sonthalia; Verma, 2013).
- Fatores sistêmicos modulam a velocidade de progressão — entre eles, alterações gastrointestinais que comprometem a absorção de ferro, vitamina B12 e zinco.

O RECORTE GASTROINTESTINAL — E SEUS LIMITES

- H. pylori está associado à anemia ferropriva por gastrite crônica e queda da acidez gástrica (Does..., 2010).
- Ferritina baixa associa-se à alopecia feminina (Kantor et al., 2003); ferro, zinco e B12 sustentam a fase anágena (Guo; Katta, 2017).
- ATENÇÃO: a evidência direta que liga H. pylori à queda capilar é de ALOPECIA AREATA (autoimune), não da androgenética.
- Ponte mecanística plausível: má absorção de micronutrientes essenciais ao folículo. Fator associado e coadjuvante — nunca causa.

OBJETIVO

- Descrever e discutir os resultados de um protocolo estético com fotobiomodulação, intradermoterapia capilar e cuidado domiciliar, conduzido em paralelo ao acompanhamento médico.
- Finalidade: controle da miniaturização folicular e melhora da qualidade capilar em paciente com AAF e histórico gastrointestinal relevante.

METODOLOGIA

- Estudo de caso descritivo e qualitativo, em andamento; paciente do sexo feminino, nascida em 1964 (60 anos ao início, 61 na reavaliação).
- Histórico: calvície paterna, gastrite crônica em tratamento, infecção por H. pylori já erradicada e confirmada por exames.
- Instrumentos: ficha de anamnese capilar, tricoscopia com fotovideodermatoscópio e registro fotográfico padronizado.
- Fase 1 (desinflamação): aromaterapia, argiloterapia e fotobiomodulação com luz azul.
- Fase 2 (estímulo): intradermoterapia (técnica de pápula, Mescla PHD), fotobiomodulação com luz vermelha e tônico domiciliar de Capilia Longa.

ASPECTOS ÉTICOS

- Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIPLAC sob o número 6.603.39.
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pela paciente modelo, autorizando procedimentos, registro fotográfico e divulgação acadêmica das imagens, preservada a identificação.

RESULTADOS PARCIAIS

- Terceiro semestre: terapia capilar como preparo da pele, com foco em home care — redução da hiperemia e da oleosidade.
- Neste ano: piora constatada e nova avaliação; higienização insuficiente e uso irregular do tônico domiciliar.
- Após a reavaliação: melhora dos hábitos domésticos (lavagem mais frequente) + apoio médico ao quadro gastrointestinal.
- Resultado parcial: aumento da microcirculação e novos fios nas áreas rarefeitas; série de sessões estendida.
- A adesão domiciliar foi o determinante mais evidente da resposta.
- Protocolo combinado: não é possível isolar a contribuição de cada recurso (Kaiser et al., 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Protocolo em duas fases foi bem tolerado e acompanhou-se de melhora do couro cabeludo e de novos fios nas áreas rarefeitas.
- Educação e acompanhamento da paciente são componentes do protocolo, não recomendações acessórias.
- Histórico de H. pylori e gastrite crônica: fatores sistêmicos ASSOCIADOS, com plausibilidade mecanística — não causa da AAF.
- Limitações: caso único, sem grupo controle, recursos combinados e avaliação predominantemente qualitativa.
- Estudos futuros: amostras maiores e dosagem seriada de ferritina, vitamina B12 e zinco.

REFERÊNCIAS (SELEÇÃO)

- DOES Helicobacter pylori infection play a role in iron deficiency anemia? A meta-analysis. World J. Gastroenterol., 2010.
- GUO, E. L.; KATTA, R. Diet and hair loss. Dermatol. Pract. Concept., v. 7, n. 1, 2017.
- HO, C. H.; SOOD, T.; ZITO, P. M. Androgenetic alopecia. StatPearls, 2024.
- KANTOR, J. et al. Decreased serum ferritin is associated with alopecia in women. J. Invest. Dermatol., v. 121, n. 5, 2003.
- SINGAL, A.; SONTHALIA, S.; VERMA, P. Female pattern hair loss. IJDVL, v. 79, n. 5, 2013.
- UZEL, B. P. K. et al. Intradermal injections with 0.5% minoxidil. Dermatol. Ther., v. 34, n. 1, 2021.
- YOON, J. S. et al. Low-level light therapy using a helmet-type device. Medicine, v. 99, n. 29, 2020.

DECLARAÇÃO DE USO DE IAG

- Os autores declaram o uso da ferramenta Claude (Anthropic) para organização de ideias, revisão linguística e adequação do texto às normas do evento.
- O conteúdo gerado foi revisado e validado pelos autores, que assumem integral responsabilidade pelo texto submetido.
- Contato: paolabortolilionn@gmail.com