

Partição aditiva da diversidade do zooplâncton como bioindicadora em riachos de Floresta Atlântica

Contrasting conservation conditions shape the spatial partitioning of zooplankton
diversity in Atlantic Forest streams ON Acta Limnologica Brasiliensia

Ellen Gomes da Silva Mayara Mirelly da Silva Monteiro
Marcela Vitória Bernardo da Silva
Ludmilla Cavalcanti Antunes Lucena Thais Xavier de Melo
Elvio Sergio Figueredo Medeiros

2026-09-10

Abstract

Table of contents

1	Introduction	2
1.1	Objectives	4
2	Metodologia	5
2.1	Área de estudo e delineamento amostral	5
2.2	Coleta de dados ambientais	5
2.3	Amostragem do zooplâncton	6
2.4	Análises estatísticas	7
3	Resultados	14
3.1	Variáveis ambientais	14
3.2	Community structure	26
3.3	Partitioning of diversity	34
3.4	Additive partition	40
3.5	Multiplicative partition	61
4	Discussion	65

Conclusions	70
Acknowledgements	71
Authorship contribution statement	71
Ethical approval	71
5 Declaração sobre o uso de inteligência artificial generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de preparação do manuscrito	71
References	72
Figures and Tables	81
Figures	81
Tables	81
Apendices	84
Non-used figures and tables	84

List of Figures

1	Mapa da área de influência da REBIO Guaribas.	82
2	Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por tipo de site.	84
3	Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, categorizados por riacho.	85
4	Etapas do desenvolvimento da pesquisa científica.	86

List of Tables

1	Environment data GT table.	83
2	Nutrient concentrations at the sampling sites.	83

1 Introduction

A Floresta Atlântica, reconhecida por sua alta riqueza de espécies e alto grau de endemismo (Branco et al., 2021; É. O. Lima, 2023; Tabarelli et al., 2012; Taboada et al., 2022), é uma das florestas tropicais mais ameaçadas mundialmente em decorrência de ações antrópicas, que

impactam negativamente a biodiversidade (Myers et al., 2000; Safar et al., 2020; Vancine et al., 2024). Embora ocupe cerca de 1,4% da superfície terrestre, este bioma abriga mais de 60% das espécies conhecidas, evidenciando sua relevância ecológica (Fonseca, 1985; Pôrto et al., 2005). No entanto, estima-se que a Floresta Atlântica tenha perdido cerca de 70% de seu habitat original em decorrência do desmatamento e da expansão das atividades humanas (Branco et al., 2021; Maxwell & Dean, 1995; Myers et al., 2000; Tabarelli et al., 2012).

A perda de habitat decorrente do desmatamento está diretamente associada ao processo de fragmentação florestal, resultando na formação de remanescentes isolados e na limitação da dispersão de espécies presentes neste ecossistema (Tabarelli et al., 2010; Zaú, 1998), interferindo negativamente na manutenção da biodiversidade (Souza et al., 2025).

Neste contexto, a fragmentação e o manejo florestal têm um impacto significativo na fauna de riachos dentro da Floresta Atlântica, uma vez que os organismos aquáticos são extremamente sensíveis às mudanças nas condições naturais da água causadas por atividades antrópicas (Gouveia et al., 2017). De acordo com Maltchik & Medeiros (2006), processos em escala de paisagem, como perturbação, fragmentação, dispersão e estrutura de mosaicos, influenciam diretamente as populações locais nos riachos. Dessa forma, é necessário compreender e preservar os processos ecológicos que indiquem a saúde ecológica destes corpos d'água e como a diversidade se mantém em uma escala local e regional.

Neste sentido, as comunidades aquáticas têm sido amplamente utilizadas como ferramentas para avaliar o estado ecológico de riachos, uma vez que estes respondem rapidamente às alterações ambientais. Dentre esses organismos, o zooplâncton se destaca por seu papel fundamental na transferência de energia entre os níveis tróficos e na ciclagem de nutrientes (Bonecker, 2012; Cardoso et al., 2009; ESTEVES, 2011).

Segundo Keppeler & Hardy (2004), as diferentes formas de ocupação de nichos nos ecossistemas de águas continentais são influenciadas pela interação de parâmetros físicos, químicos e biológicos, como variações sazonais, os quais podem interferir na composição de espécies e nos grupos zooplanctônicos. O zooplâncton é constituído por organismos de tamanhos e formas variáveis, com ciclos de vida e papéis funcionais distintos. Diversos estudos demonstram que este organismo é sensível às variações ambientais, como características físicas e químicas do ambiente, que podem refletir na composição de espécies e na substituição de táxons (Freiry et al., 2020; Melo & Medeiros, 2013), tornando-os, portanto, importantes bioindicadores ecológicos.

Em ecossistemas lóticos, a sazonalidade climática exerce um papel fundamental na composição das comunidades aquáticas, especialmente devido aos períodos seco e chuvoso. Essas variações hidrológicas influenciam diretamente as condições físicas e químicas dos corpos d'água, impactando na disponibilidade de recursos e micro-habitats e, conseqüentemente, a composição e a dinâmica das comunidades (ESTEVES, 2011; Junk et al., 1989; Souza et al., 2025; Ward, 1998).

Durante o período seco, há maior incidência de luz solar e aumento da temperatura, contudo, há menor variação espacial, favorecendo a permanência de populações locais. Em contraste, o

período chuvoso é caracterizado pelo aumento da vazão, intensificando processos de distúrbios, dispersão e substituição de espécies (Allan et al., 2021; Souza et al., 2025).

Os principais grupos zooplancônicos mais comumente utilizados como objetos de estudo são Rotifera e os microcrustáceos Cladocera e Copepoda. Além de sua ampla representatividade em ecossistemas aquáticos, constituem uma importante fonte de alimento para diferentes espécies, como peixes, aves aquáticas e mamíferos, permitindo a criação de um elo entre produtores e consumidores a partir da disponibilidade de energia para níveis tróficos superiores, uma vez que atuam como consumidores primários (Altındağ & Berdi, 2025; Balkić et al., 2022; Cardoso et al., 2009; Majeed et al., 2023; Marcelino et al., 2025; Souza et al., 2025).

De acordo com FLACH, (2009) e Lopes et al. (2014), a partição da diversidade tem recebido crescente atenção de ecólogos por permitir fracionar a diversidade em múltiplas escalas, permitindo testar se a diversidade é maior ou menor que o esperado com base na distribuição dos indivíduos nas unidades amostrais. Esta abordagem fornece informações acerca da organização das comunidades e os processos ecológicos que as estruturam.

Na partição aditiva, a diversidade de espécies é decomposta em componentes alfa e beta, permitindo obter a proporção da diversidade gama em diferentes habitats, paisagens ou regiões (Crist et al., 2003). Assim, a diversidade gama () corresponde à soma da diversidade alfa média () e da diversidade beta (), esta última representando o número de espécies que diferem entre os habitats.

Por sua vez, na partição multiplicativa, a diversidade gama é expressa como o produto das diversidades alfa média e beta, podendo ser interpretada como a diferenciação entre as comunidades (Jost, 2007; Whittaker, 1972). A aplicação conjunta dessas abordagens permite uma maior compreensão dos padrões de diversidade, especialmente naqueles que estão sujeitos à atividade antrópica, como riachos de Floresta Atlântica. Portanto, torna-se crucial realizar estudos acerca do zooplâncton utilizando essas métricas para compreender sua dinâmica espacial, avaliar a influência de fatores ambientais e o estado ecológico de ecossistemas aquáticos.

CITAR: (Ávila et al., 2011; Baselga, 2010, 2012; Crist et al., 2003; Ligeiro et al., 2010; Shell & Collier, 2018)

1.1 Objectives

O presente estudo teve como objetivo determinar a riqueza de espécies na comunidade zooplancônica e avaliar a partição da diversidade em diferentes escalas espaciais em ambientes aquáticos da Reserva Biológica Guaribas nos períodos seco e chuvoso.

Os objetivos específicos foram:

Verificar se os métodos aditivos e multiplicativos para o cálculo da partição da diversidade podem indicar o estado ecológico de ambientes sob diferentes níveis de impactos antropogênicos e períodos.

LER: (Carvalho, 2011; Melo, 2011)

2 Metodologia

2.1 Área de estudo e delineamento amostral

A Reserva Biológica Guaribas (REBIO) está localizada na Mesorregião da Mata Paraibana e na Microrregião do Litoral Norte, sendo uma unidade de conservação desde 1990 (Leal et al., 2025; MMA, 2003). São incluídas três áreas descontínuas, sendo elas SEMA 01 e SEMA 02 localizadas no município de Mamanguape, PB, e SEMA 03 localizada no município de Rio Tinto, PB. De acordo com a classificação de Köppen, o clima é quente e úmido, com estação seca no verão e chuvosa no inverno e temperaturas que variam entre 24°C e 26°C (MMA, 2003).

Por se tratar de uma unidade de conservação e por compor um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica do Estado da Paraíba, a reserva tornou-se essencial no que diz respeito à conservação de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, além de proteger nascentes de importantes riachos (MMA, 2003). Entretanto, ainda é possível observar atividades antrópicas na região, como o plantio de cana-de-açúcar, o cultivo de frutas e hortaliças e a formação de áreas de pastagens.

A área selecionada para o presente estudo, SEMA 02, abriga os riachos Caiana e Barro Branco que drenam no sentido sul-norte e cujos cursos não se estendem por mais de 10 km antes de desaguiarem no Rio Camaratuba, o qual, por sua vez, deságua no oceano Atlântico. Ambos os riachos nascem dentro da reserva, entretanto, o Caiana flui sobre uma área de floresta modificada para pastoreio e plantios, enquanto o Barro Branco flui parcialmente por uma área de Floresta Atlântica no interior da unidade (Figura 1)

As coletas ocorreram entre novembro de 2023 a fevereiro de 2024 durante o período seco e de junho a agosto de 2024 no período chuvoso. Foram selecionados 15 pontos de coleta (denominados Unidades Amostrais ou UAs) (Figura 1), localizados dentro e no entorno da Reserva Biológica. Para cada unidade amostral, foram coletadas três subamostras, uma em cada habitat, a fim de realizar uma análise estatística mais rigorosa (Martinelli & Kruche, 2004).

2.2 Coleta de dados ambientais

Dados físicos, químicos e ambientais foram coletados com a finalidade de caracterizar as condições do habitat em que as espécies foram encontradas. Neste contexto, foram avaliados os seguintes dados: **(1) morfometria**, como profundidade (m), largura (l) e velocidade da corrente de água (m/s); **(2) qualidade da água**, incluindo oxigênio dissolvido (mg/L) e

temperatura (°C); e **(3) estrutura do habitat**, por meio da avaliação dos tipos de substrato e estruturas subaquáticas e marginais (E. S. F. Medeiros et al., 2008).

Dentre as variáveis ambientais, realizou-se a medição das variáveis físicas e químicas, morfometria, qualidade da água e estrutura do habitat com o intuito de fornecer informações acerca do habitat em que as espécies foram encontradas. As variáveis químicas foram estimadas por meio de medidores de pH (TECNOPON MPA-210), condutividade (S/cm) (TECNOPON MCS-150) e turbidez da água (NTU), utilizando equipamentos de bancada no Laboratório de Ecologia (LABECO) – Campus V. As variáveis temperatura (°C) e oxigênio dissolvido (mg/L) (Lutron DO-5510) e velocidade da água (m/s) foram medidas em campo, sendo esta última medida utilizando o método da bóia de Maitland (1990).

Para a avaliação morfométrica de cada habitat nas 15 unidades amostrais (UAs), foram estabelecidos transectos nos quais foram medidos a largura e o comprimento com o auxílio de uma trena métrica. A profundidade e largura foram medidas em três seções equidistantes ao longo de cada transecto, também utilizando a trena métrica. A altitude, a forma e a distância entre as unidades amostrais foram determinadas através de dados obtidos por GPS. Esses dados foram empregados para calcular a área superficial, o volume e a distância entre os pontos de coleta.

Com o objetivo de quantificar a estrutura do habitat e classificar os ambientes estudados quanto à disponibilidade de recursos, os seguintes aspectos foram quantificados em cada ambiente: presença de macrófitas, vegetação submersa, vegetação flutuante, algas, vegetação ripária, liteira, raízes e galhos de árvores próximas. Os ambientes também foram classificados quanto ao tipo de substrato, sendo estimadas as proporções de lama, areia, pedras, seixos, entre outros. De acordo com a metodologia proposta por E. S. F. Medeiros et al. (2008), estes dados, levantados por meio de análise visual, estimam a contribuição proporcional de cada componente. Considerando que a maioria desses elementos estão concentrados nas margens, as medições foram obtidas a partir de transectos paralelos à margem dos ambientes estudados. Estes dados representam a proporção média (%) de cobertura dos aspectos medidos para cada trecho (E. S. F. Medeiros et al., 2008).

2.3 Amostragem do zooplâncton

Para a coleta de zooplâncton, foram filtrados 50 litros de água utilizando rede de plâncton com diâmetro de abertura de 30 cm e comprimento de 70 cm, com malha de 68 μ m. Os espécimes foram armazenados em frascos plásticos de 80 mL, denominados como Volume de Trabalho (Vt), fixados em solução de formaldeído a 4% e narcotizados por saturação de CO₂ (adição de água com gás). Posteriormente foi adicionada uma pequena quantidade de sacarose para evitar o desprendimento de ovos, a contração dos indivíduos ou que possam expelir seu conteúdo intestinal, já que após a coleta, é normal que ocorra a rápida degradação estrutural e metabólica (Bicudo & Bicudo, 2004).

Todas as amostras foram transportadas até o Laboratório de Ecologia (LABECO), localizado no Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas, Campus V – João Pessoa, da Universidade Estadual da Paraíba, para a realização da análise até o menor nível taxonômico possível, utilizando câmara de Sedgewick-Rafter com capacidade para 1 mL, microscópio (OLYMPUS CX31) e chaves de identificação como Koste & Shiel (1987); Shiel (1995) e ELMOOR-LOUREIRO, (1997). Além disso, todos os espécimes passaram por confirmação das espécies por uma especialista.

Após a coleta e o registro dos dados, as amostras foram organizadas em lotes e devidamente etiquetadas. Em seguida, realizou-se a confirmação de identificação das espécies por um especialista. Os dados de riqueza (R) e abundância total foram analisados com o objetivo de investigar os padrões de variação na estrutura das comunidades zooplancônicas das áreas estudadas.

2.4 Análises estatísticas

Para que as análises estatísticas fossem realizadas, foi efetuado o cálculo de densidade, considerando o número de indivíduos de espécie por m³, através da fórmula:

$$Dsp = \frac{Nsp}{Vf} \quad (1)$$

onde a densidade em número de indivíduos por m³ de uma espécie (*Dsp*) para um determinado habitat será o número de indivíduos da espécie (*Nsp*), dividido pelo volume total filtrado (*Vf*) (Bowen, 2017).

Além disso, as fórmulas de partição aditiva e multiplicativa também foram aplicadas:

$$\gamma = \alpha_1 + \sum_{i=1}^m \beta_i (*) \quad (2)$$

$$\beta_i = \gamma / \alpha_i (**) \quad (3)$$

Na **partição aditiva (*)** (Oksanen et al., 2020), é expressa como a soma da diversidade alfa do nível amostral () e das contribuições da diversidade beta () associadas a cada unidade amostral, conforme a equação (Equation 2). A diversidade () foi calculada a partir da razão entre a diversidade total () e a diversidade alfa observada em cada unidade amostral (), permitindo avaliar o grau de diferenciação entre as unidades amostrais em relação ao conjunto total de amostras. Valores mais elevados de indicam maior heterogeneidade entre as unidades amostrais, enquanto valores menores sugerem maior similaridade entre elas. Em resumo, a diversidade total () é resultado da diversidade média local () e da soma das diferenças entre

as unidades amostrais (). A **partição multiplicativa (**)** tem como função encontrar o valor da diversidade beta (), tendo em vista que a diversidade de espécies muda ao longo de escalas espaciais (Jost, 2007; Lande, 1996; Melo et al., 2009; Melo et al., 2012; Oksanen et al., 2020; Whittaker, 1972).

Os dados foram organizados em formatos de tabelas, gráficos e figuras e analisados por meio de testes estatísticos compatíveis através de técnicas multivariadas utilizando o ambiente de programação R/RStudio (Hair et al., 2021; R Core Team, 2017; RStudio Team, 2022; Zar, 1999).

Para a realização das análises estatísticas, foram utilizados pacotes que permitem avaliar a estrutura da comunidade com base na riqueza. A Análise de Componentes Principais (PCA) foi executada para avaliar as variáveis ambientais.

Foram empregados pacotes sobre partição da diversidade para que fosse possível decompor ou particionar a diversidade em componentes alfa (), beta () e gama (). A diversidade alfa se refere à diversidade de espécies em uma escala local, ou seja, dentro de manchas homogêneas locais ou unidades amostrais únicas. Diversidade gama, ou diversidade regional, corresponde a escalas espaciais maiores, enquanto que a diversidade beta manifesta-se quando há variação na diversidade entre os ambientes ou escalas espaciais (Chao et al., 2012; Farias et al., 2020).

Os gráficos e figuras sobre as partições foram realizados no programa estatístico RStudio utilizando os pacotes: eulerr, vegan e VennDiagram que forneceram informações acerca da distribuição da riqueza de espécies com base na diversidade alfa e diversidade gama (Chen & Boutros, 2011; Oksanen et al., 2020). Funções como adipart e multipart também foram empregadas. A função adipart foi utilizada para a partição aditiva da diversidade, em que conterà os valores médios da diversidade alfa que serão comparados com a diversidade total em todo o conjunto de dados (-diversidade) e multipart para partição multiplicativa da diversidade, que conterà os valores médios da -diversidade em níveis mais baixos de uma hierarquia e comparados com a diversidade total gama.

Esses pacotes permitiram uma análise detalhada e abrangente da distribuição e diversidade de espécies nos riachos estudados.

```
1 #REBIO23-part - ORGANIZANDO DADOS-----
2
3 dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
4 rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
5 cat("\014") #limpa o console
6
7 ##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS-----
8
9 library(openxlsx)
10 habitat <- read.xlsx("dados/rebio23-habitat.xlsx",
11                      rowNames = T,
```

```

12         colNames = T,
13         sheet = "ambiente",
14         startRow = 2)
15 # Identify columns containing only NA values
16 all.na <- names(habitat)[colSums(!is.na(habitat)) == 0]
17 all.na <- c(all.na, "w.Temp_C", "w.DO_mg.L")
18 # Remove those columns by name
19 m_hab_part <- habitat[, !names(habitat) %in% all.na, drop = FALSE]
20 # Removendo linhas por nome
21 rownames(m_hab_part)
22 del_rows <- c("C-C-P11-H1", "C-C-P11-H2", "C-C-P11-H3",
23             "S-C-P11-H1", "S-C-P11-H2", "S-C-P11-H3")
24 del_rows
25 m_hab_part <- m_hab_part[!(row.names(m_hab_part) %in% c(del_rows)),]
26 m_hab_part
27 # Remove columns with at least one NA
28 m_hab_part <- m_hab_part[, colSums(is.na(m_hab_part)) == 0, drop = FALSE]
29
30 ###REMOVENDO COLUNAS ZERADAS DE HABITAT----
31
32 sum <- colSums(m_hab_part)
33 sum
34 zero_sum <- names(which(colSums(m_hab_part) == 0))
35 zero_sum #nomes das colunas zeradas
36 m_part_cols <- m_hab_part[(colSums(m_hab_part) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
37 zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
38 zero_sum2 #nomes das colunas zeradas
39 sum<-colSums(m_part_cols)
40 sum
41
42 t_grps <- read.xlsx("dados/rebio23-habitat.xlsx",
43                   rowNames = T,
44                   colNames = T,
45                   sheet = "grupos",
46                   startRow = 2)
47
48 ###REMOVENDO LINHAS ZERADAS DE GRUPOS----
49
50 rownames(t_grps)
51 del_rows
52 t_grps <- t_grps[!(row.names(t_grps) %in% c(del_rows)),]
53 t_grps
54

```

```

55 ###SEPARANDO NUTRIENTES----
56
57 nutri <- grep("^n\\.\"", colnames(habitat), value = TRUE)
58 nutri
59 nutrientes <- habitat[, nutri, drop = FALSE]
60 nutrientes <- nutrientes[, colSums(!is.na(nutrientes)) > 0, drop = FALSE]
61 nutrientes <- na.omit(nutrientes)
62
63 ##SALVANDO MATRIZES FINAIS----
64
65 write.table(m_part_cols, "res/m_hab_part.csv",
66             sep = ";", dec = ".", #"\t",
67             row.names = TRUE,
68             quote = TRUE,
69             append = FALSE)
70 write.table(nutrientes, "res/t_nutri.csv",
71             sep = ";", dec = ".", #"\t",
72             row.names = TRUE,
73             quote = TRUE,
74             append = FALSE)
75 write.table(t_grps, "res/t_grps.csv",
76             sep = ";", dec = ".", #"\t",
77             row.names = TRUE,
78             quote = TRUE,
79             append = FALSE)
80 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
81                   sep = ";", dec = ".",
82                   row.names = 1,
83                   header = TRUE,
84                   na.strings = NA)
85 t_nutri <- read.csv("res/t_nutri.csv",
86                    sep = ";", dec = ".",
87                    row.names = 1,
88                    header = TRUE,
89                    na.strings = NA)
90 m_hab <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
91                  sep = ";", dec = ".",
92                  row.names = 1,
93                  header = TRUE,
94                  na.strings = NA)
95
96 #REBIO23-part----
97
98

```

```

3  ##ORGANIZANDO DADOS-----
4
5  dev.off()
6  rm(list=ls(all=TRUE))
7  cat("\014")
8
9  t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
10                   sep = ";", dec = ".",
11                   row.names = 1,
12                   header = TRUE,
13                   na.strings = NA)
14  m_hab <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
15                   sep = ";", dec = ".",
16                   row.names = 1,
17                   header = TRUE,
18                   na.strings = NA)
19
20  ##CORRELOGRAMA E REMOÇÃO DE VARIÁVEIS REDUNDANTES OU DESNECESSÁRIAS-----
21
22  library(psych)
23  colnames(m_hab)
24  png("res/fig-h.hab_pairs.png")
25  pairs.panels(m_hab[,1:8],
26              method = "pearson", # correlation method
27              scale = FALSE, lm = FALSE,
28              hist.col = "#00AFBB", pch = 19,
29              density = TRUE, # show density plots
30              ellipses = TRUE, # show correlation ellipses
31              alpha = 0.5)
32  dev.off()
33
34  cor <- cor(m_hab)
35  cor
36
37  library(corrplot)
38  png("res/fig-hab_corrplot.png")
39  corrplot(cor, method = "circle")
40  dev.off()
41
42  ##DELETANDO COLINEARES OU INDESEJADAS-----
43
44  sink(file = "res/colineares.txt", append = F, split = T)
45  colnames(m_hab)

```

```

46 del_cols <- c("", "")
47 #del_cols <- grep("^n\\. ", colnames(m_hab), value = TRUE)
48 m_hab_part <- m_hab[, !(colnames(m_hab) %in% del_cols)]
49
50 ##SOMANDO REDUNDANTES-----
51
52 m_hab_part$h.Algae <- m_hab_part$h.Algae_f + m_hab_part$h.Algae_a
53 m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
54                               %in% c("h.Algae_f", "h.Algae_a"))]
55 m_hab_part$h.Debris <- m_hab_part$h.Debris_l + m_hab_part$h.Debris_s
56 m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
57                               %in% c("h.Debris_l", "h.Debris_s"))]
58
59 colnames(m_hab_part)
60 m_hab_part
61 sink()
62
63 write.table(m_hab_part, "res/m_hab_part.csv",
64             sep = ";", dec = ".", #"\\t",
65             row.names = TRUE,
66             quote = TRUE,
67             append = FALSE)
68 m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
69                       sep = ";", dec = ".",
70                       row.names = 1,
71                       header = TRUE,
72                       na.strings = NA)
73
74 colnames(m_hab_part)
75 library(PerformanceAnalytics)
76 chart.Correlation(m_hab_part[, c(1:20)], histogram=TRUE)
77 # ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, .p<0.10
78
79 library(Hmisc)
80 mat <- as.matrix(m_hab_part[, 1:20])
81 res <- rcorr(mat, type = "pearson")
82 cor_mat <- res$r
83 p_mat <- res$P
84
85 stars <- ifelse(p_mat < 0.001, "***",
86                 ifelse(p_mat < 0.01, "**",
87                         ifelse(p_mat < 0.05, "*", "")))
88

```

```

16 cor_star <- ifelse(p_mat < 0.05,
17                     paste0(round(cor_mat, 2), stars),
18                     NA)
19
20 cor_star <- matrix(
21   cor_star,
22   nrow = nrow(cor_mat),
23   dimnames = dimnames(cor_mat)
24 )
25
26 cor_star[upper.tri(cor_star, diag = TRUE)] <- NA
27 cor_star <- noquote(cor_star)
28 print(cor_star, na.print = "")

1  #PCA fviz package----
2  #browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract
3
4  #ORGANIZANDO DADOS----
5
6  dev.off()
7  rm(list=ls(all=TRUE))
8  cat("\014")
9
10 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
11                    sep = ";", dec = ".",
12                    row.names = 1,
13                    header = TRUE,
14                    na.strings = NA)
15 m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
16                        sep = ";", dec = ".",
17                        row.names = 1,
18                        header = TRUE,
19                        na.strings = NA)
20
21 colnames(m_hab_part)
22
23 ###RELATIVIZAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES----
24 library(vegan)
25 library(tidyverse)
26
27 # Selecionando variáveis que começam com "w" ou "m"
28 m_wm <- m_hab_part[, grep("^(w|m)", colnames(m_hab_part))]
29

```

```

30 # Selecionando variáveis que começam com "s" ou "h"
31 m_sh <- m_hab_part[, grep("^s|h)", colnames(m_hab_part))]
32
33 # Removendo os dois primeiros caracteres dos nomes das colunas
34 colnames(m_wm) <- sub("^..", "", colnames(m_wm))
35 colnames(m_sh) <- sub("^..", "", colnames(m_sh))
36
37 # Transformações
38 m_wm <- sqrt(m_wm)
39 m_sh <- asin(sqrt(decostand(m_sh, method = "total", MARGIN = 2)))
40
41 # Juntando tudo em uma única tabela
42 hab_trns <- cbind(m_sh, m_wm)
43
44 # Salvando m_hab_trns
45 write.table(hab_trns, "res/m_hab_trns.csv",
46             sep = ";", dec = ".", #"\t",
47             row.names = TRUE,
48             quote = TRUE,
49             append = FALSE)
50 m_hab_trns <- read.table("res/m_hab_trns.csv",
51                          sep = ";", dec = ".",
52                          row.names = 1,
53                          header = TRUE,
54                          na.strings = NA)

```

3 Resultados

3.1 Variáveis ambientais

É importante destacar que as unidades amostrais (UAs) P05 a P10 correspondem ao riacho Barro Branco, sendo as UAs P5, P6 e P7 localizadas no interior da reserva, enquanto que os pontos P08, P09 e P10 estão situados fora da área de preservação. O riacho Caiana, por sua vez, é representado pelas UAs P12 a P20, todas localizadas fora da reserva (ver Figure 1).

Os resultados da Análise de Componentes Principais (PCA) evidenciaram uma clara diferenciação das unidades amostrais com base nas características físicas e estruturais do habitat. Ao longo dos riachos e períodos amostrais analisados.

No período seco, observou-se que as UAs P05, P07 e P08, pertencentes ao riacho Barro Branco, apresentaram maior associação a liteira, algas filamentosas e aderidas. Em contraste, a UA P06 do Barro Branco, juntamente com as UAs P16, P17 e P20, do Caiana, esteve associada

principalmente às variáveis estruturais, como a presença de pedras, profundidade máxima, mínima e marginal, largura e vegetação submersa. Além disso, P10 do Barro Branco e P18 do Caiana apresentaram associação evidente ao pH, cujos valores variaram de ácido a levemente neutro.

No período chuvoso, a distribuição das unidades amostrais no espaço da biplot indicou alterações nos padrões de associação observados no período seco. As UAs P05 e P06 do Barro Branco, assim como a UA P18 do Caiana, estiveram associadas principalmente à presença de lama, macrófitas, vegetação submersa, folhigo e detritos. Por outro lado, as P08, P10 e P16 apresentaram maior associação com algas filamentosas e aderidas, vegetação marginal e largura média do canal.

De modo geral, os resultados indicaram que ambos os períodos contribuíram de formas distintas para a estruturação do habitat, evidenciando variações espaciais e sazonais nas características físicas e estruturais dos riachos estudados.

```
1  #TABELA DE HABITAT----
2
3  m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
4                        sep = ";", dec = ".",
5                        row.names = 1,
6                        header = TRUE,
7                        na.strings = NA)
8  t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
9                   sep = ";", dec = ".",
10                  row.names = 1,
11                  header = TRUE,
12                  na.strings = NA)
13
14  library(dplyr)
15  library(tidyr)
16  m_trab <- m_hab_part %>%
17    rename_with(~ gsub("_", ".", .))
18  m <- m_trab %>%
19    group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
20    summarise(across(where(is.numeric),
21                     list(mean = mean, min = min, max = max)),
22              .groups = 'drop') %>%
23    pivot_longer(
24      cols = -c(PontoN),
25      names_to = c("Variable", ".value"),
26      names_sep = "_"
27    )
28
29  m <- as.data.frame(m)
```

```

30 m_wide <- m %>%
31   mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("m.Vel.m.s"),
32                                paste0(round(mean, 3), " (" , round(min, 3), "-", round(max, 3)
33                                paste0(round(mean, 1), " (" , round(min, 1), "-", round(max, 1)
34   unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
35   select(Variable, Location, stat_string) %>%
36   pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)
37
38 m_wide
39 m_wide <- as.data.frame(m_wide)
40 cols <- colnames(m_wide)
41 col_order <- c(
42   "Variable",
43   cols[cols != "Variable"][
44     order(as.numeric(gsub("Ponto", "", cols[cols != "Variable"])))]
45   ]
46 )
47 m_wide <- m_wide[, c(col_order)] #sequência das colunas
48 row_order <- c(
49   "w.Cond.uS.cm",
50   "w.Turb.ntu",
51   "w.pH",
52   "m.Elev.m",
53   "m.Vel.m.s",
54   "m.Slope",
55   "m.Depth.avg.cm",
56   "m.Depth.mar.cm",
57   "s.Mud",
58   "s.Sand",
59   "s.Gravel.f",
60   "s.Rocks",
61   "h.Macrophytes",
62   "h.Algae",
63   "h.Subm.veg",
64   "h.Overh.veg",
65   "h.Grass",
66   "h.Leaf.l",
67   "h.Root.masses",
68   "h.Debris"
69 )
70 m_wide <- m_wide[match(row_order, m_wide$Variable), ]
71 m_wide
72

```

```

73 # Salvado m_wide
74 write.table(m_wide, "res/m_wide_hab.txt",
75             sep = ";", dec = ".", #"\t",
76             row.names = TRUE,
77             quote = TRUE,
78             append = FALSE)
79 m_wide_hab <- read.table("res/m_wide_hab.txt",
80                          sep = ";", dec = ".",
81                          row.names = 1,
82                          header = TRUE,
83                          na.strings = NA)
84
85 # Exportando dados para Excel
86 library(openxlsx)
87 #write.xlsx(m_wide, file = "res/tabela de habitat.xlsx", rowNames = FALSE)
88 wb <- loadWorkbook("res/tabela de habitat.xlsx")
89 writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide)
90 saveWorkbook(wb, "res/tabela de habitat.xlsx", overwrite = TRUE)
91
92 # Tabela final ajustada no Excel
93 library(readxl)
94 hab_gtable <- read_excel(
95   path = "res/tabela de habitat.xlsx",
96   sheet = "tabela_final",
97   range = "A1:P21") #ajustar para o tamanho da tabela final
98 hab_gtable
99 library(gt)
100 hab_gtable <- gt(hab_gtable)
101 hab_gtable <- sub_missing(hab_gtable,
102                           columns = everything(), missing_text = "")
103 #hab_gtable <- fmt_number(hab_gtable, columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
104 hab_gtable
105 gtsave(hab_gtable, "res/gt-hab_gtable_xlsx.html")
106 saveRDS(hab_gtable, "res/gt-hab_gtable_xlsx.rds")

```



```

1 # Escolher sumário de uma variavel
2 m
3 var <- "w.Temp.C"
4 m[m$Variable == var, "mean"] #cada valor de var
5 summary(m[m$Variable == var, "mean"]) #sumário dos valores de var
6
7 # Escolher sumário de um grupo de variáveis do df m
8 vars <- unique(grep("^h\\.\\.", m$Variable, value = TRUE))

```

```

9 summaries <- list() #criam uma lista vazia para guardar os sumários
10 # Loop para cada variável do grupo e guarda em summaries
11 for (var in vars) {
12   summaries[[var]] <- summary(m[m$Variable == var, "mean"])
13 }
14 #var is a temporary variable used in the for loop to iterate through
15 #each variable name that starts with "h."
16
17 summaries
18 summary_table <- do.call(rbind, lapply(summaries, as.data.frame.list))
19 round(summary_table, 2)
20 #sink(file = "summary_h.txt", split = TRUE)
21 round(summary_table[order(summary_table$Mean, decreasing = FALSE), ], 2)
22 #sink()
23
24 # Tabela limpa
25 #summary_table <- cbind(Variable = rownames(summary_table), summary_table)
26 #rownames(summary_table) <- NULL
27 #colnames(summary_table) <- c("Variable", "Min", "Q1", "Median", "Mean", "Q3", "Max")
28 #summary_table

1 #PCA fviz package----
2 #browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract
3
4 #ORGANIZANDO DADOS----
5
6 dev.off()
7 rm(list=ls(all=TRUE))
8 cat("\014")
9
10 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
11                   sep = ";", dec = ".",
12                   row.names = 1,
13                   header = TRUE,
14                   na.strings = NA)
15 m_hab_trns <- read.csv("res/m_hab_trns.csv",
16                       sep = ";", dec = ".",
17                       row.names = 1,
18                       header = TRUE,
19                       na.strings = NA)
20
21 #PCA----
22

```

```

23 library("FactoMineR")
24 library("factoextra")
25
26 pca <- PCA(m_hab_trns, scale.unit = TRUE, ncp = 5, graph = TRUE)
27 print(pca)
28
29 eig.val <- get_eigenvalue(pca)
30 eig.val
31
32 #sink(file = "res/cor_matrix.txt", append = FALSE)
33 pca$var$cor
34 #sink()
35
36 fviz_eig(pca, addlabels = TRUE, ylim = c(0,30))
37
38 var <- get_pca_var(pca)
39 var
40
41 fviz_pca_var(pca, col.var = "black")
42
43 library("corrplot")
44 corrplot(var$cos2, is.corr=FALSE)
45
46 fviz_cos2(pca, choice = "var", axes = 1:2)
47
48 fviz_pca_var(pca, col.var = "cos2",
49             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
50             repel = TRUE # Avoid text overlapping
51 )
52
53 fviz_pca_var(pca, alpha.var = "cos2")
54
55 corrplot(var$contrib, is.corr=FALSE)
56
57 fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 1, top = 10)
58 fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 2, top = 10)
59 fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 1:2, top = 10)
60
61 fviz_pca_var(pca, col.var = "contrib",
62             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07")
63 )
64 fviz_pca_var(pca, alpha.var = "contrib")
65

```

```

66  ##GROUPING BY KMEANS-----
67
68  set.seed(123)
69  res.km <- kmeans(var$coord, centers = 3, nstart = 25)
70  grp <- as.factor(res.km$cluster)
71  # Color variables by groups
72  fviz_pca_var(pca, col.var = grp,
73               palette = c("#0073C2FF", "#EFC000FF", "#868686FF"),
74               legend.title = "Cluster")
75
76  ind <- get_pca_ind(pca)
77  ind
78  ind$contrib
79
80  ##BIPLOTS-----
81
82  fviz_pca_ind(pca)
83
84  fviz_pca_ind(pca, col.ind = "cos2",
85               gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
86               repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
87  )
88
89  fviz_pca_ind(pca, pointsize = "cos2",
90               pointshape = 21, fill = "#E7B800",
91               repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
92  )
93
94  fviz_pca_ind(pca, col.ind = "cos2", pointsize = "cos2",
95               gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
96               repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
97  )
98
99  fviz_cos2(pca, choice = "ind")
100
101  fviz_contrib(pca, choice = "ind", axes = 1:2)
102
103  # Create a random continuous variable of length 23,
104  # Same length as the number of active individuals in the PCA
105  t_grps <- t_grps[rownames(pca$ind$coord), ]
106  colnames(t_grps)
107  set.seed(123)
108  # Escolhendo variável categorica

```

```

109 my.cont.var <- t_grps$Rio
110 my.cont.var
111 # Color individuals by the continuous variable
112 fviz_pca_ind(
113   pca,
114   habillage = my.cont.var,
115   palette = c("blue", "yellow", "red", "pink"),
116   repel = FALSE
117 )
118
119 fviz_pca_ind(pca,
120   geom.ind = "point", #show points only (nbut not "text")
121   col.ind = as.factor(my.cont.var), #color by groups
122   palette = "grey",
123   addEllipses = TRUE, #concentration ellipses
124   legend.title = "Groups"
125 )
126
127 length(unique(my.cont.var))
128 fviz_pca_ind(pca,
129   geom.ind = "point",
130   col.ind = my.cont.var,
131   palette = "grey",
132   addEllipses = TRUE, ellipse.type = "confidence",
133   mean.point = TRUE,
134   legend.title = "Groups")
135
136 fviz_pca_biplot(pca, repel = TRUE,
137   col.var = "#2E9FDF", #variables color
138   col.ind = "#696969" #individuals color
139 )
140
141 fviz_pca_biplot(pca,
142   col.ind = my.cont.var, palette = "jco",
143   addEllipses = TRUE, ellipse.type = "t", #t-distribution confidence ellipses"
144   ellipse.level = 0.95,
145   shape.ind = my.cont.var,
146   label = "var",
147   col.var = "black", repel = TRUE,
148   legend.title = "Species") +
149   scale_color_manual(values = c(
150     "#1B9E77",
151     "#D95F02",

```

```

152     "#7570B3",
153     "#E7298A"
154   )) +
155   scale_shape_manual(values = c(
156     16, # circle
157     17, # triangle
158     15, # square
159     18 # diamond
160   ))
161
162   ### FILTRANDO AS VARIÁVEIS
163   var_coord <- pca$var$coord[,1:2]
164   keep_vars <- apply(abs(var_coord) > 0.5,1,any)
165   vars_to_keep <- rownames(var_coord)[keep_vars]
166   pca_filt <- pca
167   pca_filt$var$coord <- pca$var$coord[vars_to_keep,,drop=FALSE]
168   pca_filt$var$cos2 <- pca$var$cos2[vars_to_keep,,drop=FALSE]
169   pca_filt$var$contrib <- pca$var$contrib[vars_to_keep,,drop=FALSE]
170
171   ### AJUSTE MANUAL DAS COORDENADAS DOS VETORES
172   var_coords <- as.data.frame(pca_filt$var$coord)
173   var_coords$Dim.1 <- var_coords$Dim.1*4.2
174   var_coords$Dim.2 <- var_coords$Dim.2*4.2
175
176   ## Caso queira editar manualmente
177   #fix(var_coords) #nomes das colunas
178   #write.table(var_coords,"coords_var.txt")
179
180   var_coords <- read.table("coords_var.txt",
181                           header=TRUE,
182                           row.names=1)
183
184   ### AJUSTE MANUAL DOS INDIVÍDUOS
185   ind_coords <- as.data.frame(pca_filt$ind$coord)
186
187   ## Caso queira editar manualmente
188   #fix(ind_coords) #nomes das linhas
189   #write.table(ind_coords,"coords_ind.txt")
190
191   ind_coords <- read.table("coords_ind.txt",
192                           header=TRUE,
193                           row.names=1)
194

```

```

195 # GRÁFICO FINAL
196
197 library(factoextra)
198 library(ggplot2)
199
200 t_grps$Ref_site <- as.factor(t_grps$Ref_site)
201
202 #png("fig-hab_PCA_fviz.png", width=11, height=9, units="in", res=400)
203
204 library(ggplot2)
205
206 ggplot() +
207
208   geom_hline(yintercept = 0, linetype = 2) +
209   geom_vline(xintercept = 0, linetype = 2) +
210
211   geom_point(
212     data = ind_coords,
213     aes(Dim.1, Dim.2, shape = t_grps$Ref_site),
214     size = 3,
215     colour = "black"
216   ) +
217
218   geom_segment(
219     data = var_coords,
220     aes(x = 0, y = 0,
221         xend = Dim.1,
222         yend = Dim.2),
223     colour = "red",
224     arrow = arrow(length = unit(0.25,"cm"))
225   ) +
226
227   geom_text(
228     data = transform(
229       var_coords,
230       nudge_y = ifelse(Dim.2 >= 0, 0.25, -0.25)
231     ),
232     aes(
233       x = Dim.1,
234       y = Dim.2 + nudge_y,
235       label = rownames(var_coords)
236     ),
237     colour = "red",

```

```

238     size = 4,
239     nudge_x = 0.19
240 ) +
241
242 scale_shape_manual(values = c(15,16,0,1,2,17)) +
243
244 labs(
245   x = paste0("Dim1 (", round(pca$eig[1,2],1), "%)"),
246   y = paste0("Dim2 (", round(pca$eig[2,2],1), "%)"),
247   shape = "Sites"
248 ) +
249
250 coord_equal() +
251 theme_minimal()
252
253 #dev.off()

```

1 *#TABELA DE NUTRIENTES----*

2

3 *##ORGANIZANDO DADOS----*

4

```

5 dev.off()
6 rm(list=ls(all=TRUE))
7 cat("\014")
8
9 t_nutri <- read.csv("res/t_nutri.csv",
10                   sep = ";", dec = ".",
11                   row.names = 1,
12                   header = TRUE,
13                   na.strings = NA)
14
15 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
16                  sep = ";", dec = ".",
17                  row.names = 1,
18                  header = TRUE,
19                  na.strings = NA)
20
21 nutri <- t_nutri
22
23 library(dplyr)
24 library(tidyr)
25 t_grps <- t_grps[seq_len(nrow(nutri)), , drop = FALSE]
26 m_trab <- nutri %>%

```

```

27   rename_with(~ gsub("_", ".", .))
28 m <- m_trab %>%
29   group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
30   summarise(across(where(is.numeric),
31                     list(mean = mean, min = min, max = max)),
32             .groups = 'drop') %>%
33   pivot_longer(
34     cols = -c(PontoN),
35     names_to = c("Variable", ".value"),
36     names_sep = "_"
37   )
38
39 m <- as.data.frame(m)
40 colnames(m_trab)
41 m_wide <- m %>%
42   mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("Ammonia.NH3.ug.L"),
43                                paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
44                                paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
45   unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
46   select(Variable, Location, stat_string) %>%
47   pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)
48
49 m_wide
50 m_wide <- as.data.frame(m_wide)
51 cols <- colnames(m_wide)
52 col_order <- c(
53   "Variable",
54   cols[cols != "Variable"][
55     order(as.numeric(gsub("Ponto", "", cols[cols != "Variable"])))]
56   ]
57 )
58 m_wide <- m_wide[, c(col_order)] #sequência das colunas
59 m_wide
60
61 # Salvo m_wide
62 write.table(m_wide, "res/m_wide_nutri.txt",
63             sep = ";", dec = ".", #"\\t",
64             row.names = TRUE,
65             quote = TRUE,
66             append = FALSE)
67 m_wide_nutri <- read.table("res/m_wide_nutri.txt",
68                            sep = ";", dec = ".",
69                            row.names = 1,

```

```

70         header = TRUE,
71         na.strings = NA)
72
73 # Exportando dados para Excel
74 library(openxlsx)
75 #write.xlsx(m_wide, file = "res/tabela de nutrientes.xlsx", rowNames = FALSE)
76 wb <- loadWorkbook("res/tabela de nutrientes.xlsx")
77 writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide_nutri)
78 saveWorkbook(wb, "res/tabela de nutrientes.xlsx", overwrite = TRUE)
79
80 # Tabela final ajustada no Excel
81 library(readxl)
82 nutri_gtttable <- read_excel(
83   path = "res/tabela de nutrientes.xlsx",
84   sheet = "tabela_final",
85   range = "A1:P6") #ajustar para o tamanho da tabela final
86 nutri_gtttable
87 library(gt)
88 nutri_gtttable <- gt(nutri_gtttable)
89 nutri_gtttable <- sub_missing(nutri_gtttable,
90                               columns = everything(), missing_text = "")
91 nutri_gtttable
92 gtsave(nutri_gtttable, "res/gt-nutri_gtttable_xlsx.html")
93 saveRDS(nutri_gtttable, "res/gt-nutri_gtttable_xlsx.rds")

```

3.2 Community structure

Foram registrados táxons pertencentes aos grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda, distribuídos entre os riachos Barro Branco e Caiana, durante os períodos seco e chuvoso (Tabela 1). No total, foram contabilizadas 15 espécies de Rotifera, 12 de Cladocera e 6 de Copepoda, incluindo estágios juvenis, como náuplios e copepoditos.

A comunidade zooplanctônica esteve distribuída em 15 famílias, sendo Lecanidae a mais representativa em ambos os períodos amostrais, com 15 espécies registradas, seguida por Lepadellidae (4 espécies) e Brachionidae (3 espécies).

No período seco, foram registrados 58 táxons, com predominância de Rotifera, seguidos por Cladocera e Copepoda. No período chuvoso, observou-se o mesmo padrão de composição, contudo, com redução no número total de táxons, sendo registrados 40 táxons.

Entre os Rotifera, a família Lecanidae foi a mais representativa em ambos os períodos, com espécies do gênero *Lecane* ocorrendo de forma recorrente nos dois riachos. Espécies como *Lecane bulla* (Gosse, 1851), *L. cornuta* (Müller, 1786), *L. crepida* (Harring, 1914), *L. curvicornis*

(Murray, 1913), *L. leontina* (Turner, 1892), *L. lunaris* (Ehrenberg, 1832) e *L. luna* (Müller, 1776) ocorreram em ambos os períodos e foram compartilhadas entre os riachos Barro Branco e Caiana.

O Caiana apresentou maior número de táxons exclusivos, especialmente entre Rotifera e Cladocera, tanto no período seco quanto no chuvoso, enquanto no Barro Branco apresentou composição mais reduzida.

Quando se discute sobre espécies exclusivas, se refere a espécies que ocorrem unicamente no riacho amostrado, logo:

No período seco foram registradas 12 espécies de Rotifera exclusivas no riacho Caiana, incluindo *Dicranophoroides* sp., *Dissotrocha aculeata* (Ehrenberg, 1832), *Testudinella mucronata* (Gosse, 1886), *Lepadella patella* (Müller, 1773), *Lepadella* sp.1, *Lepadella* sp.2, *Euchlanis dilatata* (Ehrenberg, 1832), *Polyarthra bicerca* (Wulfert, 1956), *P. dolichoptera* (Idelson, 1925), *Mytilina crassipes* (Lucks, 1912), *M. bisulcata* (Lucks, 1912) e *Trichotria tetractis* (Ehrenberg, 1830). Ainda neste período, no Barro Branco foram registradas 9 espécies de Rotifera exclusivas, sendo elas *Lecane aculeata* (Jakubski, 1912), *L. furcata* (Murray, 1913), *L. quadridentata* (Ehrenberg, 1830), *Lecane* sp.3, *Brachionus patulus* (Müller, 1786), *Polyarthra dolichoptera* (Idelson, 1925), *Polyarthra* sp., *Mytilina bisulcata* (Lucks, 1912) e *Trichocerca* sp.

No período chuvoso, o riacho Caiana manteve o maior número de espécies exclusivas (5 espécies), sendo elas *Testudinella mucronata* (Gosse, 1886), *Filinia longiseta* (Ehrenberg, 1834), *Lecane aculeata* (Jakubski, 1912), *L. papuana* (Murray, 1913) e *Colurella* sp. No riacho Barro Branco, foram registradas 4 espécies exclusivas: *Cephalodella* sp., *Macrochaetus* sp., *Lepadella ovalis* (Müller, 1786) e *L. patella* (Müller, 1773).

Entre os Cladocera, foram registradas 5 famílias e 12 espécies. A família Chydoridae apresentou ampla distribuição, com *Alonella dadayi* (Birge, 1910) ocorrendo em ambos os riachos e períodos. No período seco, foram registradas sete espécies exclusivas no riacho Caiana, enquanto no riacho Barro Branco foi registrada apenas *Chydorus* sp. No período chuvoso, o número de espécies exclusivas reduziu-se para uma em cada riacho, sendo *Leydigia* sp. no Caiana e *Macrothrix* sp. no Barro Branco.

Os Copepoda estiveram representados pelas famílias Cyclopidae (*Macrocyclops* sp., *Mesocyclops* sp. e *Paracyclops* sp., com exceção da ocorrência da primeira espécie no Caiana durante o período chuvoso) e Diaptomidae (*Notodiaptomus* sp., ocorrendo apenas no Caiana no período seco e chuvoso). Estágios juvenis de náuplios e copepoditos ocorreram em ambos os riachos durante os dois períodos.

```
1 #REBIO23 - ESTRUTURA DA COMUNIDADE - PERÍODO SECO----
2 #####....-----
3
4 #Transpondo a matriz zoo_seco
5 zoo_seco
6 zoo_seco <- t(zoo_seco)
```

```

7  zoo_seco <- as.data.frame(zoo_seco)
8  zoo_seco[] <- lapply(zoo_seco, function(x) as.numeric(as.character(x)))
9  str(zoo_seco)
10 #View(zoo_seco)
11 zoo_seco
12 print(zoo_seco[1:5,1:5])
13 zoo_seco[1:5,1:5]
14 str(zoo_seco)
15 mode(zoo_seco)
16 class(zoo_seco)
17
18 #Informações básicas
19 range(zoo_seco) #menor e maior valores
20 length(zoo_seco) #no. de colunas
21 ncol(zoo_seco) #no. de N colunas
22 nrow(zoo_seco) #no. de M linhas
23 sum(lengths(zoo_seco)) #soma os nos. de colunas
24 length(as.matrix(zoo_seco)) #tamanho da matriz m x n
25 sum(zoo_seco == 0) #número de observações igual a zero
26 sum(zoo_seco > 0) #número de observações maiores que zero
27 #calculando a proporção de zeros na matriz
28 zeros <- (sum(zoo_seco == 0)/length(as.matrix(zoo_seco)))*100
29 zeros
30
31 #Descritores da diversidade
32 #?apply
33 Sum <- rowSums(zoo_seco)
34 #ou
35 Sum <- apply(zoo_seco,1,sum)
36 Sum
37 ## Abundância relativa (%)
38 RA <- (Sum / sum(Sum)) * 100 # percentage
39 ## Media
40 Mean <- rowMeans(zoo_seco)
41 Mean
42 ## Ou
43 Mean <- apply(zoo_seco,1,mean)
44 Mean
45 ## Desvio padrão
46 DP <- apply(zoo_seco,1,sd)
47 DP
48 ## Máximo
49 Max <- apply(zoo_seco,1,max)

```

```

50 Max
51 ## Mínimo
52 Min <- apply(zoo_seco,1,min)
53 Min
54 ## Mínimo não-zero
55 MinZ <- apply(zoo_seco, 1, function(row) {
56   non_zero_values <- row[row > 0] # Filter out zero values
57   if (length(non_zero_values) == 0) {
58     return(0) # If all values are zero, return 0
59   } else {
60     return(min(non_zero_values)) # Return the minimum of non-zero values
61   }
62 })
63 MinZ
64
65 #Riqueza
66 m_pa <- zoo_seco
67 m_pa[m_pa != 0] <- 1
68 rowSums(m_pa)
69 library(vegan)
70 bin <- decostand(zoo_seco,"pa")
71 bin[1:10, 1:10]
72 S <- apply(bin,1,sum)
73 S
74 #OU
75 Riqueza <- specnumber(zoo_seco)
76 Riqueza
77 Riqueza_total <- specnumber(colSums(zoo_seco))
78 Riqueza_total
79 #OU
80 FO <- rowSums(zoo_seco > 0) / ncol(zoo_seco) * 100
81 FO
82
83 #Índices de Diversidade
84 #Shannon
85 H <- diversity(zoo_seco, index = "shannon")
86 H
87
88 #Simpson
89 D <- diversity(zoo_seco, "simpson")
90 D
91 D[is.na(D)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
92 D

```

```

93
94 #Equitabilidade de Pielou
95 E <- H/log(specnumber(zoo_seco))
96 E
97 E[is.na(E)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
98 E
99
100 #Assimetria e curtose
101 library(moments)
102 Assimetria <- apply(zoo_seco,1,skewness)
103 Assimetria
104 Curtose <- apply(zoo_seco,1,kurtosis)
105 Curtose
106
107 #Tabela de Descritores
108 Descritores1 <- cbind(Sum, RA, Mean, DP, Max, Min, MinZ, FO, S, E, H, D)
109 Descritores1 <- as.data.frame(Descritores1)
110 Descritores1
111 #Descritores1 <- Descritores1 %>% rownames_to_column(var="Espécies") #da nome a primeira col.
112 SomaTotalD <- apply(Descritores1,2,sum)
113 SomaTotalD
114 MediaTotalD <- apply(Descritores1,2,mean)
115 MediaTotalD
116 DPTotalD <- apply(Descritores1,2,sd)
117 DPTotalD
118 Descritores2 <- cbind(SomaTotalD, MediaTotalD, DPTotalD)
119 Descritores2 <- as.data.frame(Descritores2)
120 Descritores2 <- t(Descritores2)
121 Descritores2
122 DescritoresFinal <- rbind(Descritores1, Descritores2)
123 DescritoresFinal
124 DescritoresFinal <- round (DescritoresFinal, 2)
125 DescritoresFinal
126 #Fazendo uma tabela
127 library(gt)
128 df_seco <- DescritoresFinal
129 ncol(df_seco); nrow(df_seco) #no. de N colunas x M linhas
130 df_seco <- cbind("Espécies" = rownames(df_seco), df_seco)
131 gt(df_seco, rowname_col = "Espécies", caption = "Descritores da diversidade por espécie (col.)")
132
133 #ARREDONDAR CASA DÉCIMAL
134 ncol(df_seco)
135 nrow(df_seco)

```

```

136 # Adicionar a coluna 'Pontos' com os nomes das linhas
137 #df <- cbind(SPP = rownames(df), df)
138 # Arredondar os valores para duas casas decimais
139 df_seco_arredondado <- df_seco %>%
140   mutate(across(where(is.numeric), ~ round(., 1)))
141 # Exibir a tabela arredondada com gt
142 gt(df_seco_arredondado, rowname_col = "Espécies", caption = "Descritores da diversidade por e

1 #REBIO23 - ESTRUTURA DA COMUNIDADE - PERÍODO CHUVOSO-----
2 #####....-----
3
4 #Transpondo a matriz zoo_chuvoso
5 zoo_chuvoso <- t(zoo_chuvoso)
6 zoo_chuvoso <- as.data.frame(zoo_chuvoso)
7 zoo_chuvoso[] <- lapply(zoo_chuvoso, function(x) as.numeric(as.character(x)))
8 str(zoo_chuvoso)
9 #View(zoo_chuvoso)
10 zoo_chuvoso
11 print(zoo_chuvoso[1:5,1:5])
12 zoo_chuvoso[1:5,1:5]
13 str(zoo_chuvoso)
14 mode(zoo_chuvoso)
15 class(zoo_chuvoso)
16
17 #Informações básicas
18 range(zoo_chuvoso) #menor e maior valores
19 length(zoo_chuvoso) #no. de colunas
20 ncol(zoo_chuvoso) #no. de N colunas
21 nrow(zoo_chuvoso) #no. de M linhas
22 sum(lengths(zoo_chuvoso)) #soma os nos. de colunas
23 length(as.matrix(zoo_chuvoso)) #tamanho da matriz m x n
24 sum(zoo_chuvoso == 0) #número de observações igual a zero
25 sum(zoo_chuvoso > 0) #número de observações maiores que zero
26 #calculando a proporção de zeros na matriz
27 zeros <- (sum(zoo_chuvoso == 0)/length(as.matrix(zoo_chuvoso)))*100
28 zeros
29
30 #####Descritores da diversidade
31 #?apply
32 Sum <- rowSums(zoo_chuvoso)
33 #ou
34 Sum <- apply(zoo_chuvoso,1,sum)
35 Sum

```

```

36  ## Abundância relativa (%)
37  RA <- (Sum / sum(Sum)) * 100 # percentage
38  ## Media
39  Mean <- rowMeans(zoo_chuvoso)
40  Mean
41  ## Ou
42  Mean <- apply(zoo_chuvoso,1,mean)
43  Mean
44  ## Desvio padrão
45  DP <- apply(zoo_chuvoso,1,sd)
46  DP
47  ## Máximo
48  Max <- apply(zoo_chuvoso,1,max)
49  Max
50  ## Mínimo
51  Min <- apply(zoo_chuvoso,1,min)
52  Min
53  ## Mínimo não-zero
54  MinZ <- apply(zoo_chuvoso, 1, function(row) {
55    non_zero_values <- row[row > 0] # Filter out zero values
56    if (length(non_zero_values) == 0) {
57      return(0) # If all values are zero, return 0
58    } else {
59      return(min(non_zero_values)) # Return the minimum of non-zero values
60    }
61  })
62  MinZ
63
64  #Riqueza
65  m_pa <- zoo_chuvoso
66  m_pa[m_pa != 0] <- 1
67  rowSums(m_pa)
68  library(vegan)
69  bin <- decostand(zoo_chuvoso,"pa")
70  bin[1:10, 1:10]
71  S <- apply(bin,1,sum)
72  S
73  #OU
74  Riqueza <- specnumber(zoo_chuvoso)
75  Riqueza
76  Riqueza_total <- specnumber(colSums(zoo_chuvoso))
77  Riqueza_total
78  #OU

```

```

79 FO <- rowSums(zoo_chuvoso > 0) / ncol(zoo_chuvoso) * 100
80 FO
81
82 #Índices de Diversidade
83 #Shannon
84 H <- diversity(zoo_chuvoso, index = "shannon")
85 H
86
87 #Simpson
88 D <- diversity(zoo_chuvoso, "simpson")
89 D
90 D[is.na(D)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
91 D
92
93 #Equitabilidade de Pielou
94 E <- H/log(specnumber(zoo_chuvoso))
95 E
96 E[is.na(E)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
97 E
98
99 #Assimetria e curtose
100 library(moments)
101 Assimetria <- apply(zoo_chuvoso,1,skewness)
102 Assimetria
103 Curtose <- apply(zoo_chuvoso,1,kurtosis)
104 Curtose
105
106 #Tabela de Descritores
107 Descritores1 <- cbind(Sum, RA, Mean, DP, Max, Min, MinZ, FO, S, E, H, D)
108 Descritores1 <- as.data.frame(Descritores1)
109 Descritores1
110 #Descritores1 <- Descritores1 %>% rownames_to_column(var="Espécies") #da nome a primeira col.
111 SomaTotalD <- apply(Descritores1,2,sum)
112 SomaTotalD
113 MediaTotalD <- apply(Descritores1,2,mean)
114 MediaTotalD
115 DPTotalD <- apply(Descritores1,2,sd)
116 DPTotalD
117 Descritores2 <- cbind(SomaTotalD, MediaTotalD, DPTotalD)
118 Descritores2 <- as.data.frame(Descritores2)
119 Descritores2 <- t(Descritores2)
120 Descritores2
121 DescritoresFinal <- rbind(Descritores1, Descritores2)

```

```

122 DescritoresFinal
123 DescritoresFinal <- round (DescritoresFinal, 2)
124 DescritoresFinal
125
126 ####Fazendo uma tabela
127 library(gt)
128 df_chuvoso <- DescritoresFinal
129 ncol(df_chuvoso); nrow(df_chuvoso) #no. de N colunas x M linhas
130 df_chuvoso <- cbind("Espécies" = rownames(df_chuvoso), df_chuvoso)
131 gt(df_chuvoso, rowname_col = "Espécies", caption = "Descritores da diversidade por espécie (")
132
133 #ARREDONDAR CASA DÉCIMAL
134 ncol(df_chuvoso)
135 nrow(df_chuvoso)
136 #Adicionar a coluna 'Pontos' com os nomes das linhas
137 #df <- cbind(SPP = rownames(df), df)
138 #Arredondar os valores para duas casas decimais
139 df_chuvoso_arredondado <- df_chuvoso %>%
140   mutate(across(where(is.numeric), ~ round(., 1)))
141 #Exibir a tabela arredondada com gt
142 gt(df_chuvoso_arredondado, rowname_col = "Espécies", caption = "Descritores da diversidade p

```

3.3 Partitioning of diversity

A análise dos dados, conduzida por meio de diagramas de Venn, revelou a distribuição da riqueza de espécies nos riachos Barro Branco e Caiana durante os períodos seco e chuvoso, destacando como diferentes espécies são compartilhadas e exclusivas entre estes ambientes.

No período seco, foram registradas 27 espécies compartilhadas entre os riachos. O Caiana apresentou alfa (α) diversidade de 46 espécies, destas, 19 eram espécies exclusivas, enquanto o Barro Branco apresentou α -diversidade de 39 espécies, com 12 espécies exclusivas. Considerando ambos os riachos, o patrimônio regional (γ) foi de 58 espécies.

No período chuvoso, o número de espécies compartilhadas permaneceu inalterado, com 27 espécies. Entretanto, observou-se uma redução na α -diversidade e no número de espécies exclusivas, bem como na diversidade gama. No Caiana, a α -diversidade foi de 34 espécies, com 7 espécies ocorrendo apenas neste riacho. No Barro Branco, registrou-se α -diversidade de 33 espécies, com 6 espécies exclusivas. A γ -diversidade total foi de 40 espécies.

De modo geral, os resultados indicam que o número de espécies exclusivas variou entre os períodos hidrológicos, embora grande parte da riqueza tenha sido compartilhada entre os riachos.

```

1  #REBIO23 - DIAGRAMA DE VENN, PERÍODO SECO ----
2  #####.....-----
3
4  m_bruta_seco <- m_trab
5
6  #Inserindo coluna para agrupamentos
7  ncol(m_bruta_seco); nrow(m_bruta_seco) #no. de N colunas x M linhas
8  m_bruta_seco_g <- cbind(Grupos = rownames(m_bruta_seco), m_bruta_seco)
9  # Mantém a tabela completa
10 m_bruta_seco_g <- cbind(Grupos = rownames(m_bruta_seco), m_bruta_seco)
11 m_bruta_seco_g <- as.data.frame(m_bruta_seco_g)
12
13 # Vetor de agrupamento
14 agrup1 <- substr(m_bruta_seco_g$Grupos, 1, 3)
15 agrup1
16
17 # Filtra apenas os grupos que começam com "S"
18 m_bruta_seco_g_s <- m_bruta_seco_g[startsWith(agrup1, "S"), ]
19 m_bruta_seco_g_s$Grupos <- agrup1[startsWith(agrup1, "S")] # ajusta a coluna Grupos
20 m_bruta_seco_g_s
21
22 # Agora pode calcular médias
23 library(dplyr)
24 m_avg_s <- m_bruta_seco_g_s %>%
25   group_by(Grupos) %>%
26   summarise(across(.cols = everything(), ~ mean(as.numeric(.x), na.rm = TRUE)))
27 m_avg_s <- as.data.frame(m_avg_s)
28 rownames(m_avg_s) <- m_avg_s$Grupos
29 m_avg_s$Grupos <- NULL
30 m_avg_s
31
32 #Salvando a matriz
33 write.table(m_avg_s,
34             "m_avgcsv.csv",
35             append = F,
36             quote = TRUE,
37             sep = ";", dec = ",",
38             row.names = T)
39 m_avg1_csv <- read.csv("m_avgcsv.csv",
40                       sep = ";", dec = ",",
41                       header = T,
42                       row.names = 1,
43                       na.strings = NA)

```

```

44 library("gt")
45 m_venn <- as.data.frame(t(m_avg_s))
46 m_venn
47 gt(round(m_venn, 2), rownames_to_stub = TRUE)
48 m_venn[m_venn != 0] <- 1 #matriz binária
49 m_venn
50
51 ##Salvar como .xlsx
52 library(openxlsx)
53 write.xlsx(m_venn, "venn_seco.xlsx", rowNames = TRUE)
54
55 ##Salvar tabela como gt
56 tabela_gt <- gt::gt(m_venn, rownames_to_stub = TRUE)
57 gtsave(tabela_gt, "gt-auspre-s_gtable.html")
58 gtsave(tabela_gt, "fig-auspre-s_gtable.png")
59 saveRDS(tabela_gt, "gt-auspre-s_gtable.rds")
60
61 ## Tabela final ajustada no Excel
62 library(readxl)
63 library(gt)
64 seco_df <- read_excel(
65   path = "venn_seco.xlsx",
66   sheet = "Sheet 1",
67   range = "A1:C59"
68 )
69 seco_gtable <- gt(seco_df) |>
70   cols_label(`...1` = "Espécies") |>
71   sub_missing(columns = everything(), missing_text = "")
72 seco_gtable
73 gtsave(seco_gtable, "gt-seco_gtable_xlsx.html")
74 saveRDS(seco_gtable, "gt-seco_gtable_xlsx.rds")
75
76 library("eulerr")
77 #set.seed() #this seed changes the orientation of the sets
78 plot(euler(m_venn), counts = TRUE, fontface = 1)
79 # Load required libraries
80 library(VennDiagram)
81 library(ggvenn)
82 SB <- rownames(m_venn)[which(m_venn$`S-B` == 1)]
83 SC <- rownames(m_venn)[which(m_venn$`S-C` == 1)]
84
85 overlap_SB_SC <- intersect(SB, SC)
86

```

```

87 #####Visualizar número de espécies em cada grupo e sobreposição
88 cat("Número de espécies S-B:", length(SB), "\n")
89 cat("Número de espécies S-C:", length(SC), "\n")
90 cat("Número de espécies em ambos (S-B S-C):", length(overlap_SB_SC), "\n")
91
92 #####Plotar
93 grid.newpage()
94 draw.pairwise.venn(
95   area1 = length(SB),
96   area2 = length(SC),
97   cross.area = length(overlap_SB_SC),
98   category = c("S-B", "S-C"),
99   lty = rep("blank", 2),
100  fill = c("grey40", "grey70"),
101  alpha = rep(0.5, 2),
102  cat.pos = c(0, 0),
103  cat.dist = rep(0.025, 2)
104 )
105
106 #####Salvar em PNG
107 venn.diagram(
108   x = list(SB, SC),
109   category.names = c("S-B", "S-C"),
110   filename = "fig-venn_SB_SC_seco.png",
111   height = 2000,
112   width = 2000,
113   resolution = 300,
114   lty = "blank",
115   fill = c("grey40", "grey70"),
116   alpha = 0.5
117 )

1  #REBIO23 - DIAGRAMA DE VENN, PERÍODO CHUVOSO ----
2  #####....----
3
4  m_bruta_chuvoso <- m_trab
5
6  #Inserindo coluna para agrupamentos
7  ncol(m_bruta_chuvoso); nrow(m_bruta_chuvoso) #no. de N colunas x M linhas
8  m_bruta_chuvoso_g <- cbind(Grupos = rownames(m_bruta_chuvoso), m_bruta_chuvoso)
9  # Mantém a tabela completa
10 m_bruta_chuvoso_g <- cbind(Grupos = rownames(m_bruta_chuvoso), m_bruta_chuvoso)
11 m_bruta_chuvoso_g <- as.data.frame(m_bruta_chuvoso_g)

```

```

12
13 #Vetor de agrupamento
14 agrup1 <- substr(m_bruta_chuvoso_g$Grupos, 1, 3)
15 agrup1
16
17 #Filtra apenas os grupos que começam com "C"
18 m_bruta_chuvoso_g_c <- m_bruta_chuvoso_g[startsWith(agrup1, "C"), ]
19 m_bruta_chuvoso_g_c$Grupos <- agrup1[startsWith(agrup1, "C")] # ajusta a coluna Grupos
20 m_bruta_chuvoso_g_c
21
22 #Médias
23 library(dplyr)
24 m_avg_c <- m_bruta_chuvoso_g_c %>%
25   group_by(Grupos) %>%
26   summarise(across(.cols = everything(), ~ mean(as.numeric(.x), na.rm = TRUE)))
27
28 m_avg_c <- as.data.frame(m_avg_c)
29 rownames(m_avg_c) <- m_avg_c$Grupos
30 m_avg_c$Grupos <- NULL
31 m_avg_c
32
33 ##Salvando a matriz
34 write.table(m_avg_c,
35             "m_avgcsv.csv",
36             append = F,
37             quote = TRUE,
38             sep = ";", dec = ",",
39             row.names = T)
40 m_avg1_csv <- read.csv("m_avgcsv.csv",
41                       sep = ";", dec = ",",
42                       header = T,
43                       row.names = 1,
44                       na.strings = NA)
45 library("gt")
46 m_venn <- as.data.frame(t(m_avg_c))
47 m_venn
48 gt(round(m_venn, 2), rownames_to_stub = TRUE)
49 m_venn[m_venn !=0] <- 1 #matriz binária
50 m_venn
51
52 ##Salvar como .xlsx
53 library(openxlsx)
54 write.xlsx(m_venn, "venn_chuvoso.xlsx", rowNames = TRUE)

```

```

55
56 ##Salvar tabela como gt
57 tabela_gt <- gt::gt(m_venn, rownames_to_stub = TRUE)
58 gtsave(tabela_gt, "gt-auspre-c_gtable.html")
59 gtsave(tabela_gt, "fig-auspre-c_gtable.png")
60 saveRDS(tabela_gt, "gt-auspre-c_gtable.rds")
61
62 ##Tabela final ajustada no Excel
63 library(readxl)
64 library(gt)
65 chuvoso_df <- read_excel(
66   path = "venn_chuvoso.xlsx",
67   sheet = "Sheet 1",
68   range = "A1:C59"
69 )
70 chuvoso_gtable <- gt(chuvoso_df) |>
71   cols_label(
72     `...1` = "Espécies"
73   )
74 chuvoso_gtable
75 gtsave(chuvoso_gtable, "gt-chuvoso_gtable.xlsx.html")
76 saveRDS(chuvoso_gtable, "gt-chuvoso_gtable.xlsx.rds")
77
78
79 library("eulerr")
80 #set.seed() #this seed changes the orientation of the sets
81 plot(euler(m_venn), counts = TRUE, fontface = 1)
82 # Load required libraries
83 library(VennDiagram)
84 library(ggvenn)
85 CB <- rownames(m_venn)[which(m_venn$`C-B` == 1)]
86 CC <- rownames(m_venn)[which(m_venn$`C-C` == 1)]
87
88 overlap_CB_CC <- intersect(CB, CC)
89
90 ####Visualizar número de espécies em cada grupo e sobreposição
91 cat("Número de espécies C-B:", length(CB), "\n")
92 cat("Número de espécies C-C:", length(CC), "\n")
93 cat("Número de espécies em ambos (C-B C-C):", length(overlap_CB_CC), "\n")
94
95 #Plotar
96 grid.newpage()
97 draw.pairwise.venn(

```

```

98   area1 = length(CB),
99   area2 = length(CC),
100  cross.area = length(overlap_CB_CC),
101  category = c("C-B", "C-C"),
102  lty = rep("blank", 2),
103  fill = c("grey40", "grey70"),
104  alpha = rep(0.5, 2),
105  cat.pos = c(0, 0),
106  cat.dist = rep(0.025, 2)
107 )
108
109 #Salvar em PNG
110 venn.diagram(
111   x = list(CB, CC),
112   category.names = c("C-B", "C-C"),
113   filename = "fig-venn_CB_CC_chuvoso.png",
114   height = 2000,
115   width = 2000,
116   resolution = 300,
117   lty = "blank",
118   fill = c("grey40", "grey70"),
119   alpha = 0.5
120 )

```

3.4 Additive partition

Os valores observados representam a proporção percentual da diversidade zooplanctônica registrada no presente estudo, enquanto os valores esperados correspondem à proporção estimada a partir de amostras aleatórias contendo maior riqueza de espécies do que a amostra observada. Utilizou-se o método de partição aditiva, com base nas médias do componente alfa (α), para realização das comparações entre habitats, pontos de amostragem e riachos (Tabela 2 e Figura 5 e 6). Assim, a variação total da diversidade zooplanctônica (diversidade gama) foi decomposta em diversidade alfa (α) e beta (β). A diversidade total (γ) foi assumida como constante e igual a 1,00 em todas as comparações.

A tabela e figuras (Figuras 5A, 5B e 5C e Figuras 6A, 6B e 6C) abordam duas escalas espaciais: uma maior, englobando ambos os riachos Caiana e Barro Branco, e uma menor, que se refere a apenas um dos riachos, seja Barro Branco ou Caiana separadamente.

Período seco

Em uma escala mais ampla, considerando ambos os riachos, a diversidade alfa (α) observada entre os riachos Barro Branco e Caiana foi significativamente menor e diferente (0,12%) do que

o esperado (0,19%; $P < 0,999$).

A diversidade observada entre os habitats (1) foi de 0,10%, tendo um valor menor do que o esperado (0,15%; $P < 0,999$). Contudo, a respeito da diversidade entre todos os pontos (2), a riqueza observada (0,51%) é ligeiramente similar à esperada (0,50%), com um valor de significância $P = 0,477$. Entre os riachos Barro Branco e Caiana (3), o valor observado (0,27%) foi maior do que o esperado (0,16%), com valor de significância $P = 0,001$.

A -diversidade observada no riacho Barro Branco foi significativamente menor e diferente (0,20%) do esperado (0,27%; $P < 0,999$). O mesmo acontece na diversidade entre os habitats (1), com 0,15% de diversidade observada ($P < 0,999$). Entretanto, a diversidade entre os pontos (2) foi significativamente maior (0,65%) que o esperado (0,53%; $P = 0,001$).

No Caiana, a diversidade estimada no componente alfa foi menor do que o esperado (0,22%), com apenas 0,15% observada ($P < 0,999$). Em 1, foi observado 0,12%, sendo significativamente inferior ao esperado (0,16%; $P < 0,999$), tendo em vista que o valor esperado era de 0,16% ($P < 0,999$). Em 2, o observado foi de 0,73%, maior do que o valor esperado de 0,61% ($P = 0,001$).

```
1 library(tibble); library(tidyverse); library(forcats); library(openxlsx); library(Rcpp); lib
2
3 m_part_seco <- zoo_seco
4
5 #ler matriz escalas_seco
6
7 escalas_seco <- zoo <- read.xlsx("C:/Users/ellen/Downloads/Manuscritos/rebio23-part/dados/re
8                               rowNames = T, colNames = T,
9                               sheet = "escalas_seco")
10
11 #rebio
12 colnames(escalas_seco)
13 escala.total_seco <- escalas_seco[, c("rebio.habitat", "rebio.ponto", "rebio.rio", "rebio")]
14 head(escala.total_seco)
15 dim(escala.total_seco)
16
17 #matriz - escala bb
18 escala.bb_seco <- escalas_seco[, c("bb.habitat", "bb.ponto", "barrobranco")]
19 head(escala.bb_seco)
20 dim(escala.bb_seco)
21
22 #matriz - escala ca
23 escala.ca_seco <- escalas_seco[, c("ca.habitat", "ca.ponto", "caiana")]
24 head(escala.ca_seco)
25 dim(escala.ca_seco)
```

```

26
27 #ler matriz fauna total
28 fauna.zoo_seco <- m_part_seco
29 fauna.zoo_seco[] <- lapply(fauna.zoo_seco, function(x) as.numeric(as.character(x)))
30 fauna.zoo_seco <- t(fauna.zoo_seco)
31 head(fauna.zoo_seco)
32 ncol(fauna.zoo_seco)
33 dim(fauna.zoo_seco)
34 #view(fauna.zoo_seco)
35
36 #Fauna - bb
37 fauna.zoo.bb_seco <- fauna.zoo_seco[1:18,]
38 head(fauna.zoo.bb_seco)
39 ncol(fauna.zoo.bb_seco)
40 dim(fauna.zoo.bb_seco)
41
42 #Fauna - ca
43 fauna.zoo.ca_seco <- fauna.zoo_seco[19:45,]
44 head(fauna.zoo.ca_seco)
45 ncol(fauna.zoo.ca_seco)
46 dim(fauna.zoo.ca_seco)

1 #REBIO23 - PARTIÇÃO ADITIVA - PERÍODO SECO----
2 #####....----
3
4 #COMANDO
5 #PARTIÇÃO GERAL
6
7 #adipart(fauna,env, index="richness", relative=TRUE,
8 #         weights="unif",nsimul=999)
9
10 #Fauna total
11 library(vegan)
12 #part.geral_seco<-adipart(y=fauna.zoo_seco,x=escala.total_seco, index="richness", relative=F
13 #         weights="unif",nsimul=999)
14 #part.geral_seco
15 #EM PORCENTAGEM
16 part.geral_seco<-adipart(y=fauna.zoo_seco,x=escala.total_seco, index="richness", relative=TR
17         weights="unif",nsimul=999)
18 part.geral_seco
19 str(part.geral_seco)
20
21 #####

```

```

22 # Extrair valores do objeto part.geral_seco
23 statistic <- part.geral_seco$statistic
24 SES <- part.geral_seco$oecosimu$z
25 mean <- part.geral_seco$oecosimu$means
26 lower_2.5 <- apply(part.geral_seco$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.025)
27 median_50 <- apply(part.geral_seco$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.50)
28 upper_97.5 <- apply(part.geral_seco$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.975)
29 Pr_sim <- part.geral_seco$oecosimu$pval
30
31 # Definir função para adicionar significância
32 get_significance <- function(p) {
33   if (p <= 0.001) {
34     return("****")
35   } else if (p <= 0.01) {
36     return("***")
37   } else if (p <= 0.05) {
38     return("**")
39   } else if (p <= 0.1) {
40     return(".")
41   } else {
42     return(" ")
43   }
44 }
45 significance <- sapply(Pr_sim, get_significance)
46
47 # Criar dataframe com todas as informações
48 diversity_data_seco <- data.frame(
49   Component = names(statistic),
50   Observed = round(statistic, 2),
51   SES = round(SES, 2),
52   Mean = round(mean, 2),
53   Lower_2.5 = round(lower_2.5, 2),
54   Median_50 = round(median_50, 2),
55   Upper_97.5 = round(upper_97.5, 2),
56   Pr_sim = Pr_sim,
57   Sign = significance
58 )
59
60 # Exibir a tabela
61 library(gt)
62 print(diversity_data_seco)
63 str(part.geral_seco)
64 gt(diversity_data_seco)

```

```

65
66 ##Salvar como .xlsx
67 library(openxlsx)
68 write.xlsx(diversity_data_seco, "diversity_data_seco.xlsx", rowNames = TRUE)
69
70 ##Salvar tabela como gt
71 tabela_gt <- gt::gt(diversity_data_seco, rownames_to_stub = FALSE)
72 tabela_gt
73 gtsave(tabela_gt, "gt-adip-riac_s_gtable.html")
74 gtsave(tabela_gt, "fig-adip-riac_s_gtable.png")
75 saveRDS(tabela_gt, "gt-adip-riac_s_gtable.rds")
76
77 # Tabela final ajustada no Excel
78 library(readxl)
79 adip_riac_s_gtable <- read_excel(
80   path = "diversity_data_seco.xlsx",
81   sheet = "Sheet 1",
82   range = "A1:J8")
83 # remover coluna ...1
84 adip_riac_s_gtable <- adip_riac_s_gtable[, -1]
85 adip_riac_s_gtable
86 library(gt)
87 adip_riac_s_gtable <- gt(adip_riac_s_gtable)
88 adip_riac_s_gtable <- sub_missing(adip_riac_s_gtable,
89                                   columns = everything(), missing_text = "")
90 #adip_riac_s_gtable <- fmt_number(adip_riac_s_gtable, columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
91 adip_riac_s_gtable
92 gtsave(adip_riac_s_gtable, "gt_adip-riac_s_gtable_xlsx.html")
93 saveRDS(adip_riac_s_gtable, "gt_adip-riac_s_gtable_xlsx.rds")
94
95 #####
96 # Criar dataframe com valores observados e esperados
97 observed_values <- part.geral_seco$statistic
98 observed_values
99 expected_values <- part.geral_seco$oecosimu$means
100 expected_values
101 # Combine observed and expected values into a dataframe
102 df <- data.frame(
103   Componente = names(observed_values), # Use names from observed_values
104   Type = rep(c("Esperado", "Observado"), each = length(observed_values)),
105   Value = c(expected_values, observed_values)
106 )
107 df$Type <- factor(df$Type, levels = c("Esperado", "Observado"))

```

```

108 df
109 df_filtered <- df[!df$Componente %in% c("alpha.2", "alpha.3", "gamma"), ]
110 df_filtered$Componente <- factor(df_filtered$Componente,
111                                 levels = c("beta.3", "beta.2", "beta.1", "alpha.1"))
112 df_filtered
113
114 diversity_data_seco <- df_filtered
115 diversity_data_seco
116 # Calcular porcentagens para cada componente
117 diversity_data_seco <- diversity_data_seco %>%
118   group_by(Type) %>%
119   mutate(Percentage = Value / sum(Value) * 100)
120
121 # Carregar pacotes necessários
122 library(ggplot2)
123 library(dplyr)
124
125 # Criar o gráfico
126 ggplot(diversity_data_seco, aes(fill = Componente, y = Percentage, x = Type)) +
127   geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
128   labs(title = "A) Riachos - Período Seco",
129        y = "Total da diversidade (%)",
130        x = "") +
131   scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
132                                "beta.1" = "darkgray",
133                                "beta.2" = "gray",
134                                "beta.3" = "lightgray")) +
135
136   scale_y_continuous(limits = c(0,100), breaks = seq(0, 100, by = 10)) + # Aqui você ajusta
137   theme_minimal() +
138   theme(
139     axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
140     panel.grid = element_blank()
141   )
142
143 #hier <- hiersimu(y=fauna.zoo_seco,x=escala.total_seco, FUN=diversity)
144 #hier
145
146 #####
147 #PARTIÇÃO BARRO BRANCO
148
149 #Fauna total
150 library(vegan)

```

```

151 #part.geral_seco<-adipart(y=fauna.zoo_seco,x=escala.total_seco, index="richness", relative=F
152 #                               weights="unif",nsimul=999)
153 #part.geral_seco
154 #EM PORCENTAGEM
155 part.bb_seco<-adipart(y=fauna.zoo.bb_seco,x=escala.bb_seco, index="richness", relative=TRUE,
156                       weights="unif",nsimul=999)
157 part.bb_seco
158 str(part.bb_seco)
159
160 #####
161 # Extrair valores do objeto part.bb_seco
162 statistic <- part.bb_seco$statistic
163 SES <- part.bb_seco$oecosimu$z
164 mean <- part.bb_seco$oecosimu$means
165 lower_2.5 <- apply(part.bb_seco$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.025)
166 median_50 <- apply(part.bb_seco$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.50)
167 upper_97.5 <- apply(part.bb_seco$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.975)
168 Pr_sim <- part.bb_seco$oecosimu$pval
169
170 # Definir função para adicionar significância
171 get_significance <- function(p) {
172   if (p <= 0.001) {
173     return("****")
174   } else if (p <= 0.01) {
175     return("***")
176   } else if (p <= 0.05) {
177     return("**")
178   } else if (p <= 0.1) {
179     return(".")
180   } else {
181     return(" ")
182   }
183 }
184 significance <- sapply(Pr_sim, get_significance)
185
186 # Criar dataframe com todas as informações
187 diversity_data_seco.bb <- data.frame(
188   Component = names(statistic),
189   Observed = round(statistic, 2),
190   SES = round(SES, 2),
191   Mean = round(mean, 2),
192   Lower_2.5 = round(lower_2.5, 2),
193   Median_50 = round(median_50, 2),

```

```

194   Upper_97.5 = round(upper_97.5, 2),
195   Pr_sim = Pr_sim,
196   Sign = significance
197 )
198
199 # Exibir a tabela
200 library(gt)
201 print(diversity_data_seco.bb)
202 str(part.bb_seco)
203 gt(diversity_data_seco.bb)
204
205
206 ##Salvar como .xlsx
207 library(openxlsx)
208 write.xlsx(diversity_data_seco.bb, "diversity_data_seco.bb.xlsx", rowNames = TRUE)
209
210 ##Salvar tabela como gt
211 tabela_gt <- gt::gt(diversity_data_seco.bb, rownames_to_stub = FALSE)
212 tabela_gt
213 gtsave(tabela_gt, "gt-adip-bb_s_gtable.html")
214 gtsave(tabela_gt, "fig-adip-bb_s_gtable.png")
215 saveRDS(tabela_gt, "gt-adip-bb_s_gtable.rds")
216
217 # Tabela final ajustada no Excel
218 library(readxl)
219 adip_bb_s_gtable <- read_excel(
220   path = "diversity_data_seco.bb.xlsx",
221   sheet = "Sheet 1",
222   range = "A1:J6")
223 # remover coluna ...1
224 adip_bb_s_gtable <- adip_bb_s_gtable[, -1]
225 adip_bb_s_gtable
226 library(gt)
227 adip_bb_s_gtable <- gt(adip_bb_s_gtable)
228 adip_bb_s_gtable <- sub_missing(adip_bb_s_gtable,
229                                columns = everything(), missing_text = "")
230 #adip_bb_s_gtable <- fmt_number(adip_bb_s_gtable, columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
231 adip_bb_s_gtable
232 gtsave(adip_bb_s_gtable, "gt_adip-bb_s_gtable_xlsx.html")
233 saveRDS(adip_bb_s_gtable, "gt_adip-bb_s_gtable_xlsx.rds")
234
235 #####
236 # Criar dataframe com valores observados e esperados

```

```

237 observed_values <- part.bb_seco$statistic
238 observed_values
239 expected_values <- part.bb_seco$oecosimu$means
240 expected_values
241 # Combine observed and expected values into a dataframe
242 df.bb <- data.frame(
243   Componente = names(observed_values), # Use names from observed_values
244   Type = rep(c("Esperado", "Observado"), each = length(observed_values)),
245   Value = c(expected_values, observed_values)
246 )
247 df.bb$Type <- factor(df.bb$Type, levels = c("Esperado", "Observado"))
248 df.bb
249
250 df_filtered.bb <- df.bb[!df.bb$Componente %in% c("alpha.2", "alpha.3", "gamma", "beta.3"), ]
251 df_filtered.bb$Componente <- factor(df_filtered.bb$Componente,
252                                   levels = c("beta.2", "beta.1", "alpha.1"))
253 df_filtered.bb
254
255 diversity_data_seco.bb <- df_filtered.bb
256 diversity_data_seco.bb
257 # Calcular porcentagens para cada componente
258 diversity_data_seco.bb <- diversity_data_seco.bb %>%
259   group_by(Type) %>%
260   mutate(Percentage = Value / sum(Value) * 100)
261
262 # Carregar pacotes necessários
263 library(ggplot2)
264 library(dplyr)
265
266 # Criar o gráfico
267 ggplot(diversity_data_seco.bb, aes(fill = Componente, y = Percentage, x = Type)) +
268   geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
269   labs(title = "B) Barro Branco - Período Seco",
270        y = "Total da diversidade (%)",
271        x = "") +
272   scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
273                                "beta.1" = "darkgray",
274                                "beta.2" = "gray")) +
275   scale_y_continuous(limits = c(0,100), breaks = seq(0, 100, by = 10)) + # Aqui você ajusta o
276   theme_minimal() +
277   theme(
278     axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
279     panel.grid = element_blank()

```

```

280   )
281
282   #hier <- hiersimu(y=fauna.zoo.bb_seco,x=escala.bb_seco, FUN=diversity)
283   #hier
284
285   #####
286   #PARTIÇÃO CAIANA
287
288   #adipart(fauna,env, index="richness", relative=TRUE,
289   #        weights="unif",nsimul=999)
290
291   #Fauna total
292   library(vegan)
293   #part.geral_seco<-adipart(y=fauna.zoo_seco,x=escala.total_seco, index="richness", relative=TRUE,
294   #                          weights="unif",nsimul=999)
295   #part.geral_seco
296   #EM PORCENTAGEM
297   part.ca_seco<-adipart(y=fauna.zoo.ca_seco,x=escala.ca_seco, index="richness", relative=TRUE,
298   #                      weights="unif",nsimul=999)
299   part.ca_seco
300   str(part.ca_seco)
301
302   #####
303   # Extrair valores do objeto part.ca_seco
304   statistic <- part.ca_seco$statistic
305   SES <- part.ca_seco$oeocosimu$z
306   mean <- part.ca_seco$oeocosimu$means
307   lower_2.5 <- apply(part.ca_seco$oeocosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.025)
308   median_50 <- apply(part.ca_seco$oeocosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.50)
309   upper_97.5 <- apply(part.ca_seco$oeocosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.975)
310   Pr_sim <- part.ca_seco$oeocosimu$pval
311
312   # Definir função para adicionar significância
313   get_significance <- function(p) {
314     if (p <= 0.001) {
315       return("****")
316     } else if (p <= 0.01) {
317       return("**")
318     } else if (p <= 0.05) {
319       return("*")
320     } else if (p <= 0.1) {
321       return(".")
322     } else {

```

```

323     return(" ")
324   }
325 }
326 significance <- sapply(Pr_sim, get_significance)
327
328 # Criar dataframe com todas as informações
329 diversity_data_seco.ca <- data.frame(
330   Component = names(statistic),
331   Observed = round(statistic, 2),
332   SES = round(SES, 2),
333   Mean = round(mean, 2),
334   Lower_2.5 = round(lower_2.5, 2),
335   Median_50 = round(median_50, 2),
336   Upper_97.5 = round(upper_97.5, 2),
337   Pr_sim = Pr_sim,
338   Sign = significance
339 )
340
341 # Exibir a tabela
342 library(gt)
343 print(diversity_data_seco.ca)
344 str(part.ca_seco)
345 gt(diversity_data_seco.ca)
346
347 ##Salvar como .xlsx
348 library(openxlsx)
349 write.xlsx(diversity_data_seco.bb, "diversity_data_seco.ca.xlsx", rowNames = TRUE)
350
351 ##Salvar tabela como gt
352 tabela_gt <- gt::gt(diversity_data_seco.ca, rownames_to_stub = FALSE)
353 tabela_gt
354 gtsave(tabela_gt, "gt-adip-ca_s_gtable.html")
355 gtsave(tabela_gt, "fig-adip-ca_s_gtable.png")
356 saveRDS(tabela_gt, "gt-adip-ca_s_gtable.rds")
357
358 # Tabela final ajustada no Excel
359 library(readxl)
360 adip_ca_s_gtable <- read_excel(
361   path = "diversity_data_seco.ca.xlsx",
362   sheet = "Sheet 1",
363   range = "A1:J6")
364 # remover coluna ...1
365 adip_ca_s_gtable <- adip_ca_s_gtable[, -1]

```

```

366 adip_ca_s_gtable
367 library(gt)
368 adip_ca_s_gtable <- gt(adip_ca_s_gtable)
369 adip_ca_s_gtable <- sub_missing(adip_ca_s_gtable,
370                                columns = everything(), missing_text = "")
371 #adip_bb_s_gtable <- fmt_number(adip_ca_s_gtable, columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
372 adip_ca_s_gtable
373 gtsave(adip_ca_s_gtable, "gt_adip-ca_s_gtable_xlsx.html")
374 saveRDS(adip_ca_s_gtable, "gt_adip-ca_s_gtable_xlsx.rds")
375
376 #####
377 # Criar dataframe com valores observados e esperados
378 observed_values <- part.ca_seco$statistic
379 observed_values
380 expected_values <- part.ca_seco$oecosimu$means
381 expected_values
382 # Combine observed and expected values into a dataframe
383 df.ca <- data.frame(
384   Componente = names(observed_values), # Use names from observed_values
385   Type = rep(c("Esperado", "Observado"), each = length(observed_values)),
386   Value = c(expected_values, observed_values)
387 )
388 df.ca$Type <- factor(df.ca$Type, levels = c("Esperado", "Observado"))
389 df.ca
390
391 df_filtered.ca <- df.ca[!df.ca$Componente %in% c("alpha.2", "alpha.3", "gamma", "beta.3"), ]
392 df_filtered.ca$Componente <- factor(df_filtered.ca$Componente,
393                                   levels = c("beta.2", "beta.1", "alpha.1"))
394 df_filtered.ca
395
396 diversity_data_seco.ca <- df_filtered.ca
397 diversity_data_seco.ca
398 # Calcular porcentagens para cada componente
399 diversity_data_seco.ca <- diversity_data_seco.ca %>%
400   group_by(Type) %>%
401   mutate(Percentage = Value / sum(Value) * 100)
402
403 # Carregar pacotes necessários
404 library(ggplot2)
405 library(dplyr)
406
407 # Criar o gráfico
408 ggplot(diversity_data_seco.ca, aes(fill = Componente, y = Percentage, x = Type)) +

```

```

409   geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
410   labs(title = "C) Caiana - Período Seco",
411        y = "Total da diversidade (%)",
412        x = "") +
413   scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
414                                "beta.1" = "darkgray",
415                                "beta.2" = "gray")) +
416   scale_y_continuous(limits = c(0,100), breaks = seq(0, 100, by = 10)) + # Aqui você ajusta
417   theme_minimal() +
418   theme(
419     axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
420     panel.grid = element_blank()
421   )
422
423   #hier <- hiersimu(y=fauna.zoo.ca_seco,x=escala.ca_seco, FUN=diversity)
424   #hier

```

Período chuvoso

No período chuvoso, considerando ambos os riachos, a diversidade α apresentou valor observado de 0,24%, inferior ao esperado (0,52%; $P < 0,999$). A diversidade β_1 apresentou valor observado de 0,12%, inferior ao valor esperado (0,18%; $P < 0,999$).

A diversidade β_2 observada (0,48%) foi superior ao esperado (0,27%), com nível de significância $P = 0,001$. Foi observada em β_3 uma diversidade acima (0,16%) do esperado (0,04%; $P = 0,001$).

No Barro Branco, a α -diversidade observada foi de 0,24%, abaixo do esperado (0,44%; $P < 0,999$). Sua diversidade entre habitats apresentou valor observado de 0,13%, inferior ao esperado (0,18%; $P = 0,003$). Entre os pontos, o valor observado (0,63%) foi superior ao esperado (0,38%; $P = 0,001$).

O Caiana também demonstrou α -diversidade observada (0,31%) abaixo do esperado (0,62%; $P < 0,999$). Entre habitats, a diversidade observada era de 0,15%, quando o esperado era de 0,18% ($P = 0,007$). Contudo, seu β_2 foi acima do esperado ($P = 0,001$), com valor observado (0,55%) superior ao esperado (0,21%).

Diversidades com significância P menor que 0,999 indicam que a diversidade observada é relativamente comum ou não é rara se comparada ao que seria esperado. Vale ressaltar que em todas as comparações, o valor da diversidade gama (γ) não muda, sendo assim, é assumido o valor de 1,00.

```

1   library(tibble); library(tidyverse); library(forcats); library(openxlsx); library(Rcpp); lib
2
3   m_part_chuvoso <- zoo_chuvoso
4
5   #ler matriz escalas_chuvoso

```

```

6
7 escalas_chuvoso <- zoo <- read.xlsx("C:/Users/ellen/Downloads/Manuscritos/rebio23-part/dados,
8                                     rowNames = T, colNames = T,
9                                     sheet = "escalas_chuvoso")
10
11 #rebio
12 colnames(escalas_chuvoso)
13 escala.total_chuvoso <- escalas_chuvoso[, c("rebio.habitat","rebio.ponto", "rebio.rio", "rebio.
14 head(escala.total_chuvoso)
15 dim(escala.total_chuvoso)
16
17 #matriz - escala bb
18 escala.bb_chuvoso <- escalas_chuvoso[, c("bb.habitat","bb.ponto","barrobranco")]
19 head(escala.bb_chuvoso)
20 dim(escala.bb_chuvoso)
21
22 #matriz - escala ca
23 escala.ca_chuvoso <- escalas_chuvoso[, c("ca.habitat","ca.ponto","caiana")]
24 head(escala.ca_chuvoso)
25 dim(escala.ca_chuvoso)
26
27 #ler matriz fauna total
28 fauna.zoo_chuvoso <- m_part_chuvoso
29 fauna.zoo_chuvoso[] <- lapply(fauna.zoo_chuvoso, function(x) as.numeric(as.character(x)))
30 head(fauna.zoo_chuvoso)
31 ncol(fauna.zoo_chuvoso)
32 dim(fauna.zoo_chuvoso)
33 #view(fauna.zoo_chuvoso)
34
35 #Fauna - bb
36 fauna.zoo.bb_chuvoso <- fauna.zoo_chuvoso[1:18,]
37 head(fauna.zoo.bb_chuvoso)
38 ncol(fauna.zoo.bb_chuvoso)
39 dim(fauna.zoo.bb_chuvoso)
40
41 #Fauna - ca
42 fauna.zoo.ca_chuvoso <- fauna.zoo_chuvoso[19:45,]
43 head(fauna.zoo.ca_chuvoso)
44 ncol(fauna.zoo.ca_chuvoso)
45 dim(fauna.zoo.ca_chuvoso)
46
47 ##REBIO23 - PARTIÇÃO ADITIVA - PERÍODO CHUVOSO----
48 #####....----

```

```

3
4  #COMANDO
5  #PARTIÇÃO GERAL
6
7  #adipart(fauna,env, index="richness", relative=TRUE,
8  #        weights="unif",nsimul=999)
9
10 #Fauna total
11 library(vegan)
12 #part.geral_chuvoso<-adipart(y=fauna.zoo_chuvoso,x=escala.total_chuvoso, index="richness", r
13 #        weights="unif",nsimul=999)
14 #part.geral_chuvoso
15 #EM PORCENTAGEM
16 part.geral_chuvoso<-adipart(y=fauna.zoo_chuvoso,x=escala.total_chuvoso, index="richness", rel
17 #        weights="unif",nsimul=999)
18 part.geral_chuvoso
19 str(part.geral_chuvoso)
20
21 #####
22 # Extrair valores do objeto part.geral_chuvoso
23 statistic <- part.geral_chuvoso$statistic
24 SES <- part.geral_chuvoso$oecosimu$z
25 mean <- part.geral_chuvoso$oecosimu$means
26 lower_2.5 <- apply(part.geral_chuvoso$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.025)
27 median_50 <- apply(part.geral_chuvoso$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.50)
28 upper_97.5 <- apply(part.geral_chuvoso$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.975)
29 Pr_sim <- part.geral_chuvoso$oecosimu$pval
30
31 # Definir função para adicionar significância
32 get_significance <- function(p) {
33   if (p <= 0.001) {
34     return("****")
35   } else if (p <= 0.01) {
36     return("**")
37   } else if (p <= 0.05) {
38     return("*")
39   } else if (p <= 0.1) {
40     return(".")
41   } else {
42     return(" ")
43   }
44 }
45 significance <- sapply(Pr_sim, get_significance)

```

```

46
47 # Criar dataframe com todas as informações
48 diversity_data_chuvoso <- data.frame(
49   Component = names(statistic),
50   Observed = round(statistic, 2),
51   SES = round(SES, 2),
52   Mean = round(mean, 2),
53   Lower_2.5 = round(lower_2.5, 2),
54   Median_50 = round(median_50, 2),
55   Upper_97.5 = round(upper_97.5, 2),
56   Pr_sim = Pr_sim,
57   Sign = significance
58 )
59
60 # Exibir a tabela
61 library(gt)
62 print(diversity_data_chuvoso)
63 str(part.geral_chuvoso)
64 gt(diversity_data_chuvoso)
65
66 #####
67 # Criar dataframe com valores observados e esperados
68 observed_values <- part.geral_chuvoso$statistic
69 observed_values
70 expected_values <- part.geral_chuvoso$oeocosimu$means
71 expected_values
72 # Combine observed and expected values into a dataframe
73 df <- data.frame(
74   Componente = names(observed_values), # Use names from observed_values
75   Type = rep(c("Esperado", "Observado"), each = length(observed_values)),
76   Value = c(expected_values, observed_values)
77 )
78 df$Type <- factor(df$Type, levels = c("Esperado", "Observado"))
79 df
80 df_filtered <- df[!df$Componente %in% c("alpha.2", "alpha.3", "gamma"), ]
81 df_filtered$Componente <- factor(df_filtered$Componente,
82                                levels = c("beta.3", "beta.2", "beta.1", "alpha.1"))
83 df_filtered
84
85 diversity_data_chuvoso <- df_filtered
86 diversity_data_chuvoso
87 # Calcular porcentagens para cada componente
88 diversity_data_chuvoso <- diversity_data_chuvoso %>%

```

```

89   group_by(Type) %>%
90   mutate(Percentage = Value / sum(Value) * 100)
91
92   # Carregar pacotes necessários
93   library(ggplot2)
94   library(dplyr)
95
96   # Criar o gráfico
97   ggplot(diversity_data_chuvoso, aes(fill = Componente, y = Percentage, x = Type)) +
98   geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
99   labs(title = "A) Riachos - Período Chuvoso",
100        y = "Total da diversidade (%)",
101        x = "") +
102   scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
103                                "beta.1" = "darkgray",
104                                "beta.2" = "gray",
105                                "beta.3" = "lightgray")) +
106
107   scale_y_continuous(limits = c(0,100), breaks = seq(0, 100, by = 10)) + # Aqui você ajusta o
108   theme_minimal() +
109   theme(
110     axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
111     panel.grid = element_blank()
112   )
113
114   #hier <- hiersimu(y=fauna.zoo_chuvoso,x=escala.total_chuvoso, FUN=diversity)
115   #hier
116
117   #####
118   #PARTIÇÃO BARRO BRANCO
119
120   #Fauna total
121   library(vegan)
122   #part.geral_chuvoso<-adipart(y=fauna.zoo_chuvoso,x=escala.total_chuvoso, index="richness", r
123   #                               weights="unif",nsimul=999)
124   #part.geral_chuvoso
125   #EM PORCENTAGEM
126   part.bb_chuvoso<-adipart(y=fauna.zoo.bb_chuvoso,x=escala.bb_chuvoso, index="richness", relat
127   weights="unif",nsimul=999)
128   part.bb_chuvoso
129   str(part.bb_chuvoso)
130
131   #####

```

```

132 # Extrair valores do objeto part.bb_chuvoso
133 statistic <- part.bb_chuvoso$statistic
134 SES <- part.bb_chuvoso$oecosimu$z
135 mean <- part.bb_chuvoso$oecosimu$means
136 lower_2.5 <- apply(part.bb_chuvoso$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.025)
137 median_50 <- apply(part.bb_chuvoso$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.50)
138 upper_97.5 <- apply(part.bb_chuvoso$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.975)
139 Pr_sim <- part.bb_chuvoso$oecosimu$pval
140
141 # Definir função para adicionar significância
142 get_significance <- function(p) {
143   if (p <= 0.001) {
144     return("****")
145   } else if (p <= 0.01) {
146     return("***")
147   } else if (p <= 0.05) {
148     return("**")
149   } else if (p <= 0.1) {
150     return(".")
151   } else {
152     return(" ")
153   }
154 }
155 significance <- sapply(Pr_sim, get_significance)
156
157 # Criar dataframe com todas as informações
158 diversity_data_chuvoso.bb <- data.frame(
159   Component = names(statistic),
160   Observed = round(statistic, 2),
161   SES = round(SES, 2),
162   Mean = round(mean, 2),
163   Lower_2.5 = round(lower_2.5, 2),
164   Median_50 = round(median_50, 2),
165   Upper_97.5 = round(upper_97.5, 2),
166   Pr_sim = Pr_sim,
167   Sign = significance
168 )
169
170 # Exibir a tabela
171 library(gt)
172 print(diversity_data_chuvoso.bb)
173 str(part.bb_chuvoso)
174 gt(diversity_data_chuvoso.bb)

```

```

175
176 #####
177 # Criar dataframe com valores observados e esperados
178 observed_values <- part.bb_chuvoso$statistic
179 observed_values
180 expected_values <- part.bb_chuvoso$oecosimu$means
181 expected_values
182 # Combine observed and expected values into a dataframe
183 df.bb <- data.frame(
184   Componente = names(observed_values), # Use names from observed_values
185   Type = rep(c("Esperado", "Observado"), each = length(observed_values)),
186   Value = c(expected_values, observed_values)
187 )
188 df.bb$Type <- factor(df.bb$Type, levels = c("Esperado", "Observado"))
189 df.bb
190
191 df_filtered.bb <- df.bb[!df.bb$Componente %in% c("alpha.2", "alpha.3", "gamma", "beta.3"), ]
192 df_filtered.bb$Componente <- factor(df_filtered.bb$Componente,
193                                   levels = c("beta.2", "beta.1", "alpha.1"))
194 df_filtered.bb
195
196 diversity_data_chuvoso.bb <- df_filtered.bb
197 diversity_data_chuvoso.bb
198 # Calcular porcentagens para cada componente
199 diversity_data_chuvoso.bb <- diversity_data_chuvoso.bb %>%
200   group_by(Type) %>%
201   mutate(Percentage = Value / sum(Value) * 100)
202
203 # Carregar pacotes necessários
204 library(ggplot2)
205 library(dplyr)
206
207 # Criar o gráfico
208 ggplot(diversity_data_chuvoso.bb, aes(fill = Componente, y = Percentage, x = Type)) +
209   geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
210   labs(title = "B) Barro Branco - Período chuvoso",
211        y = "Total da diversidade (%)",
212        x = "") +
213   scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
214                                "beta.1" = "darkgray",
215                                "beta.2" = "gray")) +
216   scale_y_continuous(limits = c(0,100), breaks = seq(0, 100, by = 10)) + # Aqui você ajusta
217   theme_minimal() +

```

```

218   theme(
219     axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
220     panel.grid = element_blank()
221   )
222
223   #hier <- hiersimu(y=fauna.zoo.bb_chuvoso,x=escala.bb_chuvoso, FUN=diversity)
224   #hier
225
226   #####
227   #PARTIÇÃO CAIANA
228
229   #adipart(fauna,env, index="richness", relative=TRUE,
230   #       weights="unif",nsimul=999)
231
232   #Fauna total
233   library(vegan)
234   #part.geral_chuvoso<-adipart(y=fauna.zoo_chuvoso,x=escala.total_chuvoso, index="richness", r
235   #       weights="unif",nsimul=999)
236   #part.geral_chuvoso
237   #EM PORCENTAGEM
238   part.ca_chuvoso<-adipart(y=fauna.zoo.ca_chuvoso,x=escala.ca_chuvoso, index="richness", relat
239   weights="unif",nsimul=999)
240   part.ca_chuvoso
241   str(part.ca_chuvoso)
242
243   #####
244   # Extrair valores do objeto part.ca_chuvoso
245   statistic <- part.ca_chuvoso$statistic
246   SES <- part.ca_chuvoso$oecosimu$z
247   mean <- part.ca_chuvoso$oecosimu$means
248   lower_2.5 <- apply(part.ca_chuvoso$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.025)
249   median_50 <- apply(part.ca_chuvoso$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.50)
250   upper_97.5 <- apply(part.ca_chuvoso$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.975)
251   Pr_sim <- part.ca_chuvoso$oecosimu$pval
252
253   # Definir função para adicionar significância
254   get_significance <- function(p) {
255     if (p <= 0.001) {
256       return("***")
257     } else if (p <= 0.01) {
258       return("**")
259     } else if (p <= 0.05) {
260       return("*")

```

```

261   } else if (p <= 0.1) {
262     return(".")
263   } else {
264     return(" ")
265   }
266 }
267 significance <- sapply(Pr_sim, get_significance)
268
269 # Criar dataframe com todas as informações
270 diversity_data_chuvoso.ca <- data.frame(
271   Component = names(statistic),
272   Observed = round(statistic, 2),
273   SES = round(SES, 2),
274   Mean = round(mean, 2),
275   Lower_2.5 = round(lower_2.5, 2),
276   Median_50 = round(median_50, 2),
277   Upper_97.5 = round(upper_97.5, 2),
278   Pr_sim = Pr_sim,
279   Sign = significance
280 )
281
282 # Exibir a tabela
283 library(gt)
284 print(diversity_data_chuvoso.ca)
285 str(part.ca_chuvoso)
286 gt(diversity_data_chuvoso.ca)
287
288 #####
289 # Criar dataframe com valores observados e esperados
290 observed_values <- part.ca_chuvoso$statistic
291 observed_values
292 expected_values <- part.ca_chuvoso$oeocosimu$means
293 expected_values
294 # Combine observed and expected values into a dataframe
295 df.ca <- data.frame(
296   Componente = names(observed_values), # Use names from observed_values
297   Type = rep(c("Esperado", "Observado"), each = length(observed_values)),
298   Value = c(expected_values, observed_values)
299 )
300 df.ca$Type <- factor(df.ca$Type, levels = c("Esperado", "Observado"))
301 df.ca
302
303 df_filtered.ca <- df.ca[!df.ca$Componente %in% c("alpha.2", "alpha.3", "gamma", "beta.3"), ]

```

```

304 df_filtered.ca$Componente <- factor(df_filtered.ca$Componente,
305                                     levels = c("beta.2", "beta.1", "alpha.1"))
306 df_filtered.ca
307
308 diversity_data_chuvoso.ca <- df_filtered.ca
309 diversity_data_chuvoso.ca
310 # Calcular porcentagens para cada componente
311 diversity_data_chuvoso.ca <- diversity_data_chuvoso.ca %>%
312   group_by(Type) %>%
313   mutate(Percentage = Value / sum(Value) * 100)
314
315 # Carregar pacotes necessários
316 library(ggplot2)
317 library(dplyr)
318
319 # Criar o gráfico
320 ggplot(diversity_data_chuvoso.ca, aes(fill = Componente, y = Percentage, x = Type)) +
321   geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
322   labs(title = "C) Caiana - Período chuvoso",
323        y = "Total da diversidade (%)",
324        x = "") +
325   scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
326                                "beta.1" = "darkgray",
327                                "beta.2" = "gray")) +
328   scale_y_continuous(limits = c(0,100), breaks = seq(0, 100, by = 10)) + # Aqui você ajusta
329   theme_minimal() +
330   theme(
331     axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
332     panel.grid = element_blank()
333   )
334
335 #hier <- hiersimu(y=fauna.zoo.ca_chuvoso,x=escala.ca_chuvoso, FUN=diversity)
336 #hier

```

3.5 Multiplicative partition

Assim como na aplicação da partição aditiva, os valores obtidos representam a proporção percentual da diversidade zooplânctônica registrada no presente estudo, enquanto os valores esperados correspondem à proporção estimada a partir de amostras aleatórias contendo maior riqueza de espécies do que a amostra observada.

A tabela 3 aborda duas escalas espaciais: uma maior, englobando ambos os riachos Caiana e

Barro Branco, e uma menor, que se refere a apenas um dos riachos separadamente, seja Barro Branco ou Caiana.

Período seco

Considerando ambos os riachos (Tabela 3) a unidade de amostragem, apresentou valor observado (2,94%) inferior ao esperado (4,84%; $P=0,999$). Em contraste, os componentes α -diversidade apresentaram valores observados superiores ao esperado ($P=0,001$). A diversidade entre habitats (H_1) foi de 2,05%, quando o esperado era de 1,24%. Entre pontos (H_2), a diversidade observada foi de 1,92%, quando o esperado era de 1,11%, entre riachos (H_3), foi observado 1,18%, superior ao esperado (1,00%). A contribuição para a diversidade total (H) foi de 6,04%

Em relação ao riacho Barro Branco (Tabela 3), o α observado (2,75%) foi inferior ao que era esperado (3,56%; $P<0,999$). Seus betas observados foram maiores que o esperado ($P=0,001$), em que o componente β_1 obteve o valor de 1,50% e o componente β_2 atingiu 1,39%. Sua diversidade gama foi de 4,13%.

A α -diversidade observada no Caiana (Tabela 3) foi de 3,08%, quando o esperado era que fosse 4,89% ($P<0,999$). Assim como no Barro Branco, as α -diversidades observadas foram maiores que o esperado ($P=0,001$), tendo em vista que β_1 foi de 1,97% e β_2 apresentou valores de 1,85%. O patrimônio regional de espécies atingiu o valor de 6,08%.

```

1  #REBIO23 - PARTIÇÃO MULTIPLICATIVA - PERÍODO SECO----
2  #####....----
3
4  #PARTIÇÃO GERAL
5  #multipart.geral_seco <- multipart(y = fauna.zoo_seco, x = escala.total_seco, index = "renyi",
6  #                                     scales = 1, global = FALSE, relative = FALSE,
7  #                                     weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
8
9  #multipart.geral_seco
10
11
12  #EM PERCENTAGEM
13  part.geral_seco <- multipart(y = fauna.zoo_seco, x = escala.total_seco, index = "renyi",
14  #                             scales = 1, global = TRUE, relative = FALSE,
15  #                             weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
16
17  part.geral_seco
18
19  #####
20  #PARTIÇÃO BARRO BRANCO
21
22  #MULTIPART
23  #multipart.bb_seco <- multipart(y = fauna.zoo.bb_seco, x = escala.bb_seco, index = "renyi",

```

```

24 #                                     scales = 1, global = FALSE, relative = FALSE,
25 #                                     weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
26
27 #multipart.bb_seco
28
29
30 #EM PERCENTAGEM
31 part.bb_seco <- multipart(y = fauna.zoo.bb_seco, x = escala.bb_seco, index = "renyi",
32                           scales = 1, global = TRUE, relative = FALSE,
33                           weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
34
35 part.bb_seco
36
37 #####
38 #PARTIÇÃO CAIANA
39
40 #MULTIPART
41 #multipart.ca_seco <- multipart(y = fauna.zoo.ca_seco, x = escala.ca_seco, index = "renyi",
42 #                               scales = 1, global = FALSE, relative = FALSE,
43 #                               weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
44
45 #multipart.ca_seco
46
47
48 #EM PERCENTAGEM
49 part.ca_seco <- multipart(y = fauna.zoo.ca_seco, x = escala.ca_seco, index = "renyi",
50                           scales = 1, global = TRUE, relative = FALSE,
51                           weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
52
53 part.ca_seco

```

Período chuvoso

A -diversidade observada em ambos os riachos (Tabela 3) foi de 3,56%, sendo inferior significativamente ao esperado (9,29%; $P < 0,999$). Mesmo no período chuvoso, suas -diversidades atingiram valores acima do esperado. $_1$ apresentou 2,96% do esperado (1,13%; $P = 0,001$), $_2$ obteve um valor observado de 2,52%, acima do esperado (1,04%; $P = 0,001$), já em $_3$, foi observada uma diversidade de 1,11% acima do esperado (1,00%; $P = 0,001$). A -diversidade total foi de 10,55.

No Barro Branco (Tabela 3), a -diversidade observada (2,64%) foi inferior ao esperado (6,65%; $P < 0,999$). $_1$ obteve diversidade observada de 2,68% ($P = 0,001$). A diversidade observada em $_2$ foi de 2,18% ($P = 0,001$). -diversidade obteve valor de 7,23%.

O Caiana (Tabela 3) apresentou -diversidade observada (4,14%) superior ao esperado (10,25%; $P < 0,999$). A diversidade observada em ₁ foi de 2,80%, valor superior ao esperado (1,13%; $P = 0,001$). ₂ apresentou 2,44% superior ao esperado (1,04%; $P = 0,001$). A contribuição de -diversidade foi de 11,62%.

```

1  #REBIO23 - PARTIÇÃO MULTIPLICATIVA - PERÍODO CHUVOSO----
2  #####....-----
3
4  #COMANDO
5  #PARTIÇÃO GERAL
6  #multipart.geral_chuvoso <- multipart(y = fauna.zoo_chuvoso, x = escala.total_chuvoso, index = "renyi",
7  #                                     scales = 1, global = FALSE, relative = FALSE,
8  #                                     weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
9
10 #multipart.geral_chuvoso
11
12
13 #EM PERCENTAGEM
14 part.geral_chuvoso <- multipart(y = fauna.zoo_chuvoso, x = escala.total_chuvoso, index = "renyi",
15                                scales = 1, global = TRUE, relative = FALSE,
16                                weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
17
18 part.geral_chuvoso
19
20 #####
21 #PARTIÇÃO BARRO BRANCO
22
23 #MULTIPART
24 #multipart.bb_chuvoso <- multipart(y = fauna.zoo.bb_chuvoso, x = escala.bb_chuvoso, index = "renyi",
25 #                                  scales = 1, global = FALSE, relative = FALSE,
26 #                                  weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
27
28 #multipart.bb_chuvoso
29
30
31 #EM PERCENTAGEM
32 part.bb_chuvoso <- multipart(y = fauna.zoo.bb_chuvoso, x = escala.bb_chuvoso, index = "renyi",
33                              scales = 1, global = TRUE, relative = FALSE,
34                              weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
35
36 part.bb_chuvoso
37
38 #####

```

```

39 #PARTIÇÃO CAIANA
40
41 #MULTIPART
42 #multipart.ca_chuvoso <- multipart(y = fauna.zoo.ca_chuvoso, x = escala.ca_chuvoso, index =
43 #                               scales = 1, global = FALSE, relative = FALSE,
44 #                               weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
45
46 #multipart.ca_chuvoso
47
48
49 #EM PERCENTAGEM
50 part.ca_chuvoso <- multipart(y = fauna.zoo.ca_chuvoso, x = escala.ca_chuvoso, index = "renyi
51                               scales = 1, global = TRUE, relative = FALSE,
52                               weights = "unif", nsimul = 999, method = "r2dtable")
53
54 part.ca_chuvoso

```

4 Discussion

Os habitats de ambientes de água doce estão entre os ecossistemas mais modificados do planeta, seja em função de atividades antrópicas, como o despejo inadequado de efluentes, a destruição e a degradação de habitat, ou pela introdução de espécies exóticas (Altındağ & Berdi, 2025; Marcelino et al., 2025; Pinto et al., 2006; M. R. F. D. Silva et al., 2020). Neste contexto, torna-se essencial compreender e avaliar como a estrutura do habitat influencia a diversidade e composição da fauna de organismos aquáticos, como o zooplâncton, grupo conhecido como bioindicador de processos de poluição e eutrofização, uma vez que são essenciais para os serviços ecossistêmicos de ambientes de água doce (Marcelino et al., 2025; Santos et al., 2025).

Segundo Cottenie (2005) e Gomes et al. (2020), fatores ambientais e espaciais desempenham um papel central na estruturação das comunidades biológicas, especialmente em ecossistemas aquáticos. Em sistemas hidrológicos abertos, como riachos, córregos e grandes rios, o fluxo contínuo de água, desde a nascente até a foz, provoca turbulência e movimentação de partículas em suspensão (Schäfer, 1985; Wetzel & Likens, 2000), influenciando na composição e distribuição das comunidades biológicas. Variáveis como temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, transparência, condutividade, profundidade e largura, além de outras características associadas à complexidade do habitat, são apontadas como de grande importância para a estrutura da comunidade zooplânctônica (A. M. A. Silva et al., 2009; Sousa et al., 2008; Vieira et al., 2009; Wetzel, 2001).

Os resultados obtidos através da PCA evidenciaram uma clara diferenciação entre as UAs. O padrão apresentado pelo Barro Branco no período seco, especialmente aqueles localizados no interior da reserva (P05 e P07), apresentou maior associação com estruturas como liteira

e algas filamentosas e aderidas. Este padrão pode estar relacionado à menor variabilidade hidrológica característica desse período, favorecendo a estabilidade de estruturas (Allan et al., 2021; Allan & Castillo, 2007). Além disso, a baixa vazão permite que estruturas subaquáticas e marginais favorecem tanto a captura de alimentos quanto o fornecimento de refúgio para os organismos, auxiliando na permanência em determinadas áreas da coluna d'água (ESTEVES, 2011). A vegetação ciliar adiciona diversidade de estruturas subaquáticas e marginais, criando micro-habitats que podem ser colonizados por diversas espécies de zooplâncton (Cyr & Downing, 1988; Margalef, 1983; E. S. F. Medeiros et al., 2008).

Ainda no período seco, algumas unidades, tanto do Barro Branco quanto do Caiana, estiveram associadas a variáveis como profundidade e largura, presença de pedras e vegetação submersa. Estas características, além do fluxo da água, são fatores determinantes para a caracterização de ambientes lóticos (Allan & Castillo, 2007; Bonecker et al., 1998; FULONE, 2008). Observou-se que os dados de profundidade e largura de ambos os riachos apresentaram variações reduzidas, como o esperado para riachos de primeira ordem, de acordo com a classificação de Strahler (1952).

A associação de algumas UAs ao pH, que variou entre ácido à levemente neutro, também merece destaque. Segundo (Duré et al., 2021), o pH é um fator que pode influenciar a comunidade zooplanctônica, uma vez que algumas espécies são mais sensíveis às suas variações, impactando a composição e o funcionamento da comunidade.

No período chuvoso, a PCA revelou o rearranjo das UAs, o que evidenciou a influência da precipitação sobre a estrutura do habitat. Unidades do Barro Branco e do Caiana apresentaram associação à presença de lama, macrófitas, vegetação submersa, folhigo e detritos, indicando um aumento na entrada e no transporte de material alóctone. A precipitação pode influenciar diretamente o transporte e a introdução de materiais alóctones em ecossistemas aquáticos (Granjeiro et al., 2024), promovendo a heterogeneidade ambiental e criando condições favoráveis à ocorrência de organismos como o zooplâncton.

A influência da vegetação ripária foi evidente no Barro Branco, especialmente nas UAs localizadas no interior da reserva. Beltrão et al. (2009) e E. S. F. Medeiros et al. (2008) apontam que elementos relacionados à vegetação ripária podem influenciar na estrutura do habitat, visto que favorece as comunidades aquáticas presentes nesses ecossistemas. É a vegetação ripária a responsável por adicionar diversidade de estruturas subaquáticas e marginais, criando micro-habitats que podem ser colonizados por diversas espécies de zooplâncton (Cyr & Downing, 1988; Margalef, 1983; E. S. F. Medeiros et al., 2008). Sua remoção pode intensificar a erosão e a sedimentação, além de reduzir a disponibilidade de sombra ao longo do curso d'água.

As estruturas submersas e marginais desempenham papel fundamental na captura de alimento e no fornecimento de refúgio, auxiliando na permanência dos organismos em áreas específicas da coluna d'água (ESTEVES, 2011). Dessa forma, é visto que as variações hidrológicas influenciaram a estrutura do habitat e disponibilidade de recursos.

O grupo de maior representatividade taxonômica em todas as unidades amostrais foi Rotifera, o que está de acordo com estudos realizados em ambientes de água doce, nos quais este grupo

se destaca por sua abundância e diversidade (Vls. Almeida et al., 2009; BARBOSA, 2018; Cabral et al., 2020; Larson et al., 2007; Majeed et al., 2023). Os Rotifera são frequentemente associados à alta fecundidade, reprodução partenogênica e rápidas taxas de crescimento, aspectos que contribuem para seu caráter cosmopolitas (Pourriot et al., 1997). A alimentação desses organismos é baseada em pequenas partículas, como detritos orgânicos, algas e bactérias. Estas características os tornam organismos r-estrategistas (oportunistas), com capacidade de sobreviverem a ambientes instáveis (ALLAN, 1976; Araújo & Nogueira, 2017; Dantas-Silva & Dantas, 2013; Fernández et al., 2024).

Neste estudo, a família de maior representatividade em relação ao número total de espécies foi Lecanidae, corroborando com diversos estudos sobre a composição da comunidade zooplancônica em ambientes de água doce (Fernández et al., 2024; Joko et al., 2008). Além disso, diversas pesquisas apontam essa família como a mais representativa em ambientes lóticos e lênticos (AGGIO, 2015; Melo, 2011; Oliveira, 2009; Vieira et al., 2009). De acordo com V. L. D. S. Almeida et al. (2006), os representantes dessa família estão associados principalmente ao bento e perifíton, especialmente em locais ricos em vegetação, ocorrendo no plâncton apenas como migrantes ocasionais.

A ocorrência de Bdelloidea em todas as UAs é consistente com a literatura, que destaca a adaptabilidade desses organismos a diferentes condições ambientais, bem como ao seu hábito bentônico (ESTEVES, 1998; Ricci, 2001). A ampla ocorrência da espécie *Lecane bulla* também está de acordo com os estudos de Davidson (2012), que destacam sua capacidade de se adaptar a variações na qualidade da água e na estrutura do habitat.

Em relação aos Cladocera, a família Chydoridae apresentou a maior riqueza de espécies, padrão observado em trabalhos realizados por COSTA, (2018); Miranda (2018) e Santos-Wisniewski et al. (2002). Este táxon é composto por organismos associados à vegetação ciliar e a regiões mais profundas de corpos d'água. Sua alimentação ocorre por meio da raspagem ou filtração de partículas de alimentos (FRYER, 1968; Fryer, 1974; Santos-Wisniewski et al., 2002; Smirnov, 1998). Segundo Soares & Elmoor-Loureiro (2011), sua presença está frequentemente associada a bancos de macrófitas.

Entre os Copepoda, a única espécie de Calanoida detectada neste estudo foi *Notodiaptomus* sp., presente exclusivamente no Caiana. Estudos realizados por COSTA, (2018); S. F. Lima (2022) e Melo (2011) corroboram com este padrão, uma vez que encontraram apenas um exemplar da família Diaptomidae. Estágios juvenis de náuplios e copepoditos estiveram presentes em ambos os riachos. Segundo Czerniawski (2013); Czerniawski & Domagała (2010) e Lair (2005), estágios juvenis são frequentemente encontrados em rios e riachos.

Em resumo, os resultados sobre ausência e presença deixam claro como o fator de seca e chuva corroboram para a composição e manutenção de espécies da comunidade zooplancônica, uma vez que ocorre a substituição das mesmas ao longo das unidades amostrais de ambos os riachos.

A utilização da partição da diversidade é uma ferramenta fundamental para compreender como a diversidade se distribui em diferentes escalas espaciais, permitindo avaliar a variabilidade

de espécies (Magurran, 2021). De acordo com Crist et al. (2003), os padrões de diversidade de espécies podem variar em escalas espaciais e temporais, refletindo os processos ecológicos que atuam sobre as comunidades. Nesse sentido, a sazonalidade hidrológica atua como um dos principais fatores temporais capazes de influenciar a estrutura das comunidades aquáticas de ecossistemas lóticos.

A partição da diversidade está diretamente associada à α -diversidade, que expressa o grau de similaridade entre comunidades e permite estimar a diversidade total de espécies em uma região maior através de amostras menores (Lande, 1996; Oksanen et al., 2020). A diversidade beta pode refletir dois fenômenos: aninhamento (*nestedness*) e a substituição de espécies (*turnover*) (Baselga, 2010; FREIRY, 2019). O aninhamento ocorre quando a composição de espécies em locais com menor riqueza tende a ser um subconjunto de locais mais ricos, resultando na perda de espécies não aleatórias. Por outro lado, o turnover consiste na troca da composição de espécies por outras ao longo de gradientes espaciais e temporais (Baselga, 2010, 2012; Fleishman et al., 2017). É importante ressaltar que uma comunidade pode ser estruturada por ambos os processos, que variam entre diferentes grupos taxonômicos (Baselga, 2012). Contudo, tais fenômenos não foram estimados através de estatísticas específicas no presente estudo.

Os padrões espaciais e temporais influenciam a diversidade de espécies e têm sido classificados como capazes de atuar em escalas locais ou regionais (Lopes & Caliman, 2008). Logo, os diagramas de Venn permitiram avaliar indiretamente a influência da sazonalidade sobre a distribuição de espécies nos riachos Barro Branco e Caiana. No período seco, registrou-se maior riqueza total, com 58 espécies, além de um número elevado de espécies exclusivas, especialmente no Caiana. Em contrapartida, no período chuvoso houve uma redução na α -diversidade e no número de espécies exclusivas, embora o número de espécies compartilhadas tenha se mantido constante.

A redução na α -diversidade e β -diversidade no período chuvoso pode estar atrelada às alterações na sazonalidade climática, como o aumento da vazão, maior instabilidade no habitat e transporte de organismo ao longo dos riachos.

De acordo com Lande (1996), a partição aditiva da diversidade propõe uma medida natural de similaridade entre várias comunidades, ou seja, a proporção da diversidade total encontrada dentro das comunidades. Em uma escala espacial mais ampla, considerando os riachos como um conjunto, a diversidade alfa (α) observada variou significativamente, sendo visivelmente inferior à diversidade esperada nos períodos seco e chuvoso. Embora o Caiana tenha apresentado maior riqueza local de espécies quando se comparado ao Barro Branco, a partição aditiva revelou que a proporção local foi menor do que o esperado. Logo, valores reduzidos de α indicam menor contribuição para a diversidade regional do que seria o esperado. Segundo (Heino, 2011), em ambientes de água doce, a diversidade local é frequentemente limitada por fatores regionais, como dispersão e conectividade entre habitats, que podem reduzir o peso do componente α .

A diversidade beta entre habitats (β_1) também apresentou valores observados inferiores aos esperados em ambos os períodos, indicando que os habitats compartilham uma parte significativa

da sua composição zooplanctônica. Isto pode estar ligado à homogeneidade estrutural dos habitats ou à capacidade de dispersão do zooplâncton (Grönroos et al., 2013).

Em contrapartida, a diversidade entre os pontos de amostragem (α_2) apresentou valores observados semelhantes ou superiores aos esperados, especialmente no período chuvoso. Este resultado indica que, em uma escala local, há contribuição significativa entre os pontos para a diversidade total. Melo et al. (2009) e Fleishman et al. (2017) citam que a α -diversidade em escalas locais tem associação à heterogeneidade ambiental, à variação de micro-habitats e às diferenças nas condições físico e químicas da água.

Já a diversidade entre os riachos (α_3) apresentou valores observados significativamente acima do esperado nos períodos seco e chuvoso. Este padrão sugere que processos regionais, como limitações de dispersão, diferenças ambientais e perturbação, possuem um importante papel na estruturação das comunidades (Poorter et al., 2023).

Quando os riachos foram analisados separadamente, tanto o Barro Branco quanto o Caiana obtiveram baixa α -diversidade observada. Entretanto, a diversidade entre pontos (α_2) no Barro Branco foi superior à esperada. Este padrão pode estar associado à heterogeneidade ambiental ao longo do riacho, dispersão, escala espacial e características que os organismos apresentam ao ambiente em que estão inseridos, fatores reconhecidos como determinantes da α -diversidade em ambientes lóticos (Heino et al., 2013; Heino et al., 2015). O Caiana apresentou alta contribuição de α_2 nos dois períodos, contudo, α_3 no período chuvoso também apresentou alto valor observado, sugerindo que a α -diversidade é sustentada, em especial, pela substituição de espécies. Logo, mesmo em riachos que tenham alta riqueza, sua diversidade pode estar associada a processos espaciais e variação ambiental local (Súarez & Lima-Junior, 2009).

A utilização da partição aditiva permitiu diferenciar a influência causada pelos períodos seco e chuvoso sobre a comunidade zooplanctônica. Sendo assim, é possível afirmar que o período chuvoso intensifica a heterogeneidade ambiental espacial e promove diferenciação entre os pontos amostrais e riachos devido ao aumento do nível da água, levando à velocidade da corrente, alterando as características físicas e químicas da água e facilitando o transporte de organismos ao longo dos corpos d'água (Boyer et al., 2009; Heino, 2011).

Em riachos tropicais, a variabilidade hidrológica é reconhecida como um dos fatores capazes de atuar sobre a estrutura das comunidades aquáticas, pois ela influencia a disponibilidade de recursos e os processos ecológicos (Boyer et al., 2009; Golec-Fialek et al., 2021; Picapedra et al., 2021).

A partição multiplicativa carece de estudos mais aprofundados, tornando-a pouco utilizada devido a sua complexidade de interpretação e, por isto, a partição aditiva se torna mais usual em estudos sobre a influência de processos locais e regionais em comunidades. Ainda assim, esta abordagem permite avaliar os padrões de diversidade no que se refere à contribuição dos componentes alfa e beta para a diversidade regional, tornando-se útil para analisar a estrutura de comunidades em múltiplas escalas espaciais (Jost, 2007; Tuomisto, 2010).

De acordo com Shurin et al. (2000), a diversidade de zooplâncton é influenciada por processos locais e regionais, com a limitação pela dispersão sendo mais evidente em escalas geográficas maiores. Neste contexto, os resultados obtidos através da aplicação da partição multiplicativa indicaram que em ambos os períodos, a α -diversidade observada foi consistentemente inferior à esperada em ambas as áreas de estudo, sejam elas em conjunto ou separadamente. Em contraste, todos os componentes β -diversidade (β_1 , β_2 e β_3) entre os riachos e somente no Caiana e Barro Branco apresentaram valores superiores ao esperado nos períodos seco e chuvoso, indicando que há uma significativa variação na composição de espécies entre habitats (β_1), pontos (β_2) e, em uma escala maior, entre riachos (β_3).

Tendo em vista que α -diversidade (diversidade local ou dentro de um habitat) e β -diversidade (diversidade entre habitats ou comunidades) devem ser livres para variar independentemente, um valor alto do componente alfa não deve, por si só, tornar o valor do componente beta alto (ou baixo) e vice-versa. Sendo assim, uma alta diversidade beta pode ocorrer mesmo se cada habitat refletir uma baixa α -diversidade (Jost, 2007; C. R. Medeiros et al., 2021).

De modo geral, os resultados indicam que a diversidade zooplanctônica dos riachos Barro Branco e Caiana é influenciada por processos espaciais que atuam em escalas intermediárias e regionais, tendo sido evidenciado pelos valores elevados de β -diversidade. Esses padrões reforçam a importância de um ambiente heterogêneo e a influência da sazonalidade como fatores determinantes para a manutenção da diversidade regional.

Conclusions

O presente estudo revelou que a diversidade zooplanctônica nos riachos Barro Branco e Caiana é estruturada principalmente por processos locais e regionais, estes que variam de acordo com a escala espacial e sazonalidade climática. A aplicação conjunta dos métodos de partição aditiva e multiplicativa permitiu a compreensão da organização da diversidade, demonstrando que valores baixos de α -diversidade contribuem para as diversidades beta e gama.

De modo geral, mesmo sob a influência das condições ambientais e de conservação, os riachos sustentam um patrimônio regional de espécies, evidenciando a importância da heterogeneidade ambiental para a conservação de processos biológicos essenciais para a biodiversidade zooplanctônica. Estes resultados contribuem para o entendimento dos padrões de diversidade em riachos tropicais, evidenciando o zooplâncton como organismo sensível às variações espaciais e temporais e, ainda, a necessidade de conservação de riachos de Floresta Atlântica para a manutenção da biodiversidade.

Acknowledgements

We are greatly indebted to the staff of the REBIO Guaribas for field work assistance. LCA is grateful to Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPGEC-UEPB) and CAPES for scholarship granted. EGS, MMSM and MVBS are grateful to Programa de Iniciação Científica (PIBIC-UEPB) and CNPq for scholarship granted.

Authorship contribution statement

Authorship of this paper is based on CRediT (2026).

Ellen Gomes da Silva: Data curation, Formal analysis, Investigation, Software, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing.

Mayara Mirelly da Silva Monteiro: Data curation, Formal analysis, Software.

Marcela Vitória Bernardo da Silva: Writing – original draft, Writing – review & editing.

Ludmilla Cavalcanti Antunes Lucena: Writing – review & editing.

Thais Xavier de Melo: Supervision.

Elvio Sergio Figueredo Medeiros: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Funding Acquisition, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation.

Ethical approval

O presente trabalho teve duração de um ano e foi desenvolvido no laboratório de Ecologia (LABECO) do Campus V da UEPB. A coleta dos organismos foi realizada na Reserva Biológica Guaribas (REBIO Guaribas) de acordo com as licenças de coleta MMA/ICMBIO/SISBIO Número: 89415-1 e Número: 89429-2 (com datas de emissão de 04/07/2023 e 04/08/2023, respectivamente) e aprovação no 048/2023 da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UEPB (com data de emissão de 06/02/2023).

5 Declaração sobre o uso de inteligência artificial generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de preparação do manuscrito

Durante a preparação deste manuscrito, os autores utilizaram o ChatGPT (OpenAI) para auxiliar na revisão do idioma inglês e no aprimoramento da clareza e da fluência da redação. Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada para análise ou interpretação dos dados, nem para a

elaboração de conclusões científicas. Os autores revisaram e avaliaram cuidadosamente todas as sugestões geradas por IA e assumem total responsabilidade pela precisão e pelo conteúdo da versão final do manuscrito (CNPq, 2026).

References

- AGGIO, C. E. G. (2015). *Influência de macro-fatores na estruturação da comunidade zooplanc-tônica em riachos subtropicais* [PhD thesis].
- ALLAN, J. D. (1976). Life History Patterns in Zooplankton. *Artigo*, 165–180.
- Allan, J. D., & Castillo, M. M. (2007). *Stream ecology*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5583-6>
- Allan, J. D., Castillo, M. M., & Capps, K. A. (2021). *Stream ecology: Structure and function of running waters*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-61286-3>
- Almeida, V. L. D. S., Larrazábal, M. E. L. D., Moura, A. D. N., & Melo Júnior, M. D. (2006). Rotifera das zonas limnética e litorânea do reservatório de tapacurá, pernambuco, brasil. *Iheringia. Série Zoologia*, 96(4), 445–451. <https://doi.org/10.1590/S0073-47212006000400009>
- Almeida, Vls., Dantas, Êw., Melo-Júnior, M., Bittencourt-Oliveira, Mc., & Moura, An. (2009). Zooplanktonic community of six reservoirs in northeast brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 69(1), 57–65. <https://doi.org/10.1590/S1519-69842009000100007>
- Altındağ, A., & Berdi, D. (2025). Rising temperatures, changing waters: The influence of abiotic factors on freshwater zooplankton community. *Desalination and Water Treatment*, 321, 100991. <https://doi.org/10.1016/j.dwt.2025.100991>
- Araújo, A. P., & Nogueira, E. M. S. (2017). *Zooplâncton como Bioindicador das Águas do Reservatório Natural do Povoado Olhos D'Água do Souza, Glória, Bahia, Brasil*. 6, 001–016. <https://doi.org/10.59360/ouricuri.vol6.i2.a3168>
- Ávila, A. C., Stenert, C., & Maltchik, L. (2011). Partitioning macroinvertebrate diversity across different spatial scales in southern brazil coastal wetlands. *Wetlands*, 31(3), 459–469. <https://doi.org/10.1007/s13157-011-0178-3>
- Balkić, A. G., Pfeiffer, T. Ž., Čmelar, K., Maronić, D. Š., Stević, F., Bek, N., Martinović, A., & Nikolašević, R. (2022). Footprint of the plastisphere on freshwater zooplankton. *Environmental Research*, 212, 113563. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113563>
- BARBOSA, J. C. (2018). *INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS E ESPACIAIS SOBRE A COMUNIDADE ZOOPLANCTÔNICA EM RIACHOS DO CERRADO*.
- Baselga, A. (2010). Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. *Global Ecology and Biogeography*, 19(1), 134–143. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x>
- Baselga, A. (2012). The relationship between species replacement, dissimilarity derived from nestedness, and nestedness. *Global Ecology and Biogeography*, 21(12), 1223–1232. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00756.x>

- Beltrão, G. D. B. M., Medeiros, E. S. F., & Ramos, R. T. D. C. (2009). Effects of riparian vegetation on the structure of the marginal aquatic habitat and the associated fish assemblage in a tropical brazilian reservoir. *Biota Neotropica*, 9(4), 37–43. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032009000400003>
- Bicudo, C. E. M., & Bicudo, D. C. (2004). *Amostragem em Limnologia*. RiMa Editora.
- Bonecker, C. C. (2012). *Temporal Changes in Zooplankton Species Diversity in Response to Environmental Changes in an Alluvial Valley*. 114–121. <https://doi.org/10.1016/j.limno.2012.07.007>
- Bonecker, C. C., Lansac-Tôha, F. A., & Rossa, D. C. (1998). Planktonic and non-planktonic rotifers in two environments of the upper paraná river floodplain, state of mato grosso do sul, brazil. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 41(4), 447–456. <https://doi.org/10.1590/S1516-89131998000400009>
- Bowen, K. L. (2017). *Methods for the Determination of Zooplankton Density, Biomass and Secondary Production*.
- Boyero, L., Ramírez, A., Dudgeon, D., & Pearson, R. G. (2009). Are tropical streams really different? *Journal of the North American Benthological Society*, 28(2), 397–403. <https://doi.org/10.1899/08-146.1>
- Branco, A. F. V. C., Lima, P. V. P. S. L., Medeiros Filho, E. S. D., Costa, B. M. G., & Pereira, T. P. (2021). Avaliação da perda da biodiversidade na mata atlântica. *Ciência Florestal*, 31(4), 1885–1909. <https://doi.org/10.5902/1980509853310>
- Cabral, C. R., Diniz, L. P., Da Silva, A. J., Fonseca, G., Carneiro, L. S., De Melo Júnior, M., & Caliman, A. (2020). Zooplankton species distribution, richness and composition across tropical shallow lakes: A large scale assessment by biome, lake origin, and lake habitat. *Annales de Limnologie - International Journal of Limnology*, 56, 25. <https://doi.org/10.1051/limn/2020023>
- Cardoso, L. S., Ramos, J. D., & Mello, H. O. O. (2009). Composition, density and abundance of populations of cladocera, copepoda and rotífera of area of permanent protection of uberabinha river. *Revista Em Extensão*, 7(2). <https://doi.org/10.14393/REE-v7n22008-20517>
- Carvalho, L. K. de. (2011). *Associação entre a fauna zoobentônica e a estrutura do habitat em um rio intermitente do semiárido brasileiro, Rio Ipanema (PE)* [PhD thesis]. <https://repositorio.uepb.edu.br/handle/123456789/14880>
- Chao, A., Chiu, C.-H., & Hsieh, T. C. (2012). Proposing a resolution to debates on diversity partitioning. *Ecology*, 93(9), 2037–2051. <https://doi.org/10.1890/11-1817.1>
- Chen, H., & Boutros, P. C. (2011). VennDiagram: A package for the generation of highly-customizable venn and euler diagrams in r. *BMC Bioinformatics*, 12(1), 35. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-12-35>
- CNPq. (2026). *Portaria 2664/2026 de 6 de março de 2026 - política de integridade na atividade científica do CNPq*. http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775
- COSTA, D. F. (2018). *Zooplâncton de riachos de cabeceiras de áreas de proteção ambiental do Cerrado, Distrito Federal, Brasil Central* [PhD thesis].
- Cottenie, K. (2005). Integrating environmental and spatial processes in ecological community

- dynamics. *Ecology Letters*, 8(11), 1175–1182. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00820.x>
- CReditT. (2026). *CReditT - contributor role taxonomy*. <https://credit.niso.org/>
- Crist, Thomas O., Veech, Joseph A., Gering, Jon C., & Summerville, Keith S. (2003). Partitioning species diversity across landscapes and regions: A hierarchical analysis of α , β , and γ diversity. *The American Naturalist*, 162(6), 734–743. <https://doi.org/10.1086/378901>
- Cyr, H., & Downing, J. A. (1988). Empirical relationships of phytomacrofaunal abundance to plant biomass and macrophyte bed characteristics. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 45(6), 976–984. <https://doi.org/10.1139/f88-120>
- Czerniawski, R. (2013). Zooplankton community changes between forest and meadow sections in small headwater streams, NW poland. *Biologia*, 68(3), 448–458. <https://doi.org/10.2478/s11756-013-0170-x>
- Czerniawski, R., & Domagała, J. (2010). Similarities in zooplankton community between river drawa and its two tributaries (polish part of river odra). *Hydrobiologia*, 638(1), 137–149. <https://doi.org/10.1007/s10750-009-0036-y>
- Dantas-Silva, L. T., & Dantas, Ê. W. (2013). ZOOPLÂNCTON (ROTIFERA, CLADOCERA e COPEPODA) e a EUTROFIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DO NORDESTE BRASILEIRO. *Oecologia Australis*, 17(2), 53–58. <https://doi.org/10.4257/oeco.2013.1702.06>
- Davidson, T. A. (2012). R. L. Wallace, t. W. Snell, c. Ricci, and t. Nogrady: Rotifera: Volume 1—biology, ecology and systematics (2nd edn): Backhuys publishers, 2006, 299 pp, paperback, €76.00, ISBN 90-5782-178-8. *Journal of Paleolimnology*, 47(1), 159–159. <https://doi.org/10.1007/s10933-011-9539-4>
- Duré, G. A. V., Simões, N. R., Braghin, L. D. S. M., & Ribeiro, S. M. M. S. (2021). Effect of eutrophication on the functional diversity of zooplankton in shallow ponds in northeast brazil. *Journal of Plankton Research*, 43(6), 894–907. <https://doi.org/10.1093/plankt/fbab064>
- ELMOOR-LOUREIRO, L. M. A. (1997). *Manual de Identificação de Cladóceros Límnicos do Brasil*.
- ESTEVES, F. A. (1998). *Fundamentos de Limnologia*.
- ESTEVES, F. A. (2011). *Fundamentos de Limnologia*.
- Farias, R. L., Stenert, C., Maltchik, L., & Medeiros, E. S. F. (2020). Partitioning of macroinvertebrate assemblages across temporary pools in an intermittent dryland river. *Inland Waters*, 10(4), 480–492. <https://doi.org/10.1080/20442041.2020.1738841>
- Fernández, C. E., Campero, M., Acosta, F., Prado, P. E., Maldonado, M., Goitia, E., Stamou, G., Michaloudi, E., & López, C. (2024). Diversity of rotifera in freshwaters of bolivia: An updated checklist. *Diversity*, 16(9), 589. <https://doi.org/10.3390/d16090589>
- FLACH, P. Z. S. (2009). *Partição Aditiva da diversidade de Nematoda em lagoas costeiras: componentes espaciais e ambientais* [PhD thesis]. <http://hdl.handle.net/10183/17339>
- Fleishman, E., Dickson, B. G., Dobkin, D. S., Leu, M., & Noon, B. R. (2017). *Methods for Assessment of Species Richness and Occupancy Across Space, Time, Taxonomic Groups, and Ecoregions*. <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD1037938.pdf>
- Fonseca, G. A. B. (1985). The vanishing brazilian atlantic forest. *Biological Conservation*, 34(1), 17–34. [https://doi.org/10.1016/0006-3207\(85\)90055-2](https://doi.org/10.1016/0006-3207(85)90055-2)

- FREIRY, R. F. (2019). *DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E DIVERSIDADE DA COMUNIDADE ZOOPLANCTÔNICA EM ÁREAS ÚMIDAS NO SUL DO BRASIL* [PhD thesis].
- Freiry, R. F., Weber, V., Bonecker, C. C., Lansac-Tôha, F. A., Pires, M. M., Stenert, C., & Maltchik, L. (2020). Additive partitioning of the diversity of the dormant zooplankton communities in intermittent ponds along a forest–grassland transition. *Hydrobiologia*, 847(5), 1327–1342. <https://doi.org/10.1007/s10750-020-04187-0>
- FRYER, G. (1968). *Evolution and Adaptive Radiation in the Chydoridae (Crustacea: Cladocera): A Study in Comparative Functional Morphology and Ecology*. 221–385.
- Fryer, G. (1974). Evolution and adaptive radiation in the macrothricidae (crustacea: Cladocera): A study in comparative functional morphology and ecology. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 269(898), 137–274. <http://www.jstor.org/stable/2418233>
- FULONE, L. J. (2008). *Influence of depth and rainfall on testate amoebae (Protozoa-Rhizopoda) composition from two streams in northwestern São Paulo state*. 29–34.
- Golec-Fialek, C., Lansac-Tôha, F. M., & Bonecker, C. C. (2021). Response of the zooplankton community to extreme hydrological variations in a temporary lake in a neotropical floodplain system. *Limnologia*, 86, 125834. <https://doi.org/10.1016/j.limno.2020.125834>
- Gomes, L. F., Barbosa, J. C., De Oliveira Barbosa, H., Vieira, M. C., & Vieira, L. C. G. (2020). Environmental and spatial influences on stream zooplankton communities of the brazilian cerrado. *Community Ecology*, 21(1), 25–31. <https://doi.org/10.1007/s42974-020-00008-5>
- Gouveia, R. S. D., Lira, G. L. D. A., Anselmo Ramos, T. P., & Medeiros, E. S. F. (2017). Ichthyofauna of the reserva biológica guaribas and surrounding areas, state of paraíba, brazil. *Check List*, 13(5), 581–590. <https://doi.org/10.15560/13.5.581>
- Granjeiro, G. F., Souza, C. A. D., Faquim, R. C. P., Borges, P. P., Oliveira, P. H. F. D., Nabout, J. C., & Vieira, L. C. G. (2024). Influence of land use, occupation, and riparian zones on zooplankton diversity in cerrado streams. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 36, e34. <https://doi.org/10.1590/s2179-975x10623>
- Grönroos, M., Heino, J., Siqueira, T., Landeiro, V. L., Kotanen, J., & Bini, L. M. (2013). Metacommunity structuring in stream networks: Roles of dispersal mode, distance type, and regional environmental context. *Ecology and Evolution*, 3(13), 4473–4487. <https://doi.org/10.1002/ece3.834>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Overview of r and RStudio* (pp. 31–47). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_2
- Heino, J. (2011). A macroecological perspective of diversity patterns in the freshwater realm: Diversity in freshwater systems. *Freshwater Biology*, 56(9), 1703–1722. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2011.02610.x>
- Heino, J., Grönroos, M., Ilmonen, J., Karhu, T., Niva, M., & Paasivirta, L. (2013). Environmental heterogeneity and diversity of stream macroinvertebrate communities at intermediate spatial scales. *Freshwater Science*, 32(1), 142–154. <https://doi.org/10.1899/12-083.1>
- Heino, J., Melo, A. S., Siqueira, T., Soininen, J., Valanko, S., & Bini, L. M. (2015). Metacommunity organisation, spatial extent and dispersal in aquatic systems: Patterns, processes and prospects. *Freshwater Biology*, 60(5), 845–869. <https://doi.org/10.1111/fwb.12533>

- Joko, C. Y., Lansac-Tôha, F. A., Murakami, E. A., & Bonecker, C. C. (2008). Novas ocorrências de lecanes no plâncton de distintos ambientes da planície de inundação do alto rio paran  (brasil). *Acta Scientiarum. Biological Sciences*, 30(2), 165–171. <https://doi.org/10.4025/actasciobiolsci.v30i2.3636>
- Jost, L. (2007). PARTITIONING DIVERSITY INTO INDEPENDENT ALPHA AND BETA COMPONENTS. *Ecology*, 88(10), 2427–2439. <https://doi.org/10.1890/06-1736.1>
- Junk, W. J., Bayley, P. B., & Sparks, R. E. (1989). *The Flood Pulse Concept in River-Floodplain Systems* (pp. 110–127).
- Keppeler, E. C., & Hardy, E. R. (2004). Abundance and composition of rotifera in an abandoned meander lake (lago amap ) in rio branco, acre, brazil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 21(2), 233–241. <https://doi.org/10.1590/S0101-81752004000200011>
- Koste, W., & Shiel, R. (1987). Rotifera from australian inland waters. II. Epiphanidae and brachionidae (rotifera : monogononta). *Invertebrate Taxonomy*, 1(7), 949–1021. <https://doi.org/10.1071/IT9870949>
- Lair, N. (2005). Abiotic vs. Biotic factors: Lessons drawn from rotifers in the middle loire, a meandering river monitored from 1995 to 2002, during low flow periods. *Hydrobiologia*, 546(1), 457–472. <https://doi.org/10.1007/s10750-005-4289-9>
- Lande, R. (1996). Statistics and partitioning of species diversity, and similarity among multiple communities. *Oikos*, 76(1), 5. <https://doi.org/10.2307/3545743>
- Larson, G. L., McIntire, C. D., Buktenica, M. W., Girdner, S. F., & Truitt, R. E. (2007). Distribution and abundance of zooplankton populations in crater lake, oregon. *Hydrobiologia*, 574(1), 217–233. <https://doi.org/10.1007/s10750-006-0354-2>
- Leal, A. H., Freitas, G. L. D., Sousa J nior, P. R. C. D., & Silva, E. B. D. (2025). Amplia  o de unidades de conserva  o por compensa  o de reserva legal: O caso da reserva biol gica guaribas. *Revista Brasileira de Gest o Ambiental e Sustentabilidade*, 12(30), 113–124. [https://doi.org/10.21438/rbgas\(2025\)123008](https://doi.org/10.21438/rbgas(2025)123008)
- Ligeiro, R., Melo, A. S., & Callisto, M. (2010). Spatial scale and the diversity of macroinvertebrates in a neotropical catchment. *Freshwater Biology*, 2010(55), 424–435. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02291.x>
- Lima,  . O. (2023). *Diversidade Taxon mica e Funcional de Zoopl ncton nos Ecossistemas do Pantanal: An lise Ecol gica de Longa Dura  o e Capacidade de Resist ncia de Ovos a Desseca  o* [PhD thesis].
- Lima, S. F. (2022). *Comunidade de zoopl ncton na reserva biol gica Guaribas (Para ba, Brasil)* [PhD thesis].
- Lopes, P. M., Bini, L. M., Declerck, S. A. J., Farjalla, V. F., Vieira, L. C. G., Bonecker, C. C., Lansac-Toha, F. A., Esteves, F. A., & Bozelli, R. L. (2014). Correlates of zooplankton beta diversity in tropical lake systems. *PLoS ONE*, 9(10), e109581. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109581>
- Lopes, P. M., & Caliman, A. (2008). *A contribui  o de ecossistemas l nticos para o entendimento da import ncia de processos regionais e locais sobre padr es geogr ficos de biodiversidade*.
- Magurran, A. E. (2021). Measuring biological diversity. *Current Biology*, 31(19), R1174–R1177. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.07.049>
- Maitland, P. S. (1990). *Biology of fresh waters* (1st ed.). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-1444-4>

[//doi.org/10.1007/978-94-011-7852-5](https://doi.org/10.1007/978-94-011-7852-5)

- Majeed, O. S., Nashaat, M. R., & Al-Azawi, A. J. M. (2023). Effect of AL-tharthar canal on the zooplankton composition and diversity in the tigris river. *Al-Mustansiriyah Journal of Science*, 33(5), 53–64. <https://doi.org/10.23851/mjs.v33i5.1314>
- Maltchik, L., & Medeiros, E. S. F. (2006). Conservation importance of semi-arid streams in north-eastern brazil: Implications of hydrological disturbance and species diversity. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 16(7), 665–677. <https://doi.org/10.1002/aqc.805>
- Marcelino, C. N., Brandão, L. F., Correia, C. D. M., Ferreira, A. C., Petsch, D. K., & Portinho, J. L. (2025). Quantification and analysis of emerging threats studies on freshwater zooplankton (copepoda, cladocera and rotifera) in brazil from 2014 to 2023. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 37, e30. <https://doi.org/10.1590/s2179-975x1525>
- Margalef, R. (1983). *Limnología*. Ediciones Omega, S.A.
- Martinelli, L. A., & Kruche, A. V. (2004). *Amostragem em Rios* (p. 351). RiMa Editora.
- Maxwell, K., & Dean, W. (1995). With broadax and firebrand: The destruction of the brazilian atlantic forest. *Foreign Affairs*, 74(5), 172. <https://doi.org/10.2307/20047336>
- Medeiros, C. R., Heino, J., Santos, P. J. P., Molozzi, J., & Ligeiro, R. (2021). Spatial scale drives diversity patterns of benthic macroinvertebrate communities in tropical estuaries. *Limnology and Oceanography*, 66(3), 727–739. <https://doi.org/10.1002/lno.11636>
- Medeiros, E. S. F., Silva, M. J., & Ramos, R. T. C. (2008). Application of catchment- and local-scale variables for aquatic habitat characterization and assessment in the Brazilian semi-arid region. *Neotropical Biology and Conservation*, 3, 13–20. <https://doi.org/10.4013/5440>
- Melo, A. S., Schneck, F., Hepp, L. U., Simões, N. R., Siqueira, T., & Bini, L. M. (2012). Focusing on variation: Methods and applications of the concept of beta diversity in aquatic ecosystems. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 23(3), 318–331. <https://doi.org/10.1590/S2179-975X2012005000010>
- Melo, A. S., Rangel, T. F. L. V. B., & Diniz-Filho, J. A. F. (2009). Environmental drivers of beta-diversity patterns in new-world birds and mammals. *Ecography*, 32(2), 226–236. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2008.05502.x>
- Melo, T. X. (2011). *Predadores ambientais do zooplâncton em poças temporárias de um rio intermitente* [PhD thesis].
- Melo, T. X., & Medeiros, E. S. F. (2013). Spatial distribution of zooplankton diversity across temporary pools in a semiarid intermittent river. *International Journal of Biodiversity*, 2013, 1–13. <https://doi.org/10.1155/2013/946361>
- Miranda, V. B. S. (2018). *A comunidade zooplanctônica de diferentes biótopos de um riacho costeiro em área de Mata Atlântica, Maricá, Rio de Janeiro* [PhD thesis].
- MMA. (2003). *Plano de Manejo da Reserva Biológica Guaribas*.
- Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A. B., & Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403(6772), 853–858. <https://doi.org/10.1038/35002501>
- Oksanen, J., Blanchet, F. G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P., O'Hara, B., Simpson, G., Solymos, P., Stevens, H., & Wagner, H. (2020). Vegan: Community ecology package. *R Package Version 2.2-1*, 2, 1–2.

- Oliveira, C. B. D. (2009). *Zooplâncton em córregos sob diferentes usos da terra na bacia do Rio Preto (Distrito Federal e Goiás)* [PhD thesis]. <https://doi.org/10.11606/D.41.2009.tde-07012010-111123>
- Picapedra, P. H. S., Fernandes, C., Baumgartner, G., & Sanches, P. V. (2021). Zooplankton communities and their relationship with water quality in eight reservoirs from the midwestern and southeastern regions of Brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 81(3), 701–713. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.230064>
- Pinto, L. P., Bedê, L., Paese, A., Fonseca, M., Paglia, A., & Lamas, I. (2006). *Ata Atlântica Brasileira: Os Desafios para Conservação da Biodiversidade de um Hotspot Mundial* (1st ed., pp. 91–118). RiMa Editora.
- Poorter, L., Amissah, L., Bongers, F., Hordijk, I., Kok, J., Laurance, S. G. W., Lohbeck, M., Martínez-Ramos, M., Matsuo, T., Meave, J. A., Muñoz, R., Peña-Claros, M., & Van Der Sande, M. T. (2023). Successional theories. *Biological Reviews*, 98(6), 2049–2077. <https://doi.org/10.1111/brev.12995>
- Pôrto, K. C., Almeida-Cortez, J. S., & Tabarelli, M. (2005). *Diversidade Biológica e Conservação da Floresta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco*.
- Pourriot, R., Rougier, C., & Miquelis, A. (1997). Origin and development of river zooplankton: Example of the marne. *Hydrobiologia*, 345(2-3), 143–148. <https://doi.org/10.1023/A:1002935807795>
- R Core Team. (2017). *R: A language and environment for statistical computing*. <https://www.R-project.org/>
- Ricci, C. (2001). *Dormancy patterns in rotifers* (L. Sanoamuang, H. Segers, R. J. Shiel, & R. D. Gulati, Eds.; pp. 1–11). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0756-6_1
- RStudio Team. (2022). *RStudio: Integrated development environment for R*. <http://www.rstudio.com/>
- Safar, N. V. H., Magnago, L. F. S., & Schaefer, C. E. G. R. (2020). Resilience of lowland atlantic forests in a highly fragmented landscape: Insights on the temporal scale of landscape restoration. *Forest Ecology and Management*, 470–471, 118183. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118183>
- Santos, J. F. D., Nascimento, J. R., & Simões, N. R. (2025). Effects of urban pollution on zooplankton diversity along the Almada River (Bahia, Brazil). *Acta Limnologica Brasiliensia*, 37, e103. <https://doi.org/10.1590/s2179-975x3224>
- Santos-Wisniewski, M. J., Rocha, O., Güntzel, A. M., & Matsumura-Tundisi, T. (2002). Cladocera chydoridae of high altitude water bodies (Serra da Mantiqueira), in Brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 62(4a), 681–687. <https://doi.org/10.1590/S1519-69842002000400016>
- Schäfer, A. (1985). *Fundamentos da Ecologia e Biogeografia das Águas Continentais*.
- Shell, T. M., & Collier, K. J. (2018). Partitioning of macroinvertebrate communities in a large New Zealand river highlights the role of multiple shore-zone habitat types. *River Research and Applications*, 34(8), 993–1002. <https://doi.org/10.1002/rra.3344>
- Shiel, R. J. (1995). *A Guide to Identification of Rotifers, Cladocerans and Copepods from Australian Inland Water*. Co-operative Research Centre for Freshwater Ecology.
- Shurin, J. B., Havel, J. E., Leibold, M. A., & Pinel-Alloul, B. (2000). LOCAL AND RE-

- GIONAL ZOOPLANKTON SPECIES RICHNESS: A SCALE-INDEPENDENT TEST FOR SATURATION. *Ecology*, 81(11), 3062–3073. [https://doi.org/10.1890/0012-9658\(2000\)081%5B3062:LARZSR%5D2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(2000)081%5B3062:LARZSR%5D2.0.CO;2)
- Silva, A. M. A., Medeiros, P. R., Silva, M. C. B. C., & Barbosa, J. E. L. (2009). Diel vertical migration and distribution of zooplankton in a tropical Brazilian reservoir. *Biotemas*, 2(1). <https://doi.org/10.5007/2175-7925.2009v22n1p49>
- Silva, M. R. F. D., Souza, K. S., Assis, C. R. D. D., Sá, R. A. D. Q. C. D., Santos, M. D. V., & Oliveira, M. B. M. D. (2020). BIOMARKERS AS a TOOL TO MONITOR ENVIRONMENTAL IMPACT ON AQUATIC ECOSYSTEMS / BIOMARCADORES COMO FERRAMENTA PARA MONITORAR o IMPACTO AMBIENTAL NOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS. *Brazilian Journal of Development*, 6(10), 75702–75720. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n10-120>
- Smirnov, N. N. (1998). *Cladocera: The Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World. Guide to the Identification of the Microinvertebrate of the Continental: Waters of the World*. Academic Publishing.
- Soares, C. E. A., & Elmoor-Loureiro, L. M. A. (2011). Uma atualização da lista de cladocera cladocera (crustacea, branchiopoda) do estado de pernambuco, brasil. *Biota Neotropica*, 11(2), 409–414. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032011000200038>
- Sousa, W., Attayde, J. L., Rocha, E. D. S., & Eskinazi-Sant'Anna, E. M. (2008). The response of zooplankton assemblages to variations in the water quality of four man-made lakes in semi-arid northeastern brazil. *Journal of Plankton Research*, 30(6), 699–708. <https://doi.org/10.1093/plankt/fbn032>
- Souza, M. E. T. D., Santos, N. G. D., Chiarelli, L. J., & Noll, M. S. M. C. (2025). Seasonal variation of the zooplankton communities' diversity in ponds of the atlantic forest. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 37, e105. <https://doi.org/10.1590/s2179-975x6524>
- Strahler, A. N. (1952). DYNAMIC BASIS OF GEOMORPHOLOGY. *Geological Society of America Bulletin*, 63(9), 923. [https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1952\)63%5B923:DBOG%5D2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1952)63%5B923:DBOG%5D2.0.CO;2)
- Súarez, Y. R., & Lima-Junior, S. E. (2009). Variação espacial e temporal nas assembleias de peixes de riachos na bacia do rio guirai, alto rio paranai. *Biota Neotropica*, 9(1), 101–111. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032009000100012>
- Tabarelli, M., Aguiar, A. V., Ribeiro, M. C., Metzger, J. P., & Peres, C. A. (2010). Prospects for biodiversity conservation in the atlantic forest: Lessons from aging human-modified landscapes. *Biological Conservation*, 143(10), 2328–2340. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.02.005>
- Tabarelli, M., Venceslau, A. A., Cezar, R. M., & Metzger, J. P. (2012). A conversão da floresta Atlântica em paisagens antrópicas: Lições para a conservação da diversidade biológica das florestas tropicais. *Asociación Interciencia*, 37(2), 88–92.
- Taboada, J. K., Miranda, T. M., Mello, R. S. P., & Coelho-De-Souza, G. (2022). Usos e conservação de espécies e ecossistemas nativos para o fortalecimento da sociobiodiversidade no território do PAN Lagoas do Sul. *Anais Da Reunião Técnica Sobre Agroecologia*, 17.
- Tuomisto, H. (2010). A consistent terminology for quantifying species diversity? Yes, it does exist. *Oecologia*, 164(4), 853–860. <https://doi.org/10.1007/s00442-010-1812-0>

- Vancine, M. H., Muylaert, R. L., Niebuhr, B. B., Oshima, J. E. D. F., Tonetti, V., Bernardo, R., De Angelo, C., Rosa, M. R., Grohmann, C. H., & Ribeiro, M. C. (2024). The atlantic forest of south america: Spatiotemporal dynamics of the vegetation and implications for conservation. *Biological Conservation*, 291, 110499. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110499>
- Vieira, A. C. B., Ribeiro, L. L., Santos, D. P. N., & Crispim, M. C. (2009). Correlation between the zooplanktonic community and environmental variables in a reservoir from the Northeastern semi-arid. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 21(3), 349–358.
- Ward, J. V. (1998). Riverine landscapes: Biodiversity patterns, disturbance regimes, and aquatic conservation. *Biological Conservation*, 83(3), 269–278. [https://doi.org/10.1016/S0006-3207\(97\)00083-9](https://doi.org/10.1016/S0006-3207(97)00083-9)
- Wetzel, R. G. (2001). *Limnology* (3rd ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2009-0-02112-6>
- Wetzel, R. G., & Likens, G. E. (2000). *Limnological analyses*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3250-4>
- Whittaker, R. H. (1972). EVOLUTION AND MEASUREMENT OF SPECIES DIVERSITY. *TAXON*, 21(2-3), 213–251. <https://doi.org/10.2307/1218190>
- Zar, J. H. (1999). *Biostatistical Analysis* (4th ed.).
- Zaú, A. (1998). *Fragmentação da Mata Atlântica: Aspectos Teóricos*.

Figures and Tables

Figure 1: Mapa da área de influência da REBIO Guaribas localizada no município de Mamanguape.

Figure 2: Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por tipo de site. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição t .

Figure 3: Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por rio. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição t .

Table 1:

Table 2:

Figures

Tables

Tab.: Environmental data table

Tab.: Nutrient data table




Figure 1: Mapa da área de influência da REBIO Guaribas.

Table 1: Environment data GT table.

Variable	Ponto5	Ponto6	Ponto7	Ponto8
w.Cond.uS.cm	137.5 (119.2-164.4)	148 (134.1-156.8)	137.5 (98.3-160.2)	154.2 (141.6-161.8)
w.Turb.ntu	5 (2-10.7)	4.9 (2.1-14.1)	4.9 (1.5-9.2)	5.7 (4-6.8)
w.pH	5.9 (4.7-7.5)	5.7 (4.6-7.7)	5.1 (4.5-6)	5.5 (5-6)
m.Elev.m	107.1 (107.1-107.1)	112.8 (112.8-112.8)	89 (89-89)	89.1 (89.1-89.1)
m.Vel.m.s	0.073 (0.025-0.161)	0.086 (0.035-0.24)	0.135 (0.022-0.207)	0.036 (0-0.115)
m.Slope	1.4 (1-2)	2.7 (2.5-3)	2.4 (1.5-3)	1.5 (1-2)
m.Depth.avg.cm	12.8 (9-14)	23.7 (16.3-31.7)	23.8 (16-41)	43.3 (28.3-51.3)
m.Depth.mar.cm	11.8 (3-16)	21.7 (8-30)	18.8 (7-42)	48.3 (16-87)
s.Mud	100 (100-100)	100 (100-100)	95 (90-100)	74.2 (5-100)
s.Sand	0 (0-0)	0 (0-0)	5 (0-10)	25.8 (0-95)
s.Gravel.f	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
s.Rocks	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
h.Macrophytes	5.8 (5-10)	10 (0-30)	0 (0-0)	17.9 (0-60)
h.Grass	3.3 (0-10)	8.3 (5-15)	6 (0-15)	27.1 (15-50)
h.Subm.veg	7.5 (5-15)	8.3 (5-15)	5.8 (0-10)	5.8 (0-10)
h.Overh.veg	68.3 (40-90)	70.8 (50-85)	76.7 (60-90)	31.7 (25-50)
h.Leaf.l	7.5 (5-10)	11 (1-25)	15.8 (5-30)	18.3 (10-30)
h.Root.masses	5 (0-15)	10.8 (5-15)	12.5 (5-20)	4.2 (0-10)
h.Algae	2.5 (0-5)	0.2 (0-1)	5.5 (0-21)	19.2 (15-25)
h.Debris	30.8 (20-45)	12.7 (5-20)	17.7 (5-30)	21.7 (5-35)

Table 2: Nutrient concentrations at the sampling sites.

Variable	Ponto5	Ponto6	Ponto7	Ponto8
n.Ammonia.NH3.ug.L	54.8 (39.3-64.3)	58.9 (47.5-77)	72 (33.4-115.7)	81.6 (68.9-93)
n.Nitrite.NO2.ug.L	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
n.Nitrate.NO3.ug.L	6 (0-9.7)	8.8 (6.9-12.6)	5.5 (0-12.6)	18.8 (11.1-31.1)
n.Orthophosphate.SRP.ug.L	0 (0-0)	0 (0-0)	1 (0-3)	0 (0-0)
n.Phosphorus.TP.ug.L	0 (0-0)	4.6 (0.3-10.3)	50.1 (0-150.3)	9 (0-27)




Figure 2: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por tipo de site.

Apendices

Non-used figures and tables

⚠ Non-used codes

```
1 table(1:10)
```




Figure 3: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, categorizados por riacho.



Figure 4: Etapas do desenvolvimento da pesquisa científica.