

# ANÁLISIS NUMÉRICO PARA INGENIERÍA

JUAN PABLO ALVARADO VILLALOBOS  
KEVIN STEVEN CORDERO ZÚÑIGA  
EMANUEL ESQUIVEL LÓPEZ  
LUIS LÓPEZ SALAS

## TAREA 2 - I PARTE

### Newton-Raphson

El método de Newton-Raphson para resolver sistemas de ecuaciones no lineales no es mas que una variación análoga al método para resolver ecuaciones no lineales, con diferencia del uso de vectores y matrices, pero en efecto es la misma formulación, formula presentada en la ecuación (1).

Elementos importantes:

Poder determinar la matriz jacobiana del sistema  $\mathcal{J}_F(\mathbf{x})$  el cual se define como:

$$\mathcal{J}_F(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Ademas que  $\mathcal{J}_F(\mathbf{x})$  sea invertible

### Valores iniciales

Para este método necesitamos como valores iniciales los siguientes.

- Un vector  $F(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))$  el cual muestra el sistema a resolver.
- Vector inicial  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  el cual posee valores cercanos a la solución del sistema.
- Vector con el valor de las variables utilizadas  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- Un valor de iteraciones máximas  $iterMax \in \mathbb{N}$
- Error máximo aceptado  $error$ .

### Formulación Matemática

El método iterativo para resolver un sistema de ecuaciones no lineales  $F(\mathbf{x}) = 0$  se define por la ecuación (1) la cual fue tomada de [1]

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\mathcal{J}_F(\mathbf{x}_k)]^{-1} F(\mathbf{x}_k) \quad (1)$$

Con vector inicial  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$

## Pseudocódigo

```
Paso 1: Primero se selecciona un vector inicial  $x_0$  cercano a la solución del sistema.

Paso 2: Se asigna el valor de  $x_0$  a  $x_k$ 

Paso 3: Se calcula el Jacobiano del sistema.

Paso 4: Se evalúa la función  $F(x_k)$ .

Paso 5: Se utiliza la ecuación (1) para calcular el termino siguiente  $x_{k+1}$ .

Paso 6: Se asigna el valor de  $x_{k+1}$  al valor de  $x_k$ .

Paso 7: Se repiten los pasos con el nuevo valor de  $x_k$  hasta cumplir la condición de parada.
```

## Problemas a resolver

En la primera parte se realizo el método de Newton - Raphson para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Se realizaron las pruebas con los siguientes ejemplos.

### Ejemplo 1

Determinar la solución del sistema de ecuaciones no lineal tomado de [1] diapositiva 16.

$$\begin{cases} \cos(x_2) - \cos(x_1) &= 0 \\ x_3^{x_1} &= \frac{1}{x_2} \\ e^{x_1} - x_3^2 &= 0 \end{cases} \quad (2)$$

Tomando como valores iniciales  $x_0 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T$ ,  $tol = 10^{-5}$ ,  $iterMax = 1000$

### Ejemplo 2

Determine la solución del sistema de ecuaciones, ejemplo tomado del [2] pagina 645

$$\begin{cases} 4x - y + z &= xw \\ x - 2y + 3z &= zw \\ -x + 3y - 2z &= yw \\ x^2 + y^2 + z^2 &= 1 \end{cases}$$

Tomando como valores iniciales  $x_0 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T$ ,  $tol = 10^{-5}$ ,  $iterMax = 10$

Solución buscada  $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)^T$

Ademas de esta solución el sistema converge a distintas soluciones mostradas continuación.

Solutions

$w = 1, \quad x = 0, \quad y \approx -0.707107, \quad z \approx -0.707107$

$w = 1, \quad x = 0, \quad y \approx 0.707107, \quad z \approx 0.707107$

$w = 3, \quad x \approx -0.816497, \quad y \approx -0.408248, \quad z \approx 0.408248$

$w = 3, \quad x \approx 0.816497, \quad y \approx 0.408248, \quad z \approx -0.408248$

$w = 6, \quad x \approx -0.57735, \quad y \approx 0.57735, \quad z \approx -0.57735$

Figura 1: Soluciones sistema de ecuaciones ejemplo 2.

## Resultados

Para los ejemplos se obtuvieron los siguientes resultados

### Ejemplo 1

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$k$	$\ F(\mathbf{x}_k)\ $
0,75309	0,75309	1,45724	7	0,0000013083




Figura 2: Gráfica iteraciones - error ejemplo 1.

## Ejemplo 2

$x$	$y$	$z$	$w$	$k$	error
$4,5279 \times 10^{-16}$	0,0711	0,0711	1,0000	6	0,00000046980




Figura 3: Gráfica iteraciones - error ejemplo 2.

## Referencias

- [1] Soto, J. *Solucion de Sistemas de Ecuaciones No Lineales Metodo de Newton – Raphson*. CE-3102: Análisis Numérico para Ingeniera.
- [2] Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). *Numerical analysis*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Pub. Co.