

# 递归问题：约瑟夫问题

emacsun

## 目录

1 问题描述	1
2 约瑟夫问题递归式	1
3 约瑟夫递归式的解	2
4 拓展1:二进制与约瑟夫问题	3
5 拓展2:更一般的约瑟夫递归式	3
6 推广3:不同基底的约瑟夫递归式	5
7 推广4:倒数第二个位置	5

## 1 问题描述

这是一个生死攸关的问题！至于如何生死攸关参见《具体数学》1.3节The Josephus Problem。现在做如下简化：假设有 $n$ 个人站成一圈，现在要每隔一个删除一个人，直到只有一个人幸存下来。例如 $n = 10$ 的情形如下：




图 1:  $n=10$ 的约瑟夫问题

消去的顺序是：2,4 6,8,10,3,7,1,9，于是5幸存下来。问题：确定幸存者的号码 $J(n)$ ？

## 2 约瑟夫问题递归式

因为有 $J(10) = 5$ ，所以我们猜测有 $J(n) = \frac{n}{2}$ ，但是一些简单的如同下表的例子否定了这个猜测。

$n$	1	2	3	4	5	6
$J_n$	1	1	3	1	3	5

不过我们可以大胆猜测， $J(n)$ 一定是奇数，因为绕圈走一圈就消去了全部的偶数。如果 $n$ 是偶数，则走一圈后除了仅剩下一半人口并且他们的号码有变化外，我们面临的情形是与刚开始相同的情形，如下图所示：




图 2:  $n$ 为偶数时的约瑟夫问题

如此，规模为 $2n$  问题就变成了规模为 $n$  的问题。这个规模为 $n$  的问题与原来相比只是在人员的序号上有所不同，具体说来就是除了每个人的号码加倍并减去1外， $J(2n)$  问题和 $2J(n) - 1$ 问题没有什么区别。即

$$J(2n) = 2J(n) - 1, n \geq 1 \quad (2.1)$$

由上文我们知道 $J(10) = 5$ ，几乎瞬间我们就会知道 $J(20) = 2J(10) - 1 = 2 * 5 - 1 = 9$ 。如此可以瞬间解决所有的 $J(5 * 2^m), m \geq 1$ 问题， $J(5 * 2^m) = 2J(5 * 2^{m-1}) + 1 = 2 * 2^m + 1 = 2^{m+1} + 1$ ，这一步隐含了数学归纳法的证明过程。

假设 $n$  是奇数，与偶数不同的情形在于，转第一圈后就把编号为1的人给杀掉了，第二圈开始是从编号为3的人开始的，第二圈开始后第一个要杀掉的人是5。




图 3:  $n$ 为奇数时的约瑟夫问题

如此， $J(2n + 1)$ 问题就简化为 $2J(n) + 1$ 问题，即：

$$J(2n + 1) = 2J(n) + 1, n \geq 1 \quad (2.2)$$

综上，约瑟夫问题递归式可以总结为：

$$\begin{aligned} J(1) &= 1 \\ J(2n) &= 2J(n) - 1 \\ J(2n + 1) &= 2J(n) + 1 \end{aligned} \quad (2.3)$$

### 3 约瑟夫递归式的解

从约瑟夫递归式可以看出，不同于汉诺塔和披萨饼问题，约瑟夫问题递归式给出的不是 $J(n)$  和 $J(n - 1)$  之间的递归关系，而是 $J(2n)$  或者 $J(2n - 1)$  与 $J(n)$  之间的关系。

有了递归式，我们计算一些较小的值

$n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$J_n$	1	1	3	1	3	5	7	1	3	5	7	9	11	13	15	1

显然，从上面的表格中可以看出，将 $n$ 按照2的幂次进行分组或许会出现一些转机。每一组开始的 $J(n)$ 总是等于1。仔细观察上表，如果将 $n$ 写作 $2^m + l$ ，则 $J(n) = J(2^m + l) = 2l + 1, m \geq 0 \leq l < 2^m$ 。其中 $2^m$ 是不超过 $n$ 的2的最大幂，而 $l = n - 2^m$ 。事实上，可以对 $m$ 使用数学归纳法证明：

$$J(n) = J(2^m + l) = 2l + 1, m \geq 0 \leq l < 2^m \quad (3.1)$$

如此，我们得出了约瑟夫问题的闭式解。对于 $J(100)$ 因为 $100 = 2^6 + 36$ ，所以 $J(100) = 2 * 36 + 1 = 73$

## 4 拓展1:二进制与约瑟夫问题

接下来我们针对约瑟夫问题做一些深入的挖掘。在求解约瑟夫问题递归式闭式解的过程中， $n$ 和 $J(n)$ 的以2为基的表示发挥着重要的作用，我们自然要研究以2为基的表示与约瑟夫问题之间的关系。假设 $n$ 的二进制表示为：

$$n = (b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0)_2 \quad (4.1)$$

即， $n = b_m 2^m + b_{m-1} 2^{m-1} + b_1 2 + b_0$ ，其中 $b_i, i = 0, 1, \dots, m-1$ 为0或者1。 $b_m = 1$ ，注意 $n = 2^m + l$ ，所以：

$$n = (1b_{m-1} \dots b_1 b_0)_2 \quad (4.2)$$

$$l = (0b_{m-1} \dots b_1 b_0)_2 \quad (4.3)$$

$$2l = (b_{m-1} \dots b_1 b_0 0)_2 \quad (4.4)$$

$$2l + 1 = (b_{m-1} \dots b_1 b_0 1)_2 \quad (4.5)$$

$$J(n) = (b_{m-1} \dots b_1 b_0 b_m)_2 \quad (4.6)$$

即，我们得到了：

$$J((b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0)_2) = (b_{m-1} b_{m-2} \dots b_1 b_0 b_m)_2 \quad (4.7)$$

在计算机程序设计过程中，只需要对 $n$ 的二进制表示循环左移1位即可得到 $J(n)$ !!!这是多么的令人激动啊!在刚开始的时候，我们看约瑟夫问题显得好困难，但是，此刻我们只需要对 $n$ 的二进制表示循环左移1位即可得到 $J(n)$ !!!对一个问题深入分析竟然可以得到如此精妙而简洁的答案!高老头不愧是高老头!

还以 $J(100)$ 为例，因为 $100 = (1100100)_2$ ，所以 $J((1100100)_2) = (1001001)_2 = 73$  !!!

## 5 拓展2:更一般的约瑟夫递归式

接下来跟进一步深入挖掘该问题，对约瑟夫递归式做更进一步的推广。如下：

$$\begin{aligned} f(1) &= \alpha \\ f(2n) &= 2f(n) + \beta \\ f(2n+1) &= 2f(n) + \gamma \end{aligned} \quad (5.1)$$

可以看出在约瑟夫问题中， $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = 1$ 。接下来，我们依然从小入手，得出下表

n	$f(n)$
1	$\alpha$
2	$2\alpha + \beta$
3	$2\alpha + \gamma$
4	$4\alpha + 3\beta$
5	$4\alpha + 2\beta + \gamma$
6	$4\alpha + \beta + 2\gamma$
7	$4\alpha + 3\gamma$
8	$8\alpha + 7\beta$
9	$8\alpha + 6\beta + \gamma$

从上表我们可以看出， $\alpha$  的系数是2的幂，且不超过 $n$ 。 $\beta$  的系数则从2的幂减一递减到0， $\gamma$  的系数则从0开始递增直到2的幂减一。于是式(5.1)的解可以表示为：

$$f(n) = A(n)\alpha + B(n)\beta + C(n)\gamma \quad (5.2)$$

则， $A(n), B(n), C(n)$ 可以分别表示为：

$$\begin{aligned} A(n) &= 2^m \\ B(n) &= 2^m - 1 - l \\ C(n) &= l \end{aligned} \quad (5.3)$$

其中， $n = 2^m + l, 0 \leq l < 2^m, n \geq 1$ . 对式(5.3)用数学归纳法可以证明。

联想到之前采用二进制表示约瑟夫问题的解：

$$J((b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0)_2) = (b_{m-1} b_{m-2} \dots b_1 b_0 b_m)_2 \quad (5.4)$$

$n$  的循环左移即是 $J(n)$  的解。那么对于式(5.1) 这个更一般的推广，有没有二进制表示呢？当然有！首先式 (5.1) 可以改写为：

$$\begin{aligned} f(1) &= \alpha \\ f(2n+j) &= 2f(n) + \beta_j, j = 0, 1 \end{aligned} \quad (5.5)$$

则式(5.5)可以改写为：

$$\begin{aligned} f((b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0)_2) &= 2f((b_m b_{m-1} \dots b_2 b_1)_2) + \beta_{b_0} \\ &= 4f((b_m b_{m-1} \dots b_3 b_2)_2) + 2\beta_{b_1} + \beta_{b_0} \\ &= 8f((b_m b_{m-1} \dots b_4 b_3)_2) + 4\beta_{b_2} + 2\beta_{b_1} + \beta_{b_0} \\ &\vdots \\ &= 2^m f((b_m)_2) + 2^{m-1}\beta_{b_{m-1}} + \dots + 2\beta_{b_1} + \beta_{b_0} \\ &= 2^m \alpha + 2^{m-1}\beta_{b_{m-1}} + \dots + 2\beta_{b_1} + \beta_{b_0} \end{aligned} \quad (5.6)$$

最后，可得：

$$f((b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0)_2) = (\alpha \beta_{b_{m-1}} \beta_{b_{m-2}} \dots \beta_{b_1} \beta_{b_0})_2 \quad (5.7)$$

事实上我们对 $f(n)$ 的前几个解稍加整理即可看出式(5.7) 的精妙。如下表

n	$f(n)$
1	$\alpha$
2	$2\alpha + \beta$
3	$2\alpha + \gamma$
4	$4\alpha + 2\beta + \beta$
5	$4\alpha + 2\beta + \gamma$
6	$4\alpha + 2\gamma + \beta$
7	$4\alpha + 2\gamma + \gamma$

在此，我们有 $\beta_0 = \beta, \beta_1 = \gamma$ . 仍然以 $J(100)$  为例，因为 $100 = (1100100)_2$ ，其解为：

$$(\alpha \beta_{b_{m-1}} \beta_{b_{m-2}} \dots \beta_{b_1} \beta_{b_0})_2 = (1\beta_1\beta_0\beta_0\beta_1\beta_0\beta_0)_2 \quad (5.8)$$

因为 $\alpha = 1, \beta_0 = \beta = -1, \beta_1 = \gamma = 1$ ，所以式(5.8)可以重写为：

$$(1\beta_1\beta_0\beta_0\beta_1\beta_0\beta_0)_2 = (1 \quad 1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \quad -1 \quad -1)_2 = 73 \quad (5.9)$$

注意在此，我们突破了二进制只有0和1的限制，不过这一突破使得约瑟夫的解更加的精炼。

## 6 推广3:不同基底的约瑟夫递归式

可以沿着推广2的思路走的更远, 我们对式(5.5) 做更进一步修改:

$$\begin{aligned} f(j) &= \alpha_j, 1 \leq j < d \\ f(dn + j) &= cf(n) + \beta_j, 0 \leq j < d \end{aligned} \quad (6.1)$$

式(6.1)有变动基数的解:

$$f((b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0)_d) = (\alpha_{b_m} \beta_{b_{m-1}} \beta_{b_{m-2}} \dots \beta_{b_1} \beta_{b_0})_c \quad (6.2)$$

## 7 推广4:倒数第二个位置

约瑟夫有一个朋友, 他站在倒数第二个位置上因而获救。当每隔一个人就有一个人被处死时, 倒数第二个幸存者 $I(n)$  的号码是多少?

每隔一个人就有一个人被处死的约瑟夫问题解为:

$$J(n) = J(2^m + l) = 2l + 1 \quad (7.1)$$

此时有:  $2l + 1 = n - 1 \rightarrow n = 2l + 2$ , 满足此式的 $n$  总是倒数第二个位置上的人获救。