Nên bắt đầu điều trị hạ sốt theo hướng dẫn điều trị địa phương cho trẻ bị rối loạn co giật hoặc có tiền sử co giật do sốt và cho mọi trẻ em nhận Prevenar 13 cùng với các vắc xin chứa tế bào ho gà toàn phần.

## 4.5 Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

Trẻ sơ sinh và trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi

Prevenar 13 có thể được dùng cùng lúc với bất cứ kháng nguyên nào trong các vắc xin sau đây, hoặc là vắc xin đơn trị hay vắc xin phối hợp: bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào hay toàn tế bào, *Haemophilus influenzae* týp b, bại liệt thể không hoạt động, viêm gan B, (xem mục 4.4 để biết hướng dẫn về Infanrix hexa), não mô cầu thuộc nhóm huyết thanh C, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu và vắc xin rota virus.

Prevenar 13 cũng có thể được dùng cùng lúc trong khoảng 12—23 tháng với vắc xin polysaccharid não mô cầu nhóm huyết thanh A, C, W và Y liên hợp với giải độc tố uốn ván cho trẻ em đã được tiêm chủng cơ bản với Prevenar 13 (theo khuyến cáo tại địa phương)

Dữ liệu từ một nghiên cứu lâm sàng sau khi thuốc lưu hành đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc hạ sốt (ibuprofen và paracetamol) để phòng bệnh lên đáp ứng miễn dịch với Prevenar 13 gợi ý rằng việc cho dùng paracetamol đồng thời hoặc trong cùng ngày tiêm chủng có thể làm giảm đáp ứng miễn dịch đối với Prevenar 13 sau liệu trình cho trẻ sơ sinh. Đáp ứng với liều nhắc lại dùng ở 12 tháng tuổi không bị ảnh hưởng. Ý nghĩa lâm sàng của quan sát này vẫn chưa được biết.

Trẻ em và thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi

Hiện không có dữ liệu về việc dùng đồng thời với các vắc xin khác.

Người lớn từ 18 đến 49 tuổi

Hiện không có dữ liệu về việc dùng đồng thời với các vắc xin khác.

Người lớn từ 50 tuổi trở lên

Prevanar 13 có thể được cho dùng đồng thời với vắc xin cúm bất hoạt hóa ba týp (TIV) theo mùa.

Trong hai nghiên cứu thực hiện ở người lớn tuổi từ 50-59 và 65 tuổi trở lên, đã chứng minh được rằng Prevenar 13 có thể được dùng đồng thời với vắc xin cúm bất hoạt ba dòng (TIV). Các đáp ứng đối với cả ba kháng nguyên TIV là tương tự khi TIV được cho dùng đơn độc hoặc đồng thời với Prevenar 13.

Khi Prevenar 13 được dùng đồng thời với TIV, đáp ứng miễn dịch đối với Prevenar 13 thấp hơn so với khi Prevenar 13 được cho dùng đơn độc, tuy nhiên, không có tác động lâu dài đối với mức kháng thể trong tuần hoàn.

Trong một nghiên cứu thứ ba ở người lớn tuổi từ 50-93 tuổi, người ta đã chứng minh rằng Prevenar 13 có thể được dùng đồng thời với vắc xin cúm mùa không hoạt hóa bốn dòng (QIV). Đáp ứng miễn dịch đối với tất cả 4 chủng QIV không thấp hơn khi Prevenar 13 được dùng đồng thời với QIV so với khi QIV được cho dùng đơn độc.

Đáp ứng miễn dịch đối với Prevenar 13 không thấp hơn khi Prevenar 13 được dùng đồng thời với QIV so với khi Prevenar 13 được cho dùng đơn độc. Tương tự như việc tiêm đồng thời với vắc xin ba